

## Classe Chondrichthyes

### Ordem Rajiformes

#### Familia Potamotrygonidae

Ricardo de Souza Rosa &

Marcelo Rodrigues de Carvalho

##### ***Paratrygon aiereba* (Müller & Henle, 1841)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica, do rio Ucayali (Peru) ao Estado do Pará, incluindo os rios Madeira, Negro, Trombetas e Tocantins e Bacia do Orinoco, Venezuela. Registrada também na Bolívia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Duméril (1865), Rosa (1990).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Pará.

Observações: Rosa (1991) considerou *Trygon stroglyopterus* Schomburgk (1843) e *Disceus thayeri* Garman (1913) como sinônimos de *P. aiereba*.

##### ***Plesiotrygon iwamae* Rosa, Castello & Thorson, 1987**

Localidade-tipo: Rio Solimões, acima de Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rios Amazonas, Tocantins e Napo (Equador).

Documentação primária: Localidade tipo.

##### ***Potamotrygon brachyura* (Günther, 1880)**

Localidade-tipo: Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Bacias do baixo Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 14819).

Referências: Rosa (1985), Britski *et al.* (1999).

Estado de conservação: Deficiente de dados.

##### ***Potamotrygon castexi* Castello & Yagolkowski, 1969**

Localidade-tipo: Rosário, rio Paraná, Argentina.

Distribuição: Bacia Amazônica (superior) e bacias do baixo Paraná e Paraguai (Brasil), rios Guaporé e Beni (Bolívia) e rio Marañon (Peru).

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 14578).

Referência: Rosa (1985).

##### ***Potamotrygon constellata* Vaillant, 1880**

Localidade-tipo: Calderão, rio Solimões, Brasil.

Distribuição: Rio Solimões, da fronteira entre Colômbia e Brasil até Manaus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rosa (1985), Ferreira *et al.* (1998), Thorson *et al.* (1983).

Observações: Rosa (1985) considerou *P. circularis* Garman, 1913, como sinônimo de *P. constellata*. O status taxonômico é duvidoso e necessita de estudos adicionais.

##### ***Potamotrygon dumerilii* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, Brasil.

Distribuição: Rio Araguaia e bacias do Paraguai e Paraná inferior.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: O status taxonômico é duvidoso e a espécie necessita de estudos adicionais.

***Potamotrygon falkneri* Castex & Maciel, 1963**

Localidade-tipo: Santa Fé, rio Paraná, Argentina.

Distribuição: Bacia do baixo Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (UERJ 718.3).

Referências: Rosa (1985), Britski *et al.* (1999).

Observações: Rosa (1985) considerou *P. menchacai* Achenbach, 1967, como sinônimo de *P. falkneri*.

***Potamotrygon henlei* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacias do Tocantins e Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosa (1985).

Estado de conservação: Deficiente de dados.

***Potamotrygon humerosa* Garman, 1913**

Localidade-tipo: Monte Alegre, Pará, Brasil (no baixo rio Amazonas).

Distribuição: Bacia do baixo Amazonas, do rio Tapajós ao rio Pará.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosa (1985).

***Potamotrygon leopoldi* Castex & Castello, 1970**

Localidade-tipo: Alto rio Xingu, perto da confluência do Aiuá-Missu, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosa (1985).

Estado de conservação: Deficiente de dados.

***Potamotrygon motoro* (Natterer in Müller & Henle, 1841)**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica do baixo Paraná e do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Observações: Rosa (1985) considerou *Trygon mulleri* Castelnau (1855) e *P. laticeps* Garman (1913, em parte) como sinônimos de *P. motoro* e *P. circularis*.

***Potamotrygon ocellata* (Engelhardt, 1912)**

Localidade-tipo: Mexiana, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Foz do rio Amazonas, no Estado do Pará e Estado do Amapá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosa (1985).

Observações: Considerada válida por Rosa (1985). O status taxonômico é duvidoso e a espécie necessita de estudos adicionais.

***Potamotrygon orbignyi* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica, rio Tocantins, rios da Guiana Francesa e Suriname e rio Orinoco, Venezuela.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosa (1985).

Observações: Rosa (1985) considerou *Trygon reticulatus* Günther (1880) como sinônimo de *P. orbignyi*.

***Potamotrygon schroederi* Fernández-Yépez, 1957**

Localidade-tipo: Boca Apurito, Rio Apure, Venezuela.  
Distribuição: Bacia do alto rio Orinoco, Venezuela e rio Negro, Brasil.  
Documentação primária: Lote de referência (UFPB 5226).  
Referências: Castex & Yagolkowski (1970), Fernández-Yépez (1957).

***Potamotrygon scobina* Garman, 1913**

Localidade-tipo: Cametá, rio Tocantins, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Baixo e médio cursos dos rios Amazonas, Trombetas e Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Rosa (1985).

***Potamotrygon signata* Garman, 1913**

Localidade-tipo: São Gonçalo, rio Parnaíba, Piauí, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Parnaíba, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Rosa (1985).

## **Classe Sarcopterygii**

### **Ordem Lepidosireniformes**

#### **Família Lepidosirenidae**

Naércio Aquino Menezes

***Lepidosiren paradoxa* Fitzinger, 1837**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.  
Distribuição: Bacias Amazônica, do Paraguai e do Prata.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Britski *et al.* (1999).

## **Classe Actinopterygii**

### **Ordem Osteoglossiformes**

#### **Família Osteoglossidae**

Paulo Andreas Buckup

***Arapaima gigas* (Schinz, in Cuvier, 1822)**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Sobreexplorada ou ameaçada de sobreexploração.

***Osteoglossum bicirrhosum* (Cuvier, 1829)**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Osteoglossum ferreirai* Kanazawa, 1966**

Localidade-tipo: Lago de Limão no baixo rio Branco, trib. of Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Ordem Characiformes**

**Família Parodontidae**

Carla Simone Pavanelli

***Apareiodon affinis* (Steindachner, 1879)**

Localidade-tipo: Rio da Prata, província de Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Bacia do Prata.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon argenteus* Pavanelli & Britski, 2003**

Localidade-tipo: Rio Tocantins em Serra da Mesa, a jusante da represa hidroelétrica, Município de Minaçu, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apareiodon cavalcante* Pavanelli & Britski, 2003**

Localidade-tipo: Ribeirão do Padre (tributário da margem direita do rio Tocantinzinho), Município de Cavalcante, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apareiodon davisii* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Rio Jaguaribe, Município de Russas, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Jaguaribe (Estado do Ceará) e Paraíba, (Estado da Paraíba).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon hasemani* Eigenmann, 1916**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Município de Pirapora, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon ibitiensis* Campos, 1944**

Localidade-tipo: Rio Camanducaia, Município de Monte Alegre, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto rio Paraná e alto rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon itapicuruensis* Eigenmann & Henn, 1916**

Localidade-tipo: Rio Paiaia, tributário do rio Itapicuru, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon machrisi* Travassos, 1957**

Localidade-tipo: Ribeirão Cristalino, Município de Amaro Leite, Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Araguaia-Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli & Britski (2003).

***Apareiodon piracicabae* (Eigenmann, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto rio Paraná e rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon tigrinus* Pavanelli & Britski, 2003**

Localidade-tipo: Córrego do Jacaré, perto da ponte, Município de Santa Rita do Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli & Britski (2003).

***Apareiodon vittatus* Garavello, 1977**

Localidade-tipo: Rio Iguaçu, Município de Bituruna, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Apareiodon vladii* Pavanelli, 2006**

Localidade-tipo: Rio Piquiri, a cerca de 5 km da vila de Paiquerê, 25°01'40,9"S 52°27'32,8"W, 455 m altitude, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do Piquiri, acima da desembocadura do rio Cantu, no Estado do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apareiodon sp. 1***

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Parodon bifasciatus* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Córrego Maripicru, Guiana.

Distribuição: Bacia do rio Branco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Pavanelli (2003).

***Parodon buckleyi* Boulenger, 1987**

Localidade-tipo: Canelos, Equador.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Pavanelli (2003).

***Parodon hilarii* Reinhardt, 1866**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Município Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Parodon moreirai* Ingenito & Backup, 2005**

Localidade-tipo: Ribeirão do Salto, 22°26'55"S 45°20'47"W, próximo a ponte de madeira em Salto, Município de Delfim Moreira, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Sapucaí.

Documentação primária: Localidade tipo (MNRJ 23583).

***Parodon nasus* Kner, 1859**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Prata.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli (2003).

***Parodon pongoensis* (Allen, 1942)**

Localidade-tipo: Pongo de Manseriche, bacia do rio Marañon, Peru.

Distribuição: Bacias do Amazonas e bacias dos rios Xingu e Tocantins.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Pavanelli (2003).

**Família Curimatidae**

Richard P. Vari & Naércio Aquino [Menezes](#)

***Curimata acutirostris* Vari & Reis, 1995**

Localidade-tipo: Lagoas marginais no rio Araguaia, próximo de Luís Alves, Município de São Miguel do Araguaia (aproximadamente 13°14'S 50°35'W), Brasil.

Distribuição: Alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Reis (1995).

***Curimata aspera* Günther, 1868**

Localidade-tipo: Rio Huallaga e Xeberos (=Jeberos).

Distribuição: Parte superior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari (1989a).

***Curimata cisandina* (Allen, 1942)**

Localidade-tipo: Loreto, Iquitos, Peru.

Distribuição: Rios Branco, Negro e Solimões.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 32256.

Referência: Vari (1989a).

***Curimata cyprinoides* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: América.

Distribuição: Curso inferior do Orinoco, rios costeiros das Guianas, baixo Amazonas, baixo Tocantins, rios Araguaia e Capim.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 32254.

Referências: Vari (1989a), Vari & Reis (1995).

***Curimata inornata* Vari, 1989**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Itaituba, Estado do Pará, Brasil, aproximadamente 4°17'S 55° 59'W.

Distribuição: Cursos médio e baixo do Amazonas, rios Tapajós, Trombetas e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1989a).

***Curimata knerii* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Tefé.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Steindachner (1876), Vari (1989a).

***Curimata macrops* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Rio Puty (= Poti).  
Distribuição: Bacia do Parnaíba.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1989a).

***Curimata ocellata* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica e rio Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1989a).

***Curimata roseni* Vari, 1989**

Localidade-tipo: Cachoeira do Bem Querer, Rio Branco, Estado de Roraima, Brasil, aproximadamente 2°50'S 60°43'W.  
Distribuição: Bacia do Negro, rio Araguaia e alto Madeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Vari (1989a), Vari & Reis (1995).

***Curimata vittata* Kner, 1859**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Bolívia; Rio Negro, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas e possivelmente alto Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Kner (1859), Vari (1989a).

***Curimatella alburna* (Müller & Troschel, 1844)**

Localidade-tipo: Guiana  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 9171.  
Referência: Vari (1992a).

***Curimatella dorsalis* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Coary (= Lago de Coari).  
Distribuição: Rio Orinoco, Bacia Amazônica e bacias do Paraguai e baixo Paraná.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21291.  
Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1992a).

***Curimatella immaculata* (Fernández-Yépez, 1948)**

Localidade-tipo: Obidos.  
Distribuição: Rio Orinoco, bacia do Amazonas e bacia do Rio Essequibo.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21396.  
Referência: Vari (1992a).

***Curimatella lepidura* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1992a).

***Curimatella meyeri* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Rio Huallaga, Peru.

Distribuição: Partes média e superior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 6953.

Referência: Vari (1992a).

***Curimatopsis crypticus* Vari, 1982**

Localidade-tipo: Riacho 2 km a leste do Lago Amucu, Distrito de Rupununi, Guiana.

Distribuição: Rios costeiros das Guianas e partes média e inferior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 15974-75.

Referência: Vari (1982a).

***Curimatopsis evelynae* Géry, 1964**

Localidade-tipo: Alto Rio Meta, Colômbia.

Distribuição: Alto Orinoco e rio Negro.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 15896.

Referências: Vari (1982a), Géry (1964b).

***Curimatopsis macrolepis* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Tabatinga, Manacapuru, boca do rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e bacia do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1876), Vari (1982a).

***Curimatopsis microlepis* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Jatuarana, Brasil.

Distribuição: Parte central da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1982a).

***Curimatopsis myersi* Vari, 1982**

Localidade-tipo: Alagadiço 3 km a noroeste de Lima, Departamento de San Pedro, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 35915).

Referência: Vari (1982b).

***Cyphocharax abramoides* (Kner, 1859)**

Localidade-tipo: Boca do rio Negro, Brasil.

Distribuição: Alto rio Orinoco, rio Negro e parte inferior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Vari (1992b), Kner (1859).

***Cyphocharax festivus* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Riachos do Rio Nanay, nordeste de Iquitos, aproximadamente 3°49'S 73°15'W, Peru.

Distribuição: Rio Orinoco, rio Essequibo e Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 22100.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax gangamon* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Lago Santa Clara, rio Tapajós, Monte Cristo, aproximadamente 4°04'S 55°38'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).



***Cyphocharax gilbert* (Quoy & Gaimard, 1824)**

Localidade-tipo: Rio Macacu, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco e rios costeiros do Estado da Bahia ao Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax gilli* (Eigenmann & Kennedy, 1903)**

Localidade-tipo: Arroyo Tremintina, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 38153.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax gouldingi* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Boca de Igarapé na estrada para a Serra do Navio, rio Cupixi, aproximadamente 0°40'N 51°40'W, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Estado do Amapá, rio Capim, rio Tocantins, parte inferior do rio Xingu e leste do Equador.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Vari (1992b), Vari & Blackledge (1996).

***Cyphocharax helleri* (Steindachner, 1910)**

Localidade-tipo: Alto rio Suriname, Suriname.

Distribuição: Bacia do rio Cuyuni, Venezuela, rios costeiros das Guianas e rio Cupixi, Estado do Amapá.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax leucostictus* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rio Negro e lago do Aleixo, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e rios costeiros do Estado do Amapá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax mestomyllos* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Cachoeira do Bicho-Açú, rio Marauíá, bacia do Rio Negro, aproximadamente 0°20'S 65°20'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 41755.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax modestus* (Fernández-Yépez, 1948)**

Localidade-tipo: Rio Batalha, afluente do rio Tietê, próximo de Bauru, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná, no Brasil e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax multilineatus* (Myers, 1927)**

Localidade-tipo: Bucurí, Rio Negro.

Distribuição: Bacias dos rios Negro e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21161.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax nagelii* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Vizinhança do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax nigripinnis* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Praia do Xeruíni, Rio Branco, Estado de Roraima, Brasil, aproximadamente 1°S 61°50'W.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyphocharax notatus* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Mercado de Belém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas e rio Capim.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21255.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax platanus* (Günther, 1880)**

Localidade-tipo: Rio de La Plata.

Distribuição: Rios Paraguai, Paraná inferior, Uruguai e La Plata.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 39784.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax plumbeus* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Lago Hyanuay (= Paraná do Januari).

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21288.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax saladensis* (Meinken, 1933)**

Localidade-tipo: Tributário do rio Salado, região de Santa Fé, Argentina.

Distribuição: Rios Paraguai, Paraná inferior e drenagens costeiras dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21670.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax santacatarinae* (Fernández-Yépez, 1948)**

Localidade-tipo: Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do sudeste do Brasil, dos Estados de São Paulo ao Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax signatus* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Lagoa marginal do rio Vermelho, na intersecção com a estrada de Aruanã a Britânia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Vermelho.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyphocharax spilotos* (Vari, 1987)**

Localidade-tipo: Rio Santa Maria, na ponte da rodovia BR 293 entre Dom Pedrito e Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rios Paraguai, Paraná inferior e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax spiluroopsis* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rio Içá.

Distribuição: Partes média e superior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 37474.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax spilurus* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Essequibo, Guiana.

Distribuição: Bacia do Orinoco, rio Branco, rio Negro, rio Cuyuni e rios costeiros das Guianas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: USNM 268005.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax stilbolepis* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Belo Monte, rio Xingu, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Tocantins e Xingú.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyphocharax vanderi* (Britski, 1980)**

Localidade-tipo: Rio Corumbataí, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Cyphocharax vexillapinnus* Vari, 1992**

Localidade-tipo: Rio Itaya, 10 km acima de Belén (Iquitos), aproximadamente 3°51'S 73°12'W, Peru.

Distribuição: Partes média e superior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: USNM 296394.

***Cyphocharax voga* (Hensel, 1869)**

Localidade-tipo: Rio dos Sinos, São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rios Paraguai, Paraná inferior, Uruguai, La Plata e rios costeiros dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1992b).

***Potamorhina altamazonica* (Cope, 1878)**

Localidade-tipo: Amazonas Peruano.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 9533.

Referências: Cope (1878), Vari (1984).

***Potamorhina latior* (Spix, 1829)**

Localidade-tipo: Rios do Brasil equatorial.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Spix & Agassiz (1829), Vari (1984).

***Potamorhina pristigaster* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Boca do rio Negro, Tefé, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1876), Vari (1984).

***Potamorhina squamora*levis (Braga & Azpelicueta, 1983)**

Localidade-tipo: Rio Paraná em Rosario, Argentina.

Distribuição: Rios Paraguai, Paraná inferior e La Plata.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21736.

Referências: Vari (1984), Braga & Azpelicueta (1983).

***Psectrogaster amazonica* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Tefé, Içá, Tabatinga, Óbidos, Fonte Boa, Lago Aleixo, Jutai, Tonantins, Santarém, Javari, Curupira.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1989b).

***Psectrogaster ciliata* (Müller & Troschel, 1845)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.

Distribuição: Bacias dos rios Orinoco, Essequibo e Branco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 25716.

Referência: Vari (1989b).

***Psectrogaster curviventris* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Assunção, Paraguai.

Distribuição: Rios Madeira e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari (1989b).

***Psectrogaster essequibensis* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Essequibo.

Distribuição: Bacias Amazônica e do rio Essequibo.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 22101.

Referência: Vari (1989b).

***Psectrogaster falcata* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Gurupá, Brasil.

Distribuição: Parte inferior da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1989b).

***Psectrogaster rhomboides* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Rio Poti, São Gonçalo.

Distribuição: Bacias dos rios Jaguaribe e Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1989b).

***Psectrogaster rutiloides* (Kner, 1859)**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso e boca do rio Negro.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Kner (1859), Vari (1989b).

***Psectrogaster saguiru* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Lago Papari, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Distribuição: Lago Papari, rios Paraíba, Jaguaribe, Curu e Açude Araras.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1941), Vari (1989b).

***Steindachnerina amazonica* (Steindachner, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1911), Vari (1991).

***Steindachnerina bimaculata* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio Javari; ? boca do Rio Negro.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 6370.

Referências: Steindachner (1876), Vari (1991).

***Steindachnerina biornata* (Braga & Azpelicueta, 1987)**

Localidade-tipo: Arroio Juan Blanco, bacia do Rio de la Plata, Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai, Uruguai, baixo Paraná e rios costeiros do Estado do Rio Grande do Sul e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Vari (1991), Braga & Azpelicueta (1987).

***Steindachnerina brevipinna* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rosario, La Plata, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai, baixo Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 28463.

Referências: Vari (1991), Eigenmann & Eigenmann (1889a).

***Steindachnerina conspersa* (Holmberg, 1891)**

Localidade-tipo: Formosa, Rio Paraguai, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e baixo Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 26915.

Referências: Vari (1991), Holmberg (1891).

***Steindachnerina corumbae* Pavanelli & Britski, 1999**

Localidade-tipo: Rio Pirapitinga, tributário do rio Corumbá, 17°48'S 48°33'W, Caldas Novas, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Corumbá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pavanelli & Britski (1999).

***Steindachnerina elegans* (Steindachner, 1874)**

Localidade-tipo: Rio Araçuaí, tributário do rio Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Pardo, Jequitinhonha, São Francisco e rios costeiros do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1874), Vari (1991).

***Steindachnerina fasciata* (Vari & Géry, 1985)**

Localidade-tipo: Rio Romarí, perto de Nova União, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Vari & Géry (1985), Vari (1991).

***Steindachnerina gracilis* Vari & Vari, 1989**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, Aruanã, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Vari & Vari (1989), Vari (1991).

***Steindachnerina guentheri* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Tabatinga, Brasil.

Distribuição: Bacia do Orinoco, rios do nordeste da Guiana e parte ocidental da bacia do Amazonas no Peru, Equador, Bolívia, Colômbia e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889a), Vari (1991).

***Steindachnerina hypostoma* (Boulenger, 1887)**

Localidade-tipo: Rio Ucayali.

Distribuição: Bacia do Amazonas acima de Manaus.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 20957.

Referências: Boulenger (1887), Vari (1991).

***Steindachnerina insculpta* (Fernández-Yépez, 1948)**

Localidade-tipo: Tatuí, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraguai e alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1991).

***Steindachnerina leucisca* (Günther, 1868)**

Localidade-tipo: Rio Huallaga, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 7634.

Referências: Vari (1991), Günther (1868).

***Steindachnerina notonota* (Miranda Ribeiro, 1937)**

Localidade-tipo: Rio Grangeiro, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do nordeste do Brasil entre os Estados do Pará e Rio Grande do Norte.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Miranda Ribeiro (1937), Vari (1991).

***Steindachnerina planiventris* Vari & Vari, 1989**

Localidade-tipo: Rio Machado, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Madeira, Negro e Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari (1991).

***Steindachnerina quasimodoi* Vari & Vari, 1989**

Localidade-tipo: Rio Javari próximo de Petropolis, Loreto, Peru.

Distribuição: Rio Javari e localidades próximas do Amazonas peruano.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 38594.

Referência: Vari (1991).

***Steindachnerina varii* Géry, Planquette & Le Bail, 1991**

Localidade-tipo: Rio Maroni, Guiana Francesa.

Distribuição: Rios Oiapoque, Maroni e Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Géry *et al.* (1991), Vari (1993).

## Família Prochilodontidae

Ricardo Macedo C. Castro &

Richard P. Vari

### ***Prochilodus argenteus* Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco e introduzido em diversos rios no nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

### ***Prochilodus brevis* Steindachner, 1874**

Localidade-tipo: Estado da Bahia, próxima a Salvador, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

### ***Prochilodus britskii* Castro, 1993**

Localidade-tipo: Rio Apiacá (tributário do rio Arinos, bacia do rio Tapajós), N de Juara, a montante do salto, aproximadamente

10°36'S 58° 04'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Apiacá, afluente do rio Arinos, afluente do rio Juruena, bacia do rio Tapajós, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

### ***Prochilodus costatus* Valenciennes, 1850**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

### ***Prochilodus hartii* Steindachner, 1874**

Localidade-tipo: Rios Jequitinhona, Pardo e Paraíba, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha e Pardo, nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

### ***Prochilodus lacustris* Steindachner, 1907**

Localidade-tipo: Lago de Parnaguá, Lagoa da Missão, Santa Filomena e rio Medonho, tributário do rio Paraíba, Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Paraíba e Mearim, nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

### ***Prochilodus lineatus* (Valenciennes, 1836)**

Localidade-tipo: Rio da Prata, Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraíba dos Sul, Uruguai, Jacuí e sistema Paraná-Paraguai (excluindo o rio Iguaçu), em vários países.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 20864.

Referência: Castro & Vari (2004).

***Prochilodus nigricans* Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rios do Brasil Central.

Distribuição: Amplamente distribuída em toda Bacia Amazônica, em vários países.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

***Prochilodus vimboides* Kner, 1859**

Localidade-tipo: Ipanema, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Brasil entre os rios Jucuruçu e Paraíba do Sul, rio Uruguai e cabeceiras dos afluentes do alto rio Paraná e rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Espírito Santo.

***Semaprochilodus brama* (Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacias dos rios Tocantins e Xingú.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 36852.

Referência: Castro & Vari (2004).

Estado de conservação: Sobreexplotada ou ameaçada de sobreexplotação.

***Semaprochilodus insignis* Jardine, 1841**

Localidade-tipo: Rio Branco, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castro & Vari (2004).

Estado de conservação: Sobreexplotada ou ameaçada de sobreexplotação.

***Semaprochilodus taeniurus* (Valenciennes, 1817)**

Localidade-tipo: América equinocial.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 6680.

Referência: Castro & Vari (2004).

Estado de conservação: Sobreexplotada ou ameaçada de sobreexplotação.

**Família Anostomidae**

Heraldo A. Britski & Julio C. Garavello

***Abramites hypselonotus* Günther, 1868**

Localidade-tipo: Xeberos, alto Amazonas, Peru.

Distribuição: Bacias Amazônica, e do Orinoco, Paraguai, Paraná médio e Inferior.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Eigenmann & Kennedy (1903), Norman (1926), Borodin (1929).

Observações: Outras referências: Vari & Williams (1987).

***Anostomoides laticeps* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Crab Falls, rio Essequibo, Guiana.

Distribuição: Bacias do Essequibo, Orinoco e Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Santos *et al.* (1984), Santos & Jégu (1989).



***Anostomus anostomus* Linnaeus, 1758**

Localidade-tipo: América do Sul.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco; rios da Guiana e do Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Steindachner (1881a).

Observações: Como *Anostomus salmoneus* Steindachner (1881).

***Anostomus intermedius* Winterbottom, 1980**

Localidade-tipo: Jusante das corredeiras próximas de Suya-Missu ou Paranajuba, alto rio Xingu, bacia Amazônica, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Winterbottom (1980).

***Anostomus plicatus* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Crab Falls, rio Essequibo, Guiana.

Distribuição: Bacias dos rios Essequibo e Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Santos & Jégu (1996).

***Anostomus ternetzi* Fernández-Yépez, 1949**

Localidade-tipo: Palital, Guarico, Venezuela.

Distribuição: Bacias dos rios Orinoco, Tocantins e costeiros das Guianas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Santos & Jégu (1989).

***Gnathodolus bidens* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Rio Cassiquiare, Chemoni, Venezuela.

Distribuição: Rio Cassiquiare; rio Uatumã (Bacia Amazônica).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Santos & Jégu (1987).

***Laemolyta fernandesi* Myers, 1950**

Localidade-tipo: Alto Orinoco.

Distribuição: Bacias do Orinoco e Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Géry (1964a), Santos *et al.* (1984), Mautari & Menezes (2006).

Observações: Mautari & Menezes (2006) consideram *L. petiti* Géry, sinônimo desta espécie.

***Laemolyta garmani* (Borodin, 1931)**

Localidade-tipo: Lago Javari, Içá, Jutai, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica, no Brasil, Equador e Peru.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Borodin (1931), Mautari & Menezes (2006).

***Laemolyta proxima* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Vila Bela e Ueranduba, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônicas e do Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Garman (1890a), Mautari & Menezes (2006).

Observações: Mautari & Menezes (2006) consideram *L. nitens* (Garman) e *L. varia* (Garman) sinônimos desta espécie.

***Laemolyta taeniata* (Kner, 1859)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé; barra do rio Negro (= Manaus); Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Kner (1859), Mautari & Menezes (2006).

***Leporellus vittatus* (Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica; Guiana; bacias do São Francisco e do Prata.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Cuvier & Valenciennes (1850).

Observações: *Leporellus vittatus*, inclui aqui *L. pictus* e *L. retropinnis*, mencionadas em Garavello & Britski (2003).

***Leporinus affinis* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Rio Capim, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Günther (1864).

***Leporinus agassizi* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Tabatinga; Tefé; rio Içá.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Steindachner (1876).

***Leporinus aguapeiensis* Campos, 1945**

Localidade-tipo: Rio Aguapé, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Provavelmente sinônimo de *Leporinus obtusidens* Valenciennes.

***Leporinus amae* Godoy, 1980**

Localidade-tipo: Rio Apuaê.

Distribuição: Bacia do alto Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Holótipo no Museu de História Natural de Pirassununga.

***Leporinus amblyrhynchus* Garavello & Britski, 1987**

Localidade-tipo: Rio Tietê, Itu, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná; rio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus aripuanaensis* Garavello & Santos, 1992**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Aripuanã, bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus bahiensis* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Não se conhece o rio de proveniência dos síntipos.

***Leporinus bimaculatus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Rio Vermelho (Estado de Goiás); São João das Duas Barras (Estado do Tocantins), Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus bistratus* Britski, 1997**

Localidade-tipo: Igarapé Águas Claras, rio Itacaiunas, Caldeirão; Serra dos Carajás, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus brunneus* Myers, 1950**

Localidade-tipo: Cachoeira Camanaos, rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus conirostris* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Rio Paraíba em Mendes, Juiz de Fora e Palmeira; rio Doce; rio Mucuri.

Distribuição: Bacias do Paraíba do Sul, Doce e Mucuri.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus copelandii* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Rio Paraíba e afluentes em Mendes e Juiz de Fora; rio Doce; Rio São Mateus; rio Jequitinhonha e rio Quenda em Santa Cruz.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul, São Mateus, Doce, Jequitinhonha e Quenda.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus crassilabris* Borodin, 1929**

Localidade-tipo: Rio Jequitinhonha, Brasil.

Distribuição: Rio Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Provavelmente sinônimo de *L. elongatus* Valenciennes, apud Géry *et al.* (1987).

***Leporinus crassilabris breviceps* Borodin, 1929**

Localidade-tipo: Rio Araçuaí.

Distribuição: Rio Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Provavelmente sinônimo de *L. crassilabris*.

***Leporinus cylindriformes* Borodin, 1929**

Localidade-tipo: Porto de Moz.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus desmotes* Fowler, 1914**

Localidade-tipo: Rio Rupununi, Guiana.

Distribuição: Rio Rupununi, Guiana; Bacia Amazônica, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Santos & Jégu (1989), Santos & Jégu (1996).

***Leporinus elongatus* Valenciennes, 1850**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Rio Jequitinhonha e (?) rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry *et al.* (1987).

Observações: O lectótipo provavelmente é proveniente do rio Jequitinhonha e não do rio São Francisco (Géry *et al.*, 1987).

***Leporinus falcipinnis* Mahnert, Gery & Muller, 1997**

Localidade-tipo: Rio Arapiuns, uma hora de barco a montante da boca do rio Aruá, pequena fazenda na margem direita, baixo rio Tapajós, Brasil.

Distribuição: Rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Como *Leporinus novemfasciatus* Spix & Agassiz (1829).

***Leporinus fasciatus* (Bloch, 1794)**

Localidade-tipo: Não mencionada (Suriname).

Distribuição: Rios da Bacia Amazônica, Venezuela; Suriname; Guiana Francesa.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Müller & Troschel (1845), Günther (1864), Britski & Garavello (1978).

***Leporinus friderici* (Bloch, 1794)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Suriname, Guiana Francesa, bacias Amazônica e do Prata.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Kner (1859), Günther (1864).

***Leporinus garmani* Borodin, 1929**

Localidade-tipo: Araçuaí.

Distribuição: Rio Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus gomesi* Garavello & Santos, 1990**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, acima da cachoeira de Dardanelos, Humboldt, Aripuanã, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Aripuanã, Bacia do Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus jamesi* Garman, 1929**

Localidade-tipo: Manacapuru, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus julii* Santos, Jégu & Lima, 1996**

Localidade-tipo: Rio Xingu, cachoeira Kaituka, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus klausewitzii* Géry, 1960**

Localidade-tipo: Rio Manacapuru, Mandurucu, perto de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus lacustris* Campos, 1945**

Localidade-tipo: Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Prata.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus macrocephalus* Garavello & Britski, 1988**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Barão de Melgaço, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio Paraná e rio Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus maculatus* Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Rios das Guianas; rio Tocantins.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Castelnau (1855).

Observações: Géry *et al.* (1988) redescrevem *L. maculatus*, mostrando os equívocos de identificação desta espécie cometidos por Eigenmann (1912) [PRONEX # 184] e autores que o sucederam.

***Leporinus marcgravii* Lütken, 1875**

Localidade-tipo: Rio das Velhas e afluentes, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus melanopleura* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Estado da Bahia; rio Cipó, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus microphthalmus* Garavello, 1989**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, salto de Nova Ponte, Nova Ponte, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus moralesi* Fowler, 1942**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Tabatinga, José Fernandes, rio Içá, lago Aleixo, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica; Venezuela.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: *L. muelleri* Steindachner, 1876, é sinônimo desta espécie, pré ocupado em *Creagrutus*.

***Leporinus mormyrops* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul e rio Piabanha, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus nattereri* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Negro, Tefé, lago Aleixo, [Estado do Amazonas, Brasil].

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus nigrotaeniatus* (Jardine, 1841)**

Localidade-tipo: Pedrero, rio Negro.

Distribuição: Rio Negro e Guianas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: De acordo com Géry (1977), a ocorrência desta espécie na Amazônia não esta confirmada.

***Leporinus obtusidens* Valenciennes, 1836**

Localidade-tipo: Buenos Aires, Argentina.  
Distribuição: Bacias dos rios da Prata, Paraná, São Francisco e Gualaíba.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Cuvier & Valenciennes (1850).

***Leporinus octofasciatus* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Paraná e Joinville.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Britski & Garavello (1978).

***Leporinus ortomaculatus* Garavello, 2000**

Localidade-tipo: Rio Surumu, Estado de Roraima, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Branco e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus pachycheilus* Britski, 1976**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus pachyurus* Valenciennes, 1850**

Localidade-tipo: Amazonas.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus parae* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Baixo Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus paranensis* Garavello & Britski, 1987**

Localidade-tipo: Marimondo, rio Grande, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus pellegrini* Steindachner, 1910**

Localidade-tipo: Suriname.  
Distribuição: Guiana; Suriname; Guiana Francesa; Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Steindachner (1917).

***Leporinus piau* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Rio Salgado, Icó, Estado do Ceará e Jatobá, rio São Francisco, Estado de Pernambuco, Brasil.  
Distribuição: Rios do Nordeste do Brasil e rio São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus pitingai* Santos & Jégu, 1996**

Localidade-tipo: Rio Pitinga, Cachoeira 40 Ilhas, abaixo UHE Pitinga, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Rio Pitinga, bacia do Uatumã, Estado do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus reinhardtii* Lütken, 1875**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus sexstriatus* Britski & Garavello, 1980**

Localidade-tipo: Rio Papagaio, acima de Utiariti, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus silvestri* Boulenger, 1902**

Localidade-tipo: Rio Coxipó, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus steindachneri* Eigenmann, 1907**

Localidade-tipo: Rio Arassuaí, afluente do Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus striatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Irisanga (=Orissanga, Estado de São Paulo) e Caiçara, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Prata.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus taeniatus* Lütken, 1875**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus taeniofasciatus* Britski, 1997**

Localidade-tipo: Rio Maranhão, na altura da cachoeira do Machadinho, divisa dos Municípios de Barro Alto e Niquelândia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus thayeri* Borodin, 1929**

Localidade-tipo: Rio Paraíba, Brasil.

Distribuição: Rios Paraíba e Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Espírito Santo.

***Leporinus tigrinus* Borodin, 1929**

Localidade-tipo: Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus trifasciatus* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus trimaculatus* Garavello & Santos, 1992**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, Humboldt, Aripuanã, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus uatumaensis* Santos & Jégu, 1996**

Localidade-tipo: Rio Uatumã, cachoeira do Miriti, abaixo da cachoeira Balbina, Estado do Amazonas,

Distribuição: Rio Uatumã.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporinus vanzoi* Britski & Garavello, 2006**

Localidade-tipo: rio Tapajó, cachoeira Lombo de Anta, 4°26'S 56°14'W, perto de São Luís, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudanos trimaculatus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudanos winterbotomi* Sidlauskas & Santos, 2005**

Localidade-tipo: em lagoa marginal atrás de praia na margem sul do rio Ventuari, aproximadamente 0,5 h (aproximadamente

12 km) acima da desembocadura no Orenoco, laguna Pavon, 4°4'N, 66°56'W, Amazonas,

Venezuela.

Distribuição: Bacia do Orinoco e do baixo Tapajós.

Documentação primária: Bibliográfica.

***Rhytiodus argenteofuscus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Negro.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhytiodus elongatus* Steindachner, 1908**

Localidade-tipo: Rio Purus, Brasil.

Distribuição: Bacia do Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhytiodus microlepis* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro (= Manaus), Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sartor elongatus* Santos & Jégu, 1987**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, cachoeira da Porteira, foz do rio Mapuera, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sartor respectus* Myers & Carvalho, 1959**

Localidade-tipo: Rio Kuluene (=Culuene), em Jacaré, na junção com o rio Tamitatoala, cerca 12°S, Estado do Mato Grosso,

Brasil

Distribuição: Alto Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Sartor tucuruense* Santos & Jégu, 1987**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Tucuruí, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Pará.

***Schizodon altoparanae* Garavello & Britski, 1990**

Localidade-tipo: Rio Paraná; em frente a Jupiá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon australis* Garavello, 1994**

Localidade-tipo: Rio Uruguai, Porto de Santo Izidro, Município de São Nicolau, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon borellii* (Boulenger, 1900)**

Localidade-tipo: Carandasíño (=Carandazinho), perto de Corumbá, Estado do Mato Grosso, Brasil. Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon dissimilis* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Rio Puty (=Poti), Brasil.

Distribuição: Bacia do Parnaíba, Estado do Piauí.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon fasciatus* Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica; Guiana Francesa.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon intermedius* Garavello & Britski, 1990**

Localidade-tipo: Ribeirão afluente do Rio Itaqueri, tributário do rio Piracicaba, Águas de São Pedro, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon isognathus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon jacuiensis* Bergman, 1988**

Localidade-tipo: Rio Guaíba, ilha Balceira, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da lagoa dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizodon knerii* (Steindachner, 1875)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Schizodon nasutus Kner, 1858**

Localidade-tipo: Irisanga (=Orissanga, Estado de São Paulo), Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Schizodon rostratus (Borodin, 1931)**

Localidade-tipo: Rio Puty (=Poti), em Teresina, Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Bacia do Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Schizodon vittatus (Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Amazonas [Rio Araguay (= Araguaia), apud Castelnau].

Distribuição: Bacia do Amazonas e do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Synaptolaemus cingulatus Myers & Fernandez-Yepe, 1950**

Localidade-tipo: Laja Supira, alto rio Orinoco, Venezuela.

Distribuição: Rio Orinoco; Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry (1974).

**Família Chilodontidae**

Carlos Alberto Santos de Lucena

**Caenotropus labyrinthicus (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Branco e barra (boca) do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Amazonas e Orinoco; sistema Tocantins-Araguaia; parte superior do rio Essequibo, Guiana; Suriname e rio Parnaíba, Estado do Piauí.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari *et al.* (1995).

**Caenotropus mestomorgmatos Vari, Castro & Raredon, 1995**

Localidade-tipo: Rio Iguapo, drenagem do Orinoco, Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Porção superior do Orinoco, Venezuela e parte superior do rio Negro na Venezuela e Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica

Referência: Vari *et al.* (1995).

**Chilodus gracilis Isbrücker & Nijssen, 1988**

Localidade-tipo: Tributário do rio Uaupés em Trovão, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Chilodus punctatus Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: lago Amaku, rio Essequibo superior, Guiana.

Distribuição: Bacia do Amazonas; rio Apeú, Estado do Pará; rios da Guiana e Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1988).

**Chilodus zunevei Puyo, 1945**

Localidade-tipo: Guiana Francesa.

Distribuição: Suriname; Guiana Francesa e rio Oiapoque, Estado do Amapá.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1988).

## Família Crenuchidae

Paulo Andreas Buckup

### ***Ammocryptocharax elegans* Weitzman & Kanazawa, 1976**

Localidade-tipo: Caño Muco, ca. 15 km west of Puerto Guitán, Río Vichada basin, State of Meta, Colômbia.

Distribuição: Bacia Amazônica e drenagem do alto Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: AMNH 50847.

Referência: Buckup (1993).

### ***Ammocryptocharax minutus* Buckup, 1993**

Localidade-tipo: Rio Urubaxi, praia próximo à confluência com o rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Drenagens do alto rio Orinoco e do alto rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Characidium alipioi* Travassos, 1955**

Localidade-tipo: Ilha dos Pombos, Rio Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

### ***Characidium bahiense* Almeida, 1975**

Localidade-tipo: Arembepe, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras da região de Arembepe.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Characidium bimaculatum* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Characidium boaevistae* Schultz, 1944**

Localidade-tipo: Rio Miang (trib. do Cotingo, drenagem do rio Branco), Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacia do Orinoco e norte da Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Characidium brevirostre* Pellegrin, 1908**

Localidade-tipo: antigo contestado franco-brasileiro [= Estado do Amapá, Brasil].

Distribuição: Bacias costeiras do Estado do Amapá, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Characidium crandellii* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Rio Miang (trib. do Cotingo, drenagem do rio Branco), Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Characidium declivirostre* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Rio Coquenán (trib. do Caroní), Venezuela.

Distribuição: Bacia do Orinoco e Bacia Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 14130).

***Characidium etheostoma* Cope, 1892**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Equador (atualmente Peru).  
Distribuição: Bacia do Solimões.  
Documentação primária: Lote de referência (MCZ 79201).

***Characidium fasciatum* Reinhardt, 1866**

Localidade-tipo: "Soumidouro Baeken" [=Corrego do Sumidouro?], próximo a Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco e alto rio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Buckup (1992).

***Characidium gomesi* Travassos, 1956**

Localidade-tipo: Córrego da Lazica (bacia do Mogi-Guaçu), Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Buckup (1992).

***Characidium grajahuense* Travassos, 1944**

Localidade-tipo: Riacho que abastece a caixa do Grajaú, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras ao norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Buckup (2000).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Rio de Janeiro e no Município do Rio de Janeiro.

***Characidium hasemani* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Rio Surumu em Serra do Mello, [Brasil] e rio Rupununi [Guiana].  
Distribuição: Bacias do rio Negro e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium interruptum* Pellegrin, 1909**

Localidade-tipo: Serra d'Estrello[=Serra da Estrela, Estado do Rio de Janeiro], Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do Estado do Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium japyhybense* Travassos, 1949**

Localidade-tipo: Japyhyba [=Japuiba], Município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras da região da Ilha Grande.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium lagosantense* Travassos, 1947**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de Minas Gerais (Machado *et al.*, 1998)

***Characidium lanei* Travassos, 1967**

Localidade-tipo: Fazenda Poço Grande, Juquiá, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Ribeira de Iguape.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium laterale* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Colonia Risso, Paraguai.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUT 2532.

Referência: Boulenger (1900).

***Characidium lauroi* Travassos, 1949**

Localidade-tipo: Rio das Pedras, Fazenda Penedo, Agulhas Negras (Rezende), Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Characidium macrolepidotum* (Peters, 1868)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Esta espécie permaneceu esquecida na literatura até 2001, e sua identidade precisa ser investigada.

***Characidium occidentale* Buckup & Reis, 1997**

Localidade-tipo: Arroio Canoin (aproximadamente 28°07'S 55°13'W) na estrada entre Pirapó e São Nicolau, Município de São Nicolau, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium oiticica* Travassos, 1967**

Localidade-tipo: Córrego na Estação Biológica de Paranapiacaba, Paranapiacaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do rio Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium orientale* Buckup & Reis, 1997**

Localidade-tipo: Arroio Chasqueiro na BR-116 entre Pelotas e Arroio Grande, Município de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da Lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium pterostictum* Gomes, 1947**

Localidade-tipo: Rio Maquiné (tributário da Lagoa dos Quadros), Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do rio Uruguai e bacias costeiras situadas mais ao norte até a bacia do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Buckup & Reis (1997).

***Characidium rachovii* Regan, 1913**

Localidade-tipo: Região da Vila da Quinta, 32°05'S 52°17'W, Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Regiões de planície da bacia do Prata e bacias costeiras do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Buckup & Malabarba (1990), Buckup & Reis (1997).

***Characidium roesseli* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, próximo a Belém, cerca de 60 km abaixo de Letícia, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium schubarti* Travassos, 1955**

Localidade-tipo: Córrego entre Murtinhos e Jaguariaíva, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paranapanema.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium serrano* Buckup & Reis, 1997**

Localidade-tipo: Rio Jacutinga na estrada BR283 entre Seara e Concórdia, Município de Concórdia, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Rio Grande do Sul.

***Characidium steindachneri* Cope, 1878**

Localidade-tipo: Amazonas Peruano.

Distribuição: Bacias do norte da América do Sul.

Documentação primária: Lote de referência (ANSP 21428).

***Characidium stigmatosum* Melo & Buckup, 2002**

Localidade-tipo: Riacho tributário do córrego Ave Maria, 47°30'W 13°47'S, próximo à sede da Fazenda Santo Antônio, 14 km ao Norte de Cavalcante, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Tributários do rio das Almas, na margem esquerda do Paranã, bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium tenue* (Cope, 1894)**

Localidade-tipo: Cabeceiras do rio Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do Uruguai e Lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Buckup & Reis (1997).

***Characidium timbuiense* Travassos, 1946**

Localidade-tipo: Corrego Valsungana, elevação de 785 m, tributário de rio Timbui, próximo a Santa Teresa, Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Estado do Espírito Santo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium vestigipinne* Buckup & Hahn, 2000**

Localidade-tipo: Cabeceiras do rio Caraguatá, aproximadamente 28°9'S 52°18'W, aproximadamente 200 m da rodovia RS-135, Fazenda Dückel, Município de Coxilha, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Characidium vidali* Travassos, 1967**

Localidade-tipo: Rio Soberbo, Barreira, Parque Nacional da Serra dos Orgãos, 400m, terceiro distrito de Magé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras no leste da Baixada Fluminense.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Characidium zebra* Eigenmann, 1909**

Localidade-tipo: Maripicru [Creek], tributário do Ireng, Guiana.  
Distribuição: Bacias do Orinoco, Amazonas e bacias costeiras no norte da América do Sul.  
Documentação primária: Lote de referência (INPA 8089).  
Referência: Backup (1992).

***Characidium* sp. 1**

Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Lote de referência (USNM 289905).

***Crenuchus spilurus* Günther, 1863**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco e bacias costeiras das Guianas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 7479).

***Elachocharax geryi* Weitzman & Kanazawa, 1978**

Localidade-tipo: Lago Paricatuba, 60°30'W 3°7'S, bacia do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias do rio Negro e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Backup (1993).

***Elachocharax junki* (Géry, 1971)**

Localidade-tipo: rio Novo (afluente do rio Jamari, bacia do Madeira) a cerca de 45 km a leste de Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil, 8°46'S, 63°30'W.  
Distribuição: Bacias do rio Madeira e Cuieiras.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Backup (1993).

***Elachocharax mitopterus* Weitzman, 1986**

Localidade-tipo: Caño Chola, na estrada entre San Carlos do Río Negro e Solano, cerca de 1°58'N 67°00'W, Departamento Río Negro, Território Federal Amazonas, Venezuela.  
Distribuição: Bacias do rio Negro e Casiquiare.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Backup (1993).

***Elachocharax pulcher* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Caño de Quiribana, near Caicara, Venezuela.  
Distribuição: Bacias do Amazonas entre o igarapé Açu em Aveiro, Estado do Pará, Brasil, e o rio Nanay, em Mishana, Departamento de Loreto, Peru, e bacia do Orinoco acima de Caicara.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 14221.  
Referência: Backup (1993).

***Klausewitsia ritae* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Igarapé Prêto, próximo a Belém, a cerca de 60 km abaixo de Leticia, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Solimões.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Backup (1993).

***Leptocharacidium omospilus* Backup, 1993**

Localidade-tipo: Boca de tributário, margem esquerda do rio Mawarinuma (=rio Baria), 5 km a montante do acampamento base Neblina 66°10'W, 0°55'N, elev. 120 m, Dept. Rio Negro, Território Federal do Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do rio Negro e alto rio Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 43670.

***Melanocharacidium auroradiatum* Costa & Vicente, 1994**

Localidade-tipo: Pequeno tributário do rio Verde (bacia do rio Araguaia), 1 km ao sul de São Miguel do Araguaia, 13°22'S 50°15'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Melanocharacidium depressum* Backup, 1993**

Localidade-tipo: Cachoeira Morena, rio Uatumã, aproximadamente 59°30'W 2°10'S, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do rio Uatumã, rio Negro e alto rio Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Melanocharacidium dispilomma* Backup, 1993**

Localidade-tipo: Cachoeira Morena, rio Uatumã [aproximadamente 59°30'W 2°10'S], Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Cuiuni.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Melanocharacidium nigrum* Backup, 1993**

Localidade-tipo: Rio Mucajaí, a montante da Ilha do Paredao, Território Federal de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacias do norte da Amazônia que drenam o Planalto das Guianas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Melanocharacidium pectorale* Backup, 1993**

Localidade-tipo: Cachoeira Morena, rio Uatumã, aproximadamente 59°30'W 2°10'S, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microcharacidium weitzmani* Backup, 1993**

Localidade-tipo: Pequeno "caño" (bacia do rio Orinoco), 5°25'W 67°46'N, 2 km ao sul de Mirabel, na estrada entre Puerto Ayacucho e Samariapo, Departamento Ature, Território Federal del Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Amazonas e alto Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Odontocharacidium aphanes* (Weitzman & Kanazawa, 1977)**

Localidade-tipo: Igarapé em terra firme, São João, próximo a Tapurucuara, bacia do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Poecilocharax weitzmani* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, a cerca de 60 km abaixo de Leticia, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.



## Família Hemiodontidae

Francisco Langeani

### ***Anodus elongatus* Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Amazonas, Japurá, Jutai, Purus, Solimões, Trombetas e Ucayali).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

### ***Anodus orinocensis* (Steindachner, 1887)**

Localidade-tipo: Rio Orinoco.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Amazonas, Solimões e Tocantins) e do Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

### ***Argonectes longiceps* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Içana, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Madeira, Negro, Tapajós e Trombetas), do Maroni e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1998), Langeani (1999a).

### ***Argonectes robertsi* Langeani, 1999**

Localidade-tipo: Lago Dumbá Grande, Rio Araguaia, Barra do Garças, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1998).

### ***Bivibranchia fowleri* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Madeira, Negro, Tapajós, Tocantins e Xingu), [do](#) Orinoco e [do](#) Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (2003).

### ***Bivibranchia notata* Vari & Goulding, 1985**

Localidade-tipo: Praia, rio Tapajós, Alter do Chão, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Tapajós e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Bivibranchia velox* (Eigenmann & Myers, 1927)**

Localidade-tipo: Ribeirão, rio Tocantins, Porto Nacional, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Rios Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

### ***Hemiodus argenteus* Pellegrin, 1908**

Localidade-tipo: Rio Orinoco.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Japurá, Jutai, Negro, Tapajós e Uatumã), do Corantijn, e do Orinoco e do Rupununi.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus atranalis* (Fowler, 1940)**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, Contamana, Peru.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Amazonas, Madeira, Negro, Solimões, Tefé e Trombetas) e rio Essequibo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus goeldii* Steindachner, 1908**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Brasil (localidade tipo provavelmente incorreta).

Distribuição: Rio Amapá.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Langeani (1996), Langeani (2003).

***Hemiodus gracilis* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Rio Cupari, bacia do rio Tapajós, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Amazonas, Madeira, Negro, Solimões e Tapajós) e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus immaculatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Japurá, Jutai, Madeira, Negro, Preto da Eva, Tapajós e Trombetas) e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus jatuarana* Langeani, 2004**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, Oriximiná, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1996).

***Hemiodus microlepis* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Madeira e Tocantins) e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1996).

***Hemiodus orthonops* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Arroio Trementina, Paraguai.

Distribuição: Bacias do Paraguai e baixo Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Britski *et al.* (1999), Langeani (1998), Langeani (1996).

***Hemiodus parnaguae* Eigenmann & Henn, 1916**

Localidade-tipo: Lagoa de Parnaguá, Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Rio Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1996).

***Hemiodus quadrimaculatus* Pellegrin, 1908**

Localidade-tipo: Rio Camopi, Guiana Francesa.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Negro e Trombetas), e dos rios Araguari, Coppename, Nickerie e Oiapoque.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus semitaeniatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Capim, Madeira e Tapajós) e dos rios Essequibo, Orinoco e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus sterni* (Géry, 1964)**

Localidade-tipo: Alto rio Juruena, afluente do Tapajós, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Juruena.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1996).

***Hemiodus ternetzi* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Córrego Jausinho, afluente do Rio Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1999b).

***Hemiodus thayeria* Böhlke, 1955**

Localidade-tipo: Banco de areia no rio Negro, entre Brasil e Colômbia.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Negro e Solimões) e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1999b).

***Hemiodus tocantinensis* Langeani, 1999**

Localidade-tipo: Afl. do ribeirão Lajeadozinho, abaixo da "cuesta", rio Araguaia, alto Araguaia, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiodus unimaculatus* (Bloch, 1794)**

Localidade-tipo: Brasil; Suriname.

Distribuição: Bacias do Amazonas (rios Amazonas, Capim, Içá, Japurá, Jutai, Madeira, Negro, Tapajós, Tefé, Tocantins, Trombetas, Ucayali e Xingu), Olapoque e Suriname.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

***Hemiodus vorderwinckleri* (Gery, 1964)**

Localidade-tipo: Letícia, divisa Brasil-Colômbia.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Solimões e Xingu) e do Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1996).

***Micromischodus sugillatus* Roberts, 1971**

Localidade-tipo: Igarapé Tarumázinho, margem esquerda do rio Negro, 15 km noroeste de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rio Madeira, Negro e Solimões).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1996), Langeani (1998).

**Família Gasteropelecidae**

Carlos Alberto Santos de Lucena

***Carnegiella schereri* Fernández-Yépez, 1927**

Localidade-tipo: Caño del Chanco, Pevas [Pebas], Peru.

Distribuição: Rio Amazonas, em Loreto, Peru; próximo a Manaus e localidade de Imeri, rio Negro, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman & Weitzman (1982).

***Carnegiella strigata* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Originalmente desconhecida.

Distribuição: Bacia Amazônica, drenagem do rio Capim (Belém), Guiana, Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Weitzman (1954), Weitzman & Weitzman (1982).

Observações: Localidade tipo restringida por Hoedeman (1952) para Manaus, Brasil.

***Gasteropelecus levis* (Eigenmann, 1909)**

Localidade-tipo: Belém, Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman (1954).

***Thoracocharax securis* (De Filippi, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Napo, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica..

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman (1954).

***Thoracocharax stellatus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Cuaibá [Estado do Mato Grosso], Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica, do alto Paraguai e do baixo Paraná; rio Uruguai; rio Tocantins; rio Apure, bacia do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1999).

**Família Characidae: Agoniatinae**

Flávio Cesar Thadeo de Lima

***Agoniat es anchovia* Eigenmann, 1914**

Localidade-tipo: Vila Bela [Rio Beni, Bolívia].

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Zarske & Géry (1997).

***Agoniat es halecinus* Müller & Troschel, 1845**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Bacia Amazônica; Guiana; alto rio Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Zarske & Géry (1997).

**Família Characidae: Aphyocharacinae**

Rosana Souza Lima

***Aphyocharax alburnus* (Günther, 1869)**

Localidade-tipo: Alto Amazonas, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Boulenger (1898b), Eigenmann (1915), Souza-Lima (2003).

Observações: Souza-Lima (2003) sinonimizou esta espécie a *A. pusillus*; as citações deste nome na literatura podem referir-se às espécies *A. avary*, *A. dentatus* ou *A. pusillus*.

***Aphyocharax anisitsi* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Britski *et al.* (1999), Fowler (1932), Souza-Lima (2003).

***Aphyocharax avary* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Rio Madeira.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1913), Souza-Lima (2003).

***Aphyocharax dentatus* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Laguna, rio Paraguai, Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: IUM 10290.

Referências: Britski *et al.* (1999), Eigenmann *et al.* (1907), Souza-Lima (2003).

***Aphyocharax pusillus* Günther, 1869**

Localidade-tipo: Huallaga, Xeberos (Amazônia Peruana).

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 49513).

Referências: Boulenger (1898b), Souza-Lima (2003).

***Aphyocharax rathbuni* Eigenmann, 1907**

Localidade-tipo: Arroyo Chagalalina, Paraguai.

Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Axelrod (1993), Britski *et al.* (1999), Souza-Lima (2003).

***Aphyocharax* sp. 1**

Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 44467).

Referência: Souza-Lima (2003).

Observações: Descrita em Souza-Lima, 2003 como *Aphyocharax* sp. 1.

***Aphyocharax* sp. 2**

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (NRM 23389).

Referência: Souza-Lima (2003).

Observações: Descrita em Souza-Lima, 2003 como *Aphyocharax* sp. 3.

***Aphyocharax* sp. 3**

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 52143).

Referência: Souza-Lima (2003).

Observações: Descrita em Souza-Lima, 2003 como *Aphyocharax* sp. 4.

***Aphyocharax* sp. 4**

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 44371).

Observações: Mencionada na literatura como *Aphyocharax anisitsi*.

**Família Characidae: Bryconinae**

Flávio Cesar Thadeo de Lima &

Naércio Aquino Menezes

***Brycon amazonicus* (Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lima (2001).

***Brycon bahiensis* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

***Brycon devillei* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Espírito Santo.

***Brycon falcatus* Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: Guiana, Suriname.

Distribuição: Bacia Amazônica; rios guianenses; rio Tocantins.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lima (2001).

***Brycon ferox* Steindachner, 1877**

Localidade-tipo: Rio Mucuri, Brasil.

Distribuição: Rio Mucuri.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Espírito Santo.

***Brycon gouldingi* Lima, 2004**

Localidade-tipo: Igarapé da Boa Vista, afluente do rio Itacaiúnas, Parauapebas, Serra dos Carajás, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Brycon hilarii* (Valenciennes, 1849)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco [localidade-tipo muito provavelmente incorreta].

Distribuição: Rio Paraguai; baixo rio Paraná; alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

***Brycon insignis* Steindachner, 1877**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul em Campos e Mendes; rio Jequitinhonha.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada (como "*Catabasis acuminatus*") no Estado de São Paulo, vulnerável (como *Brycon* sp.) no Estado do Rio de Janeiro, criticamente em perigo no Estado do Espírito Santo.

***Brycon melanopterus* (Cope, 1871)**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lima (2001).

***Brycon nattereri* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Orissanga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná, alto São Francisco e alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

***Brycon opalinus* (Cuvier, 1819)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima (2001).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Brycon orbygnianus* (Valenciennes, 1849)**

Localidade-tipo: Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Rio Paraná e rio Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lima (2001).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado de Minas Gerais (Machado *et al.*, 1998), criticamente em perigo no Estado do Rio Grande do Sul, em perigo no Estado do Paraná.

***Brycon orthotaenia* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Rio Cipó, Brasil.  
Distribuição: Rio São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lima (2001).

***Brycon pesu* Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: Guiana.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Lima (2001).

***Brycon polylepis* Moscó Morales, 1988**

Localidade-tipo: Rio Yasa, afluente do rio Negro, estação biomédica Kasmera, Serra de Perijá, zona de reserva dos índios Pariries, Estado Zulia, Venezuela.  
Distribuição: Sistema do Lago de Maracaibo (Venezuela); bacia do rio Tocantins.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Lima (2001).

***Brycon vermelha* Lima & Castro, 1999**

Localidade-tipo: Rio Mucuri, aproximadamente 9 km W da vila de Presidente Pena, numa estrada de terra na Fazenda Gavião, 17°42'S 40°58'W, Município de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Mucuri.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lima (2001).  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Brycon sp. 1***

Distribuição: Bacia do Doce.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 36663.  
Referência: Lima (2001).

***Brycon sp. 2***

Distribuição: Bacia do rio Pardo.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 58297.  
Referência: Lima (2001).

***Brycon sp. 3***

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 53803.  
Referência: Lima (2001).

***Brycon sp. 4***

Distribuição: Bacia do alto rio Tapajós.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 61132.  
Referência: Lima (2001).

***Henochilus wheatlandii* Garman, 1890**

Localidade-tipo: Santa Clara, bacia do rio Mucuri, sudeste do Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Doce e Mucuri.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Garman (1890b).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.



**Família Characidae: Characinae: *Phenacogaster***

Zilda Margarete S. de Lucena

***Phenacogaster beni* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Villa Bella, rio Beni, Bolívia.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30548).

***Phenacogaster calverti* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Desde a drenagem do rio Curu, Estado do Ceará, até o rio Piranhas, Estado da Paraíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucena (2003b).

***Phenacogaster franciscoensis* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Boqueirão, próximo à foz do rio Preto, bacia do São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias do São Francisco e Paraguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucena (2003b).

***Phenacogaster jancupa* Malabarba & Lucena, 1995**

Localidade-tipo: Ribeirão Espinheiro, afluente do Cuiabá, alto Paraguai, Jangada, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Phenacogaster pectinatus* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Pebas, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Eigenmann & Myers (1929), Lucena (2003b).

***Phenacogaster suborbitalis* Ahl, 1936**

Localidade-tipo: Drenagens próximas à cidade de Belém, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucena (2003b).

***Phenacogaster tegatus* (Eigenmann, 1911)**

Localidade-tipo: Jaurú, alto Paraguai, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai e médio Paraná, em Corrientes, Argentina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Casciotta *et al.* (2001).

***Phenacogaster sp. 1***

Distribuição: Bacias do Negro e Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 16191).

Referência: Lucena (2003b).

***Phenacogaster sp. 2***

Distribuição: Bacia do Negro, canal Casiquiare e alto Orinoco.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 31207).

Referência: Lucena (2003b).

***Phenacogaster sp. 3***

Distribuição: Rio Curuá, Serra do Cachimbo, bacia do Xingu.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30551).  
Referência: Lucena (2003b).

***Phenacogaster sp. 4***

Distribuição: Bacia do Xingu.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30875).  
Referência: Lucena (2003b).

**Família Characidae: Characinae: Characini**

Carlos Alberto Santos de Lucena

***Charax condei* (Géry & Köppel, 1976)**

Localidade-tipo: Rio Tarumazinho, rio Negro inferior, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Negro e rio Amazonas médio.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax hemigrammus* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Gluck Island, Guiana.  
Distribuição: Guiana e médio Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax leticiae* Lucena, 1987**

Localidade-tipo: Igarapé Urubu, rio Tocantins, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tocantins e alto Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax macrolepis* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Rio Guaporé.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax michaeli* Lucena, 1989**

Localidade-tipo: Igarapé do Cujobim, rio Branco, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Charax niger* Lucena, 1989**

Localidade-tipo: Rio Amapá, Estado do Amapá, Brasil.  
Distribuição: Rios Amapá e Cupixi, Estado do Amapá.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Charax pauciradiatus* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio Capim, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Capim, Ilha de Marajó e baixo Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax rupununi* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Rio Rupununi, Guiana.  
Distribuição: Rio Trombetas, Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax stenopterus* (Cope, 1894)**

Localidade-tipo: Cabeceiras do rio Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Rios Paraguai, baixo Paraná, Uruguai e bacias dos rios do leste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil e Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena (1987).

***Charax unimaculatus* Lucena, 1989**

Localidade-tipo: Lago Manacapuru, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Roeboides affinis* (Günther, 1868)**

Localidade-tipo: Huallaga.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco e Guiana.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Lucena (1988).

***Roeboides biserialis* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Médio Amazonas.  
Distribuição: Médio Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena (1988).

***Roeboides descavadensis* Fowler, 1932**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Alto Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Roeboides dispar* Lucena, 2001**

Localidade-tipo: foz do [rio] Arara, bacia do rio Juruá, Reserva Extrativista Alto Juruá, Estado do Acre, Brasil.  
Distribuição: Regiões superiores dos rios Madre de Dios, drenagem do Madeira, Juruá e Ucayali.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Roeboides margaretae* Lucena, 2003**

Localidade-tipo: Lago do Viana, sistema do rio Pindaré-Mearim, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Pindaré-Mearim e Parnaíba.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Roeboides microlepis* (Reinhardt, 1849)**

Localidade-tipo: Sistema do rio Paraguai.  
Distribuição: Bacias do Paraguai e Uruguai; médio e baixo Paraná.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Lucena (2003a).

***Roeboides myersi* Gill, 1870**

Localidade-tipo: Rio Marañon ou Napo, sistema do rio Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lucena (2003a).

***Roeboides oligistos* Lucena, 2000**

Localidade-tipo: Braço morto do rio Tapajós, Itaituba, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Afluentes do médio e baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Roeboides paranensis* Pignalberi, 1975**

Localidade-tipo: Ilha de Nangñui, bacia do rio Paraná, Argentina.

Distribuição: Rios Paraná médio e inferior, e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lucena (1988).

***Roeboides prognathus* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso, Brasil e Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai, rio Paraná médio e inferior.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lucena (1988).

***Roeboides xenodon* (Reinhardt, 1851)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, bacia do São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucena (1988).

**Família Characidae: Characinae: Cynopotamini**

Naércio Aquino Menezes

***Acestrocephalus sardina* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Rio Madeira, cerca de 200 milhas a leste de 60°20'W.

Distribuição: Bacias dos rios da Morte e Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1976).

***Cynopotamus amazonus* Günter, 1868**

Localidade-tipo: Xeberos, Peru.

Distribuição: Bacias Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1976).

***Cynopotamus argenteus* Valenciennes, 1836**

Localidade-tipo: Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai, Paraná inferior e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1976).

***Cynopotamus gouldingi* Menezes, 1987**

Localidade-tipo: Rio Madeira em Calama, Estado de Rondônia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Madeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes (1987b).

***Cynopotamus juruena* Menezes, 1987**

Localidade-tipo: Alto rio Juruena, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Rio das Mortes e bacia do rio Madeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes (1987b).

***Cynopotamus tocantinensis* Menezes, 1987**

Localidade-tipo: Igarapé Pojuca, rio Itacaiunas, Serra dos Carajás, Estado do Pará, Brasil  
Distribuição: Bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes (1987b).

***Galeocharax gulo* Cope, 1870**

Localidade-tipo: Pebas, Peru.  
Distribuição: Bacias do rio São Francisco e Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Menezes (1976).

***Galeocharax humeralis* Valenciennes, 1834**

Localidade-tipo: América Meridionalis (Buenos Aires, rio de La Plata).  
Distribuição: Bacias do rio Paraguai e Paraná inferior.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Menezes (1976).

***Galeocharax knerii* Steinachner, 1875**

Localidade-tipo: Oriçanga, rio Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes (1976).

**Família Characidae: Characinae: Heterocharacini**

Mônica Toledo-Piza &

Carlos A. Santos de Lucena

***Gnatocharax steindachneri* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Igarapé da Candelária, rio Madeira.  
Distribuição: Bacias Amazônica e dos rios, Orinoco e Essequibo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Böhlke (1955).

***Heterocharax leptogrammus* Toledo-Piza, 2000**

Localidade-tipo: Rio Arirará, perto da boca, Bacia do rio Negro, 20°S 63°40'W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Negro e alto Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Toledo-Piza (2000a).

***Heterocharax macrolepis* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Rockstone, Guiana.

Distribuição: Bacias Amazônica e dos rios Orinoco, Essequibo e Demerara.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Géry (1966b), Toledo-Piza (2000a).

***Heterocharax virgatus* Toledo-Piza, 2000**

Localidade-tipo: Rio Negro, confluência com rio Urubaxi, Estado do Amazonas, Brasil, 0°35'S 64°45'W.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Toledo-Piza (2000a).

***Hoplocharax goethei* Géry, 1966**

Localidade-tipo: Igarapé da Mãe Joana, próximo a Manaus, rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Cobb (1975).

***Lonchogenys ilisha* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Rio Negro, Cucui, Colômbia.

Distribuição: Bacias do Negro e alto Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry (1966b).

**Família Characidae: Cheirodontinae**

Luiz Roberto Malabarba

***†Megacheiroduon unicus* (Travassos & Santos, 1955)**

Localidade-tipo: Taubaté, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Formação Tremembé, bacia de Taubaté, Oligoceno - Mioceno Inferior (30-25 Myr).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1998a).

***Acinocheiroduon melanogramma* Malabarba & Weitzman, 1999**

Localidade-tipo: Córrego Cachoeira, tributário do rio Jequitáí, bacia do São Francisco, Bocaiúva, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacias do São Francisco e Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aphyocheiroduon hemigrammus* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Jaguará, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cheirodon ibicuensis* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Rio Ibicuí, Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai, sistema da laguna dos Patos e sistema do rio Tramandaí.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Cheirodon interruptus* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Maldonado, Uruguai.

Distribuição: Bacia do Uruguai, bacia do baixo Paraná, sistema da laguna dos Patos e sistema do rio Tramandaí.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1915).

***Cheirodon parahybae* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Rio Paraíba, Campos, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Compsura heterura* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Queimadas, rio Itapicuru, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias do São Francisco e rios costeiros do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Heterocheirodon jacuiensis* Malabarba & Bertaco, 1999**

Localidade-tipo: Lagoa na margem esquerda do rio Jacuí, junto a BR 290, Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema da laguna dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Heterocheirodon yatai* (Casciotta, Miquelarena & Protogino, 1992)**

Localidade-tipo: Arroyo El Palmar, Paraje La Glorieta, Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina.

Distribuição: Bacias do Uruguai e baixo Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Malabarba & Bertaco (1999).

***Kolpotocheirodon figueiredoi* Malabarba, Lima & Weitzman, 2004**

Localidade-tipo: Rio Pratinha, Fazenda Pratinha, Iraquara, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Rio Pratinha, bacia do rio Paraguaçu, Estado da Bahia, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Kolpotocheirodon theloura* Malabarba & Weitzman, 2000**

Localidade-tipo: Curva da Morte, Goiás, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do São Francisco e Paraná, Estados de Minas Gerais e Goiás, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Macropsobrycon uruguayanae* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Cacequi, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai, sistema da laguna dos Patos e sistema do rio Tramandaí.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Odontostilbe fugitiva* Cope, 1870**

Localidade-tipo: Yuto cocha na margem direita do rio Mazán, 3°30'53"S 73°10'05"W, drenagem do baixo rio Napo, bacia Amazônica, Loreto, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 35775).

Referência: Bärnheim & Malabarba (2006).

Observações: Neótipo designado por Bärnheim & Malabarba (2006)

***Odontostilbe nareuda* Bürhnheim & Malabarba, 2006**

Localidade-tipo: Lago na margem direita do rio Nareuda, aproximadamente 3-4 km a montante da desembocadura do rio Tahuamanu, drenagem do rio Orthon, bacia do rio Madeira, Pando, Bolívia.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 38417).

***Odontostilbe paraguayensis* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai e baixo Paraná.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 18580).

Referência: Malabarba (1988).

***Odontostilbe parecis* Bürhnheim & Malabarba, 2006**

Localidade-tipo: Corredeira Papagaio, BR-174, próximo à BR-364, rio Galera, bacia do alto Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Galera e rio Novo, na bacia do alto rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Odontostilbe pequirá* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraguai, baixo rio Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Prodontocharax alleni* Böhlke, 1953**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, Cashiboya, Peru.

Distribuição: Rios Solimões, Japurá e Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 12407).

***Prodontocharax melanotus* Pearson, 1924**

Localidade-tipo: Tumupasa, Bolívia.

Distribuição: Costa Marques (divisa com Bolívia), no rio Guaporé.

Documentação primária: Lote de referência (AMNH 39738).

***Serrapinnus calliurus* (Boulenger, 1900)**

Localidade-tipo: Corandasiño, Brasil; San Lorenzo, Província de Jujuy, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai, baixo Paraná, Uruguai, e sistema da laguna dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Serrapinnus heterodon* (Eigenmann, 1915)**

Localidade-tipo: Jaguará, rio Grande, afluente do rio Paraná, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto Paraná e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Serrapinnus kriegi* (Schindler, 1937)**

Localidade-tipo: Centurión, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 35921).

Referência: Malabarba (1988).



***Serrapinnus microdon* (Eigenmann, 1915)**

Localidade-tipo: Cáceres, alto rio Paraguai, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Serrapinnus micropterus* (Eigenmann, 1907)**

Localidade-tipo: Santarém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Serrapinnus notomelas* (Eigenmann, 1915)**

Localidade-tipo: Lago a 4 milhas de Miguel Calmone, bacia do Tietê, Brasil.

Distribuição: Alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Serrapinnus piaba* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco e rios costeiros do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1988).

***Spintherobolus ankoseion* Weitzman & Malabarba, 1999**

Localidade-tipo: Riacho na floresta, perto de Barra do Sai, entre Barra do Sai e Itapema, norte do Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Em torno da Baía de Paranaguá, Estado do Paraná, e em torno da Barra do Sai, norte do Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Spintherobolus broccae* Myers, 1925**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Baixada Fluminense, à leste à oeste da Baía da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro; em Santos, Estado de São Paulo, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Malabarba (1999).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Município do Rio de Janeiro.

***Spintherobolus leptoura* Weitzman & Malabarba, 1999**

Localidade-tipo: Rio Quilombo, fazenda Dalila, Registro, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Spintherobolus papilliferus* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Alto da Serra, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Malabarba (1999).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

## Família Characidae: Clupeacharacinae

Flávio Cesar Thadeo de Lima

### ***Clupeacharax anchoveoides* Pearson, 1924**

Localidade-tipo: Cachuela Esperanza [alto rio Beni, Bolívia].

Distribuição: Alto Amazonas; bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Britski *et al.* (1999).

## Família Characidae: Glandulocaudinae

Naércio Aquino Menezes

### ***Diapoma speculiferum* Cope, 1894**

Localidade-tipo: Rio Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rios e riachos costeiros e bacia do rio Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Fink (1985).

### ***Diapoma terofali* Géry, 1964**

Localidade-tipo: Canal El Cazador, rio Lujón, Província de Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Rio Uruguai inferior no sul do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman & Fink (1985).

### ***Glandulocauda melanogenys* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Alto da Serra, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto curso do rio Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

### ***Glandulocauda melanopleura* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Rio Iguaçu, Serrinha, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Alto rio Iguaçu, no Estado do Paraná e Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Paraná.

### ***Hysteronotus megalostomus* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Fowler (1951a).

### ***Lophiobrycon weitzmani* Castro, Ribeiro, Benine & Melo, 2003**

Localidade-tipo: Córrego Bom Jesus (bacia do rio Grande), 20°12'10"S 46°55'22"W, Estância Carmen Sílvia, Município de Delfinópolis, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Mimagoniates inequalis* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Gualba e lagoas costeiras adjacentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

***Mimagoniates lateralis* Nichols, 1913**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Riachos do Sudeste do Brasil entre Santos, Estado de São Paulo e Joinville, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Mimagoniates microlepis* Steindachner, 1877**

Localidade-tipo: Rio dos Macacos(= Macacu), Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros entre o sul do Estado da Bahia e norte do Estado do Rio grande do Sul e alto Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

***Mimagoniates rheocharis* Menezes & Weitzman, 1990**

Localidade-tipo: Rio Faxinalzinho em Mãe dos Homens, Município de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Riachos do Sudeste do Brasil entre o sul do Estado de Santa Catarina e norte do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Mimagoniates sylvicola* Menezes & Weitzman, 1990**

Localidade-tipo: Riacho próximo à fazenda Embaçuaba (= Embassuaba), Município de Prado, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Riachos costeiros do sul do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Weitzman (1990).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Mimagoniates sp. 1***

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 4233).

***Planaltina britski* Menezes, Weitzman & Burns, 2003**

Localidade-tipo: Córrego da Barra Funda, afluente do rio Preto, bacia do rio Grande, aproximadamente 20°37'S 49°23'W, Brasil.

Distribuição: Afluentes do rio Grande e rio Tietê, alto Paraná, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes *et al.* (2003).

***Planaltina glandipedis* Menezes, Weitzman & Burns, 2003**

Localidade-tipo: Rio Corumbataí, aproximadamente 22°13'S 47°38'W, Corumbataí, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rios Corumbataí e Jacaré-Pepira, bacia do rio Tietê, alto Paraná, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes *et al.* (2003).

***Planaltina myersi* Böhlke, 1954**

Localidade-tipo: Riacho Sarandí, Chapadão do Sarandí, próximo de Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Distribuição: Afluente do rio São Bartolomeu, bacia do rio Parnaíba, DF.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Böhlke (1954), Menezes *et al.* (2003).

***Pseudocorynopoma doriae* Perugia, 1891**

Localidade-tipo: Rio de La Plata, Argentina.

Distribuição: Bacia do Uruguai no Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman (2003).

***Pseudocorynopoma heterandria* Eigenmann, 1914**

Localidade-tipo: Xiririca (=Eldorado, Estado de São Paulo, Brasil).

Distribuição: Alto curso do rio Tietê e bacia do Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman (2003).

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

***Tyttocharax madeirae* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Tributário do rio Madeira, próximo de Porto Velho, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Fink (1985).

***Xenrobrycon coracoralinae* Moreira, 2005**

Localidade-tipo: rio Agapito, rodovia BR-070, aproximadamente 15°56'S 50°09'W, tributário do rio Vermelho, bacia do Araguaia, Município de Goiás, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Xenrobrycon macropus* Myers & P.de Miranda Ribeiro, 1945**

Localidade-tipo: Rio Bodoquena, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e Paraná Inferior.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Fink (1985).

***Xenrobrycon pteropus* Weitzman & Fink, 1985**

Localidade-tipo: Igarapé Fonte Boa, aproximadamente 2°30'S 67°2'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Fink (1985).

## Família Characidae: Iguanodectinae

Cristiano Luis Rangel Moreira &  
Leonardo Ferreira da Silva Ingenito

### ***Iguanodectes adujai* Géry, 1970**

Localidade-tipo: Rio Adujá, afluente do rio Itu, tributário do rio Araçá, bacia do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Negro e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1993).

### ***Iguanodectes geisleri* Géry, 1970**

Localidade-tipo: Igarapé de Paricá (aproximadamente 1°05' S 62°10' W), rio Jufari, tributário do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Madeira, Negro e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1993).

### ***Iguanodectes gracilis* Géry, 1993**

Localidade-tipo: Rio Mamolé, afluente do rio Cuiuni, perto de Barcelos, bacia rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1993).

### ***Iguanodectes polylepis* Géry, 1993**

Localidade-tipo: Afluente do rio Ituxiou ou rio Ipixuna (Paraná Pixuna), tributário do rio Purus, a oeste da cidade de Humaitá, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Madeira e Purus.  
Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Iguanodectes purusii* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Purus, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Guaporé, Madeira, Pastaza e Purus.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Géry (1970), Géry (1993).

### ***Iguanodectes rachovii* Regan, 1912**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, em Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Rio Amazonas de Manaus até Belém, e rios costeiros imediatamente norte e sul da boca do Amazonas, incluindo a bacia do rio Capim.  
Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Iguanodectes spilurus* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio Cupai, bacia do rio Tapajós, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Essequibo, Orinoco e Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1993).

***Iguanodectes variatus* Géry, 1993**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, 5 km à montante da cachoeira/barragem de Samuel, bacia do rio Madeira, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Branco, Guaporé, Trombetas e Urubu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Piabucus dentatus* (Koelreuter, 1763)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacias dos rios Orinoco e Casiquiare, baixo curso do rio Amazonas, e bacias costeiras entre a desembocadura dos rios Orinoco e Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann & Myers (1929).

***Piabucus melanostomus* Holmberg, 1891**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, bacia do rio da Prata, em Formosa (Argentina) e Assunção (Paraguai).

Distribuição: Bacias dos rios Madeira e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann & Myers (1929).

**Família Characidae: Serrasalminae**

Michael Jegu &

Leonardo Ferreira da Silva Ingenito

***Acnodon normani* Gosline, 1951**

Localidade-tipo: Rio Santa Teresa, tributário do alto Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Xingu e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Jegu & Santos (1990), Géry (1979).

***Acnodon senai* Jegu & Santos, 1990**

Localidade-tipo: Praia na ponta da ilha de Carapatinho, rio Jari, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Jari.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Catoprion mento* (Cuvier, 1819)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e bacias dos rios Orinoco, Essequibo e alto Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Britski *et al.* (1999), Fowler (1950), Ferreira *et al.* (1998).

***Colossoma macropomum* (Cuvier, 1818)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Fowler (1950), Ferreira *et al.* (1998).

Estado de conservação: Sobreexplorada ou ameaçada de sobreexploração.

***Metynnis argenteus* Ahl, 1923**

Localidade-tipo: Rio Tapajós perto de Borim, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Zarske & Géry (1999), Ferreira *et al.* (1998).

***Metynnis fasciatus* Ahl, 1931**

Localidade-tipo: Rio Capiuru, Sistema Amazônico, Brasil.

Distribuição: Médio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zarske & Géry (1999).

***Metynnis guaporensis* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Rio Guaporé em Maciel, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zarske & Géry (1999).

***Metynnis hypsauchen* (Müller & Troschel, 1844)**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Bacia Amazônica e rios das Guianas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Fowler (1950), Ferreira *et al.* (1998).

***Metynnis lippincottianus* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e rios das Guianas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1950), Zarske & Géry (1999).

***Metynnis maculatus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé [Estado do Mato Grosso, Brasil].

Distribuição: Bacias Amazônica e do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Zarske & Géry (1999), Britski *et al.* (1999).

***Metynnis mola* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Arroio Trementina, Paraguai.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e baixo Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Fowler (1950), Zarske & Géry (1999), Britski *et al.* (1999).

***Mylesinus paraschomburgkii* Jégu, Santos & Ferreira, 1989**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, abaixo da Cachoeira Vira-Mundo, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Afluentes da margem esquerda do baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Jégu *et al.* (1992a).

***Mylesinus paucisquamatus* Jégu & Santos, 1988**

Localidade-tipo: Jatobal, rio Tocantins, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Pará.

***Myleus altipinnis* (Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Fowler (1950).

***Myleus micans* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas e rio Taquaruçu, bacia do rio São Francisco, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Britski *et al.* (1986).

***Myleus setiger* Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.  
Distribuição: Bacia do baixo e médio Amazonas, bacia do alto rio Orinoco e rios das Guianas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Jégu & Santos (2002).

***Myloplus arnoldi* Ahl, 1936**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Xingu e Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Myloplus asterias* (Müller & Troschel, 1844)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.  
Distribuição: Bacia Amazônica e rios das Guianas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Toledo-Piza (2002), Jégu *et al.* (2004).  
Observações: Reabilitação de *Myloplus* Gill.

***Myloplus levis* (Eigenmann & McAtee, 1907)**

Localidade-tipo: Bahia Negra, Paraguai.  
Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e baixo Paraná.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Gosline (1951), Britski *et al.* (1999).

***Myloplus lobatus* (Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Myloplus rhomboidalis* (Cuvier, 1818)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica e rios das Guianas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Fowler (1950).

***Myloplus rubripinnis* (Müller & Troschel, 1844)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.  
Distribuição: Bacia Amazônica e do Orinoco e rios das Guianas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Fowler (1950), Jégu *et al.* (2004).



***Myloplus schomburgkii* (Jardine & Schomburgk, 1841)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Médio e baixo Amazonas e afluentes, rio Nanay, bacia do rio Orinoco e provavelmente Suriname.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Toledo-Piza (2002), Ferreira *et al.* (1998).

***Myloplus ternetzi* (Norman, 1929)**

Localidade-tipo: Corredeiras do Maparú, Rio Approuage, Guiana Francesa.

Distribuição: Rios do Escudo das Guianas na Guiana Francesa e no Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 15723; INPA 15724).

***Myloplus tiete* (Eigenmann & Norris, 1900)**

Localidade-tipo: Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Fowler (1950).

Estado de conservação: Vulnerável (as *Myleus tiete*).

Categoria de ameaça em listas regionais: Quase ameaçada (como "*Myleus tiete*") no Estado do Paraná.

***Myloplus torquatus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Branco, Marabitanos, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Negro e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Fowler (1950).

***Mylossoma aureum* (Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rios equatoriais do Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1950), Ferreira *et al.* (1998).

***Mylossoma duriventre* (Cuvier, 1818)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e bacias dos rios Orinoco, Paraguai e baixo Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1950), Ferreira *et al.* (1998), Britski *et al.* (1999).

***Ossubtus xinguense* Jégu, 1992**

Localidade-tipo: Altamira, rio Xingu, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu, Estado do Pará.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Pará.

***Piaractus brachypomus* (Cuvier, 1818)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998).

***Piaractus mesopotamicus* (Holmberg, 1887)**

Localidade-tipo: Paraguai.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e Paraná inferior.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Pristobrycon aureus* (Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Lagos e rios equatoriais do Brasil.

Distribuição: Cursos inferiores dos afluentes do baixo Amazonas e rios da Guiana.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Fowler (1950).

***Pristobrycon calmoni* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco e rios da Guiana.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Jégu & Santos (1988), Ferreira *et al.* (1998).

***Pristobrycon eigenmanni* Norman, 1929**

Localidade-tipo: Rockstone, Guiana.

Distribuição: Rios do Escudo das Guianas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Jégu & Santos (1988).

***Pristobrycon striolatus* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco e rios do Escudo das Guianas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fowler (1950).

***Pygocentrus nattereri* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Cuiabá e Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica, do Paraguai, do Paraná inferior e rios costeiros do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Kner (1860), Britski *et al.* (1999), Fink (1993).

***Pygocentrus piraya* (Cuvier, 1819)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1986).

***Serrasalmus altispinis* Merckx, Jégu & Santos, 2000**

Localidade-tipo: Corredeiras Quarenta Ilhas, rio Pitinga, bacia do Uatumã, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Uatumã, Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Serrasalmus brandti* (Lütken, 1875a)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1986).

***Serrasalmus compressus* Jégu, Leão & Santos, 1991**

Localidade-tipo: Laguna Mocovi, rio Mocovi afluente do Mamoré, província de Beni, Bolívia.

Distribuição: Médio Amazonas e afluentes.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fink & Machado-Allison (2001).

***Serrasalmus elongatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1950), Ferreira *et al.* (1998).

***Serrasalmus geryi* Jégu & Santos, 1988**

Localidade-tipo: Araguacema, rio Araguaia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins, Estado do Pará.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Serrasalmus gibbus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Rio Araguay (=rio Araguaia), Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Jégu & Santos (1988).

***Serrasalmus gouldingi* Fink & Machado-Allison, 1992**

Localidade-tipo: Anavilhanas, rio Negro, Brasil, 2°50'S, 61°00'W.

Distribuição: Bacias dos rios Negro, Japurá (Brasil) e Orinoco (Venezuela).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Serrasalmus hastatus* Fink & Machado-Allison, 2001**

Localidade-tipo: Praia, Marará, rio Branco, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro, Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Serrasalmus hollandi* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Rio Guaporé em Maciel, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira e provavelmente rios da Guiana.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Fowler (1950).

***Serrasalmus humeralis* Valenciennes, 1850**

Localidade-tipo: Estado do Amazonas [Brasil].

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Jégu & Santos (1988).

***Serrasalmus maculatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Paraguai e Paraná inferior.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Kner (1860), Jégu & Santos (2001), Britski *et al.* (1999).

***Serrasalmus manueli* (Fernández-Yepez & Ramirez, 1967)**

Localidade-tipo: Rio Paraguaza, afluente da margem direita do médio Orinoco, Venezuela.

Distribuição: Bacias dos rios Negro (Brasil) e Orinoco (Venezuela).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Toledo-Piza (2002), Saint-Paul *et al.* (2000).

***Serrasalmus marginatus* Valenciennes, 1836**

Localidade-tipo: Rio Paraná, Brasil.

Distribuição: bacia dos rios Paraguai e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Serrasalmus nigricans* (Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rios equatoriais do Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Serrasalmus rhombeus* (Linnaeus, 1766)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco, rios do Esudo das Guianas e rios costeiros do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Merckx *et al.* (2000), Ferreira *et al.* (1998).

***Serrasalmus serrulatus* (Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Bacia Amazônica, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e provavelmente do rio Essequibo (Guiana).

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Castelnau (1855) assinala como Localidade tipo desta espécie Araguay (=rio Araguaia).

***Serrasalmus spilopleura* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso, rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Guaporé e Paraguai, Estado do Mato Grosso.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Kner (1860), Jégu & Santos (2001).

***Tometes makue* Jégu, Santos & Belmont-Jégu, 2002**

Localidade-tipo: Ilha do Acará, a jusante de São Miguel da Cachoeira, rio Negro, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Negro e Orinoco (Brasil e Venezuela).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Tometes trilobatus* Valenciennes, 1850**

Localidade-tipo: Caiena, Guiana Francesa [Embarque em Caiena].

Distribuição: Bacia do rio Oiapoque (Guiana Francesa e Brasil) e bacias dos rios Flexal e Araguari, Estado do Amapá.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Jégu *et al.* (2002).

***Utiaitichthys longidorsalis* Jégu, Tito de Moraes & Santos, 1992**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, 3 km da parte superior da Cachoeira de Dardanelos, bacia do rio Madeira, 9°10'S, 60°40'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Utiaritichthys sennaebregai* Miranda Ribeiro, 1937**

Localidade-tipo: Acima do Salto Utiarity, afluente do rio Papagaio, Estado do Mato Grosso, 13°S, 58°15'W, Brasil.  
Distribuição: Afluentes da margem direita da parte média e inferior do rio Amazonas (Brasil) e bacia do rio Orinoco (Venezuela).  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Jégu *et al.* (1992b).

**Família Characidae: Stethaprioninae**

Roberto Esser dos Reis

***Brachyhalcinus copei* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Tabatinga, rio Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Solimões e Madeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1989).

***Brachyhalcinus parnaibae* Reis, 1989**

Localidade-tipo: Lagoas, Serra das Confusões, bacia do Parnaíba, Caracol, Estado do Piauí, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Parnaíba.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1989).

***Brachyhalcinus retrospina* Boulenger, 1892**

Localidade-tipo: Santa Cruz, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1989).

***Orthospinus franciscensis* (Eigenmann, 1914)**

Localidade-tipo: Barreiras, lagoas de Rio Grande, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1989).

***Poptella brevispina* Reis, 1989**

Localidade-tipo: Igarapé Apeú, Boa Vista, Castanhal, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Trombetas, alto Branco e baixo Tocantins; drenagens costeiras do Estado do Pará, Guyana e Suriname.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1989).

***Poptella compressa* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Essequibo, Guiana.  
Distribuição: Bacias do Orinoco e Amazônica, drenagens costeiras da Venezuela, Guyana e nordeste do Brasil.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Reis (1989).

***Poptella longipinnis* (Popta, 1901)**

Localidade-tipo: Beneden-Nickerie, entre o "Manilie-kreek" e o Arrawarra, Suriname.  
Distribuição: Bacia do Orinoco, drenagens do Suriname e baixo Tocantins.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Reis (1989).

***Poptella paraguayensis* (Eigenmann, 1907)**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Paraguay e baixo Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1989).

***Stethaprion crenatum* Eigenmann, 1916**

Localidade-tipo: San Joaquin, Bolívia.  
Distribuição: Bacia do Purus, Madeira e baixo Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Reis (1989).

***Stethaprion erythrops* Cope, 1870**

Localidade-tipo: Pebas, Peru.  
Distribuição: Bacia do alto Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Reis (1989).

**Família Characidae: Tetragonopterinae**

Paulo Andreas Buckup

***Tetragonopterus argenteus* Cuvier, 1816**

Localidade-tipo: Desconhecida.  
Distribuição: Bacia do Prata.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Britski *et al.* (1999).

***Tetragonopterus chalcus* Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Brasil equatorial.  
Distribuição: Bacia Amazônica e bacias costeiras do nordeste da América do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Characidae: Triportheinae**

Paulo Andreas Buckup

***Lignobrycon myersi* (Miranda Ribeiro, 1956)**

Localidade-tipo: Rio do Braço, Ilhéus, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio do Braço.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Castro & Vari (1990), Malabarba (1998b).  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Triportheus albus* Cope, 1872**

Localidade-tipo: Ambyiacu, Peru.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Tocantins.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Malabarba (2004b).

***Triportheus angulatus* (Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio Solimões, ilha do Pregó, 3°10'37"S 64°48'1"W, em frente a Alvarães, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Essequibo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Malabarba (2004b).  
Observações: Neótipo designado por Malabarba (2004).

***Triportheus auritus* (Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Anavilhanas, 2°42'S 60°45'W, rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica, do Tocantins, do Orinoco e ilha de Trinidad.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Malabarba (2004b).  
Observações: Neótipo designado por Malabarba (2004).

***Triportheus brachipomus* (Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1850)**

Localidade-tipo: Rio Mana, Guiana Francesa.  
Distribuição: Bacias do Orinoco, Essequibo, Demerara, Courantijne, Maroni e Araguari.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Malabarba (2004a).  
Observações: Lectótipo designado por Malabarba (2004).

***Triportheus culter* (Cope, 1872)**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Malabarba (2004b).

***Triportheus curtus* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Arari, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica e foz do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Malabarba (2004b).

***Triportheus guentheri* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco "below the falls", [Estado de Minas Gerais, Brasil].  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Malabarba (2004b).

***Triportheus nematurus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraguai e baixo Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Malabarba (2004b).  
Observações: Lectótipo designado por Malabarba (2004).

***Triportheus pantanensis* Malabarba, 2004**

Localidade-tipo: Poço sob ponte da rodovia Transpantaneira, 16°51'S 56°50'W, 70 Km de Poconé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraguai e do baixo rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (2004a).

***Triportheus pictus* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Jutai, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (2004b).

***Triportheus rotundatus* (Jardine, in Schomburgk, 1841)**

Localidade-tipo: Lago Amapá, 20°2'36"S, 67°50'24"W, bacia do rio Purus, Estado do Acre, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (2004b).

Observações: Neótipo designado por Malabarba (2004).

***Triportheus signatus* (Garman, 1890)**

Localidade-tipo: Rio Puti [bacia do Parnaíba, Estado do Piauí, Brasil].

Distribuição: Bacias do Parnaíba, Mearim-Pindaré e Itapicuru no Nordeste brasileiro; introduzida artificialmente no Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Malabarba (2004a), Malabarba (2004b).

***Triportheus trifurcatus* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Araguaia, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias do Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (2004b).

**Família Characidae *incertae sedis***

Flávio Cesar Thadeo de Lima,  
Paulo Andreas Backup,  
Naércio Aquino Menezes,  
Carlos Alberto Santos de Lucena,  
Zilda Margarete S. de Lucena,  
Mônica Toledo-Piza &  
Angela Zanata

***"Deuterodon" parahybae* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Itapemirim, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Itapemirim.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: A inserção deste táxon no gênero *Astyanax* exigiria um novo nome científico, tendo em vista a homonímia com *Astyanax parahybae* Eigenmann, 1908.

***Astyanacinus goyanensis* Miranda Ribeiro, 1944**

Localidade-tipo: Rio do Couro, Veadeiros, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Astyanacinus moorii* (Boulenger, 1892)**

Localidade-tipo: Chapala Plateau(= Chapada Diamantina), Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax abramis* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Rio Paraná, até Rosário, [Argentina].

Distribuição: Bacia do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax altiparanae* Garutti & Britski, 2000**

Localidade-tipo: Rio Grande, represa de Volta Grande, aproximadamente 20°10'S 48°03'W, Miguelópolis, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax anterior* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax argyrimarginatus* Garutti, 1999**

Localidade-tipo: Aragarças, Córrego Jaraguá, bacia do Rio Araguaia, aproximadamente 15°55'S 52°15'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax asuncionensis* Géry, 1972**

Localidade-tipo: Rio Paraguay e alto rio Tocantins.

Distribuição: Bacias do Paraguai, baixo Paraná e alto rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: A distribuição disjunta envolvendo as bacias do Prata e do Tocantins deve ser investigada, visto que a designação dos síntipos baseou-se na hipótese de que este táxon fosse conspecífico com *Astyanax bimaculatus*.

***Astyanax bimaculatus* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: "America Meridionali".

Distribuição: Bacia Amazônica e drenagens atlânticas situadas entre o Panamá e a foz do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Garutti (1995).

Observações: Esta espécie necessita de cuidadosa revisão taxonômica, assim com a ampla distribuição geográfica registrada na literatura.

***Astyanax biotae* Castro & Vari, 2004**

Localidade-tipo: Fazenda Água Mole, 22°38'31,7"S 52°48'59,0"W, Município de Diamante do Norte, Estado do Paraná, bacia do Paranapanema, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax bourgeti* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax brachypterygium* Bertaco & Malabarba, 2001**

Localidade-tipo: Arroio Água Branca, 28°36'S 50°24'W, alt. 1050 m, Município de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras da bacia do Uruguai e do Jacuí, acima de 1000 m de altitude no planalto da Serra Geral.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Rio Grande do Sul.

***Astyanax brevirostris* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Rio Jequitinhonha, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax cremnobates* Bertaco & Malabarba, 2001**

Localidade-tipo: Tributário do rio Santa Cruz, 29°23'S 50°32'W, alt. 850 m, Município de São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras de planalto da bacia do Jacuí e bacia do Maquiné, no Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax depressirostris* Miranda Ribeiro, 1908**

Localidade-tipo: Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Espécie com status taxonômico incerto.

***Astyanax dnophos* Lima & Zuanon, 2004**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Costa Júnior, 03°29'37"S 52°20'10"W, Altamira, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Xingu, na região de Altamira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax eigenmanniorum* (Cope, 1894)**

Localidade-tipo: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da lagoa dos Patos, bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax elachylepis* Bertaco & Lucinda, 2005**

Localidade-tipo: Ribeirão Arara, 14°02'S 48°26'W, cerca de 500 m da boca do rio Maranhão em Rosariana, Município de Niquelândia, Estado de Goiás, Brasil

Município de Niquelândia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax fasciatus* (Cuvier, 1819)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo & Buckup (2006).

***Astyanax giton* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Rio Paraíba [do Sul], Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul e drenagens costeiras dos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo (2001).

***Astyanax goyacensis* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax gracilior* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Óbidos e Vila Bela, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax guaporensis* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Maciel, Rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax gymnogenys* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Porto União, rio Iguaçu, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

***Astyanax hastatus* Myers, 1928**

Localidade-tipo: Região do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros da Baixada Fluminense.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo (2001).

***Astyanax henseli* Melo & Buckup, 2006**

Localidade-tipo: Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do Sinos e do Taquari, ao norte de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax intermedius* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraíba do Sul e rio Mucuri.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo (2001).

***Astyanax jacuhiensis* (Cope, 1894)**

Localidade-tipo: Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Espécie com status taxonômico incerto.

***Astyanax janeiroensis* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraíba do Sul e rios costeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo (2001).

***Astyanax jenynsi* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba [do Sul], Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Melo (2001).

***Astyanax kullanderi* Costa, 1995**

Localidade-tipo: Tributário do rio das Mortes, próximo à BR-70, cerca de 10 Km a oeste de Primavera do Leste, 15°32'S 54°18'W, Estado de Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Araguaia.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax lacustris* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa e rios próximos, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax laticeps* (Cope, 1894)**

Localidade-tipo: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax leopoldi* Géry, Planquette & Le Bail, 1988**

Localidade-tipo: Médio rio Oiapoque, em Salto Alicoto, a montante de Camopi, Guiana Francesa.  
Distribuição: Bacias dos rios Oiapoque e Approuage.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax lineatus* (Perugia, 1891)**

Localidade-tipo: Vila Maria, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Prata.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax maculisquamis* Garutti & Britski, 1997**

Localidade-tipo: Pontes e Larcerda, aproximadamente 15°12'S 59°22'W, Estado do Mato Grosso, poça em córrego afluente do rio Guaporé (cerca de 7 km da ponte), bacia do rio Madeira, bacia Amazônica, Brasil.  
Distribuição: Cabeceiras do rio Guaporé (bacia do Madeira).  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax marionae* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: 6 milhas de São Luiz de Cáceres, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax microscemos* Bertaco & Lucena, 2006**

Localidade-tipo: Córrego Palmital, aproximadamente 20°21'S 41°31'W, bacia do Itapemirim, Iúna, Estado do Espírito Santo, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax multidentis* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Óbidos, e Silva, Lago Saraca, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax obscurus* (Hensel, 1870)**

Localidade-tipo: Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da lagoa do Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo & Buckup (2006).

***Astyanax parahybae* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, entre Barra do Pirai, Três Rios (ao longo da antiga estrada do Imperador Dom Pedro II), Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraíba do Sul, rio São João e rio Macaé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo (2001).

***Astyanax paranae* Eigenmann, 1914**

Localidade-tipo: Estado do Paraná [na localidade de Castro de acordo com Garutti & Britski, 2000: 81],

Distribuição: Bacia do rio Paranapanema.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax paranahybae* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Rio Paranaíba, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax pedri* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Rio Santo Antônio, alto rio Doce, Ferros, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Santo Antonio, Estado de Minas Gerais.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax pelecus* Bertaco & Lucena, 2006**

Localidade-tipo: Rio Pardo, na rodovia BR-116, Cândido Sales, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax ribeirae* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Xiririca (= Eldorado) Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax rivularis* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas e afluentes, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax saltor* Travassos, 1960**

Localidade-tipo: Rio Cachimbo, abaixo do salto, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica no Escudo Brasileiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax scabripinnis* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Extinta no Município do Rio de Janeiro.

***Astyanax schubarti* Britski, 1964**

Localidade-tipo: Rio Mogi Guassu em Emas, Estado de São Paulo, à jusante da barragem, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax stilbe* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax symmetricus* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax taeniatus* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Córrego em Sossego, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraíba do Sul e rios costeiros dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Melo (2001).

***Astyanax totae* Haluch & Abilhoa, 2005**

Localidade-tipo: rio Cascata, tributário do rio Tortuoso, afluente do rio Iguaçu, distrito do Bugre, Município de Balsa Nova, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax trierythropterus* Godoy, 1970**

Localidade-tipo: Rio Mogi Guaçu, Cachoeira de Emas, a jusante da barragem, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax turmalinensis* Triques *et al.*, 2003**

Localidade-tipo: Córrego Divisão, tributário da margem direita do rio Jequitinhonha, Vima de Peixe-Crul, 42°57'W 17°07'S, Município de Turmalina, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do alto Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax unitaeniatus* Garutti, 1998**

Localidade-tipo: Ribeirão Macambira (aproximadamente 14°08'S–46°37'W), junto à ponte na rodovia GO-112, Iaciara, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Rio Paraná, bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astyanax* sp.**

Distribuição: Bacias do Uruguai e da laguna dos Patos.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14201).

Referência: Melo & Buckup (2006).

***Atopomesus pachyodus* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Cacuihy, Rio Negro, na fronteira Colombiana, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Axelrodia lindeae* Géry, 1973**

Localidade-tipo: Rio Curuçamba, cerca de 9 km ao norte de Óbidos, baixo Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Axelrodia stigmatias* (Fowler, 1913)**

Localidade-tipo: Tributário do rio Madeira, próximo a Porto Velho, Brasil.

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bario steindachneri* (Eigenmann, 1893)**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

***Brittanichthys axelrodi* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Bacia do rio Negro, praia Bulufu no rio Itu, aproximadamente 0°30'S 63°30'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Brittanichthys myersi* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Rio Negro, ilha sem nome, 10 km acima de Manaus, aproximadamente 3°10'S 59°55'W, Estado do Amazonas, Brasil

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconadenos tanaothoros* Weitzman, Menezes, Evers, Burns, 2005**

Localidade-tipo: Rio Suiá-Missu, tributário do alto rio Xingu, Fazenda Terra do Sol, a oeste da BR-158 a 12°50'90"S 52°07'46"W, Serra do Roncador, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Tributários das bacias do alto Xingu e alto Tapajós, no Estado do Mato Grosso.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconamericus ecai* Pezzi da Silva, 2004**

Localidade-tipo: Arroio na linha Brasil, paralela à estrada de Vila Deodoro a Venâncio Aires (afluente do arroio Castelhana, rio Taquari, drenagem da Laguna dos Patos), Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconamericus exodon* Eigenmann, *in* Eigenmann, McAtee & Ward, 1907**

Localidade-tipo: Puerto Max, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Bryconamericus iheringii* (Boulenger, 1887)**

Localidade-tipo: São Lourenço do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema da laguna dos Patos e rio Uruguai

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba & Kindel (1995).

***Bryconamericus ikaa* Casciotta *et al.*, 2004**

Localidade-tipo: Arroyo Tateto, 25°47'12,8"S 53°58'12,9"W, Misiones, Argentina.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Lote de Referência (MNRJ 26678).

***Bryconamericus lambari* Malabarba & Kindel, 1995**

Localidade-tipo: Arroio desaguando no arroio Feitoria, embaixo da ponte da avenida Ipiranga, Município de Dois Irmãos, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 51°07'W, 29°36'S.

Distribuição: Bacia do rio Cai, sistema da laguna dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Bryconamericus microcephalus* (Miranda Ribeiro, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Betari, afluente do rio Ribeira, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bizerril & Peres-Neto (1995).

***Bryconamericus novae* Eigenmann & Henn, 1914**

Localidade-tipo: Abaixo da Cachoeira da Velha perto de Piabanha, Rio Novo do Rio Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1927).

***Bryconamericus ornaticeps* Bizerril & Peres-Neto, 1995**

Localidade-tipo: Rio Macacu, Município de Cachoeira do Macacu, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio Macacu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconamericus patriciae* Pezzi da Silva, 2004**

Localidade-tipo: Arroio tributário do rio Pelotas, na estrada de Silveira para Rondinha (bacia do Uruguai), Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras dos rios Pelotas e das Antas, alto rio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconamericus stramineus* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Piracicaba, [Estado de São Paulo, Brasil]

Distribuição: Alto Paraná, rio Uruguai e rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1927).

***Bryconamericus tenuis* Bizerril & Araújo, 1992**

Localidade-tipo: Rio São João, Município de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio São João.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconamericus ternetzi* Myers, 1928**

Localidade-tipo: Corredeiras de Camanaus, rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Bryconamericus turiuba* Langeani et al., 2005**

Localidade-tipo: Ribeirão Santa Bárbara (drenagem do Tietê, alto Paraná), 20°57'59"S 50°1'6"W, Turiúba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani et al. (2005).

***Bryconamericus uporas* Casciotta et al., 2002**

Localidade-tipo: Arroyo Once Vueltas, 27°38'S 55°12'W, Munic. Leandro N. Alen, Misiones, Argentina.

Distribuição: Bacia do rio Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Langeani et al. (2005).

***Bryconella pallidifrons* (Fowler, 1946)**

Localidade-tipo: América do Sul, supostamente do rio Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry (1972).

***Bryconexodon juruena* Géry, 1980**

Localidade-tipo: Alto rio Juruena, bacia do rio Tapajós, próximo da estrada Cuiabá-Porto Velho, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconexodon trombetasi* Jégu, Santos & Ferreira, 1991**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, acima da junção do igarapé Caxipacoré, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconops alburnoides* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Branco.

Distribuição: Bacias Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconops cyrtogaster* (Norman, 1926)**

Localidade-tipo: Rio Oiapoque, Guiana Francesa.

Distribuição: Bacia do rio Oiapoque.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconops disruptus* Machado Allison & Chernoff, 1997**

Localidade-tipo: Boca do caño Darigua 7 km ao sul de San Carlos de Río Negro, Estado do Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do rios Negro e Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 51118).

***Bryconops durbini* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconops gracilis* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconops inpai* Knöppel, Junk & Géry, 1968**

Localidade-tipo: Igarapé Barro Branco, tributário da região inferior do rio Negro na "Reserva Ducke" (INPA) cerca de 30 km de Manaus, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Negro, incluindo a bacia do Casiquiare.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Bryconops transitoria* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Caiapobrycon tucurui* Malabarba & Vari, 2000**

Localidade-tipo: rio do Peixe, 14°28'S 48°45'W, tributário do rio Maranhão, Niquelândia, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Chalceus epakros* Zanata & Toledo-Piza, 2004**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, São Luís, acima de Itaituba, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Região central e baixa da Bacia Amazônica incluindo rios Madeira, Xingu, Tapajós, Negro, Branco, Trombetas e Tocantins-Araguaia. Bacia do Orinoco, Essequibo e Nanay.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Zanata & Toledo-Piza (2004).

***Chalceus erythrurus* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Rio Ampyiacu, Pebas, Peru.  
Distribuição: Rio Amazonas e Solimões (canal principal e porção baixa dos seus tributários) desde a região próxima de Manaus até a bacia do rio Ucayali no Peru.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: La Monte (1935), Zanata & Toledo-Piza (2004), Géry (1977).

***Chalceus guaporensis* Zanata & Toledo-Piza, 2004**

Localidade-tipo: Rio Itenez na boca do rio Baures, 6 Km SW de Costa Marques, Beni, Bolívia.  
Distribuição: Bacia dos rios Guaporé e Mamoré, rio Jaci-Paraná (bacia do alto Madeira) e Río Madre de Dios.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 16927.  
Referência: Zanata & Toledo-Piza (2004).

***Chalceus macrolepidotus* Cuvier, 1818**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Rio Negro e seus afluentes, bacia do médio e alto rio Orinoco, drenagem do rio Essequibo e provavelmente bacia do rio Guaporé.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Zanata & Toledo-Piza (2004), Géry (1977).

***Chalceus spilogyros* Zanata & Toledo-Piza, 2004**

Localidade-tipo: Igarapé Jacaré, margem direita do rio Tapajós, perto de Boim, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Trombetas, baixo rio Tapajós e rio Canumã (bacia do Madeira).  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Zanata & Toledo-Piza (2004).

***Coptobrycon bilineatus* (Ellis, 1911)**

Localidade-tipo: Alto da Serra, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto rio Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1966a).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Creagrus anary* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Rio Madeira, aproximadamente 320 km a leste da latitude 62°20'W.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fowler (1913), Vari & Harold (2001).

***Creagrus atrisignum* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Alto rio Maranhão, bacia do alto rio Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Maranhão, Estado de Goiás.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Myers (1927).

***Creagrus barrigai* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Rio Aguarico, próximo de San Pablo de Kantesiya, 0°15'18"S 76°25'30"W, Sucumbios, Equador.

Distribuição: Parte ocidental da Bacia Amazônica, no Peru, Equador e Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 30573.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrus britskii* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Ribeirão Macambira, aproximadamente 14°20'S 46°45'W próximo da ponte na rodovia GO 112, Iaciara, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins, Estado de Goiás.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrus cochui* Géry, 1964**

Localidade-tipo: Região do Alto Amazonas em volta de Iquitos, Loreto, Peru.

Distribuição: Parte ocidental da Bacia Amazônica, no Peru, Brasil e talvez Colômbia.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 28035.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrus cracentis* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, praias em uma ilha localizada 5 km ao sul de Itaituba (última localidade situada em 4°17'S 55°59'W), Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós, Estado do Pará.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrus figueredoi* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Rio Maranhão, bacia do alto rio Tocantins, aproximadamente 35 km aéreos ao norte de Brasília (aproximadamente 15°32'S 47°49'W), Distrito Federal, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Tocantins e Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus ignotus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Riacho 1, afluente do rio Preto na estrada para São Francisco, Município de Diamantino (Bacia do rio Arinos), Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Alto rio Tapajós, Estado do Mato Grosso.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus maxillaris* (Myers, 1927)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Cucuf, Estado do Amazonas, Brasil; também boca do (Rio) Curamoni, Rio Cassiquiare, Venezuela.

Distribuição: Alto rio Orinoco, Venezuela, alto rio Negro no Brasil e Venezuela e talvez alto rio Madeira.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCZ 31572.

Referências: Myers (1927), Vari & Harold (2001).

***Creagrutus menezesi* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Ribeirão Paranoá do Meio, aproximadamente 15°25'S 47°18'W, bacia do rio Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins e talvez bacias dos rios Branco e Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus meridionalis* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Ribeirão Chiqueirão (afl. Do rio Jangada, tributário do rio Cuiabá), aprox. 21 km a oeste de Jangada (última localidade em 15°14'S 56°29'W), na estrada para Barra do Bugres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraguai no Brasil e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus molinus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Riacho afluente do Ribeirão Lageadinho, Município de Alto Araguaia, aproximadamente 17°19'S 53°12'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus mucipu* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Porto do Rubão, rio Tocantins, Município de Minaçu, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus occidaneus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Praia ao longo do Rio Manu perto da boca do Quebrada Pachija, aproximadamente 11°57'S 71°17'W, Parque Nacional Manu, Pakitiza, Província Manu, Madre de Dios, Peru.

Distribuição: Bacia do Rio Manu, Peru e bacia do alto rio Purus no Brasil e Peru.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 49760.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus petilus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Rio Marco Rondon, Pimenta Bueno, aproximadamente 11°29'S 61°12'W, Estado de Rondônia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Machado, Estado de Rondônia.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus phasma* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Boca do (Rio) Curamoni, Rio Cassiquiare, Venezuela.  
Distribuição: Alto rio Negro, Brasil e rio Orinoco na Venezuela e Colômbia.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: ANSP 150050.  
Referências: Myers (1927), Vari & Harold (2001).

***Creagrutus runa* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Paraná do Jacaré, Rio Negro, aproximadamente 0°30'S 66°30'W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Negro no Brasil e Venezuela.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus saxatilis* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Rio Indaial, afluente da margem esquerda do rio Maranhão, bacia do rio Tocantins, Niquelândia, aproximadamente 14°12'S 48°37'W, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus seductus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Córrego Fundo, bacia do alto rio Araguaia, Município de Barra do Garças (aproximadamente 15°33'S 52°15'W), Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia, Estado do Mato Grosso.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus turyuka* Vari & Lima, 2003**

Localidade-tipo: Rio Tiquié, comunidade de Cachoeira Comprida, praia a jusanta da cachoeira, 0°15'44,0"S 70°01'05,2"W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Tiquié, tributário do Uauapés, bacia do Negro, no noroeste da Amazônia.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Creagrutus varii* Ribeiro *et al.*, 2004**

Localidade-tipo: Córrego da Prata (drenagem do rio São Marcos, bacia do Paranaíba), 17°47'26"S 47°35'48"W, Município de Catalão, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto Paranaíba.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Creagrutus vexillapinnus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Cachoeira de São Gabriel, Rio Negro, 0°08'S 67°20'W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Negro no Brasil e Venezuela e alto rio Orinoco, Venezuela.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari & Harold (2001).

***Creagrutus zephyrus* Vari & Harold, 2001**

Localidade-tipo: Rio Cassiquiare, cerca de 2 km da boca do rio Pamoni, 2°48'N 65°57'W.

Distribuição: Bacia do alto e médio rio Negro no Brasil e Venezuela.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari & Harold (2001).

***Ctenobrycon allenii* (Eigenmann & McAtee in Eigenmann et al., 1907)**

Localidade-tipo: Corumbá, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ctenobrycon hauxwellianus* (Cope, 1970)**

Localidade-tipo: Pebas, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fowler (1913).

***Cyanocharax alburnus* (Hensel, 1870)**

Localidade-tipo: Rio Cadeia, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da lagoa dos Patos e lagunas costeiras adjacentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Malabarba (1983), Malabarba & Weitzman (2003).

***Cyanocharax alegretensis* Malabarba & Weitzman, 2003**

Localidade-tipo: Arroio na estrada Santana do Livramento - Alegrete, Município de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Tributários do rio Ibicuí, no Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyanocharax dicropotamicus* Malabarba & Weitzman, 2003**

Localidade-tipo: Rio Forqueta, Marquês de Souza, Município de Lageado, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rios tributários da margem esquerda do rio Jacuí que drenam a Serra Geral.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyanocharax itaimbe* Malabarba & Weitzman, 2003**

Localidade-tipo: Arroio Falcão em Mãe dos Homens, tributário do rio Canoas-rio Mampituba, Município de Praia Grande, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias do Araranguá, Mampituba e Tramandaí.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyanocharax lepiclastus* Malabarba et al. in Malabarba & Weitzman, 2003**

Localidade-tipo: Rio Dourados, Linha Várzea, na estrada entre Severiano de Almeida e Aratiba, Município de Severiano de Almeida, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Trecho superior da bacia do Uruguai, das cabeceiras dos rios Pelotas e Canoas ao arroio Lageado União, no Brasil, e lesta da Província de Misiones, na Argentina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyanocharax tipiaia* Malabarba & Weitzman, 2003**

Localidade-tipo: Arroio Tipiaia, cerca de 13 Km ao norte de Júlio de Castilhos, na estrada para Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Pequenos tributários da vertente oeste da bacia do rio Jacuí, próximo a Júlio de Castilhos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cyanocharax uruguayensis* Messner, 1962**

Localidade-tipo: Arroio Tomás Cuadra (tributário do rio Negro, bacia do Uruguay), 33°23'S 56°25'W, Durazno, Uruguai.

Distribuição: Tributários do rio Uruguai, na região da fronteira Brasil, Uruguai e Argentina, e das cabeceiras do rio Negro na região da fronteira entre Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Malabarba & Weitzman (2003), Malabarba *et al.* (2004).

***Deuterodon iguape* Eigenmann, 1907**

Localidade-tipo: Iguape, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira do Iguape, ilha do Cardoso, rio Quilombo, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Deuterodon langei* Travassos, 1957**

Localidade-tipo: Córrego da Divisa, Morretes, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Sistema do Cubatão [norte], Estado de Santa Catarina até a bacia do Nhundiaquara, Estado do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Deuterodon longirostris* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Cubatão [sul; Águas Mornas], Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Cubatão [sul].

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucena & Lucena (1992).

***Deuterodon rosae* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Itapocu, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Deuterodon singularis* Lucena & Lucena, 1992**

Localidade-tipo: Rio Sanga de Areia, Gravatal, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tubarão, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Deuterodon stigmatulus* (Gomes, 1947)**

Localidade-tipo: Rio Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Deuterodon supparis* Lucena & Lucena, 1992**

Localidade-tipo: Rio Itajaí-Açu, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Itajaí-Açu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Engraulisoma taeniatum* Castro, 1981**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Município de Poconé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai; alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Exodon paradoxus* Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: rio Essequibo, Guiana.

Distribuição: Rios guianenses; rio Tocantins; rio Branco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry (1977).

***Gymnocorymbus ternetzi* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnocorymbus thayeri* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Estado do Amazonas, entre Tabatinga e Gurupá, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hasemanía crenuchoides* Zarske & Géry, 1999**

Localidade-tipo: Córrego Planaltina, médio rio São Bartolomeu, que deságua no rio Corumbá, afluente do rio Paranaíba, perto de Planaltina, a nordeste de Brasília, Distrito Federal, Brasil, aproximadamente 15°38'S, 47°40'W.

Distribuição: Alto rio Paranaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hasemanía hansení* (Fowler, 1949)**

Localidade-tipo: Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia ignorada (alto Paraná ou rio Tocantins).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Böhlke (1958).

***Hasemanía maxillaris* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Porto União, rio Iguaçu, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1921).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Hasemanía melanura* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Porto União, rio Iguaçu, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1921).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Hasemanía nana* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima & Gerhard (2001).



***Hemigrammus analis* Durbin, 1909**

Localidade-tipo: Rockstone, Guiana.

Distribuição: Rio Essequibo; bacia do rio Orinoco; bacias dos rios Negro e Tapajós.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Goulding *et al.* (1988).

***Hemigrammus belotii* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Tabatinga, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1963).

***Hemigrammus bleheri* Géry & Mahnert, 1986**

Localidade-tipo: Médio rio Negro, provavelmente próximo do rio Jufaris, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus brevis* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Barreiras, lagoas do rio Grande, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus coeruleus* Durbin, 1908**

Localidade-tipo: Manacapuru, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus cupreus* Durbin, 1918**

Localidade-tipo: Jatuarana [provavelmente perto de Parintins, Brasil].

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus elegans* Steindachner, 1882**

Localidade-tipo: Óbidos.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus gracilis* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco e Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

***Hemigrammus haraldi* Géry, 1961**

Localidade-tipo: Alto Solimões, arredores de São Paulo de Olivença, em lago de ilha em meio à espessa floresta entre  
Paraná-Pará e Paraná-Camatá.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus hyanuary* Durbin, 1918**

Localidade-tipo: Lago Januari.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus levis* Durbin, 1908**

Localidade-tipo: Lago do Máximo; Obidos; Vila Bela [= Parintins]; Lago José Açú.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus lunatus* Durbin, 1918**

Localidade-tipo: Amazonas.  
Distribuição: Bacia Amazônica; bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1964b).

***Hemigrammus marginatus* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Queimadas, rio Itapicurú.  
Distribuição: Rio São Francisco; rios do nordeste brasileiro (rio Jaguaribe, rio Itapicurú, rio Paraguaçu, rio de Contas); alto rio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus maxillaris* (Fowler, 1932)**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus melanochrous* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Afluente do rio Madeira próximo à Porto Velho, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Madeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus microstomus* Durbin, 1918**

Localidade-tipo: Santarém, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus mimus* Böhlke, 1955**

Localidade-tipo: Corredeiras de Camanaus, rio Negro, abaixo de São Gabriel da Cachoeira, aproximadamente 0°10'S 66°25'W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus ocellifer* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Vila Bela [= Parintins]; Codajás.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1965).

***Hemigrammus pretoensis* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, próximo de Belém, aproximadamente 60 km abaixo de Leticia, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus rhodostomus* Ahl, 1924**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry & Uj (1986).

***Hemigrammus rodwayi* Durbin, 1909**

Localidade-tipo: Georgetown, Guiana.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus schmardae* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Tabatinga.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Géry (1977), Goulding *et al.* (1988), Géry (1963 ).

***Hemigrammus skolioplatus* Bertaco & Carvalho, 2005**

Localidade-tipo: Rio Doze de Outubro na BR-364 entre Comodoro e Vilhena, Município de Comodoro, Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Juruena, na Chapada dos Parecis.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemigrammus stictus* (Durbin, 1909)**

Localidade-tipo: Lama Stop-Off, Guiana.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

***Hemigrammus ulreyi* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Hemigrammus unilineatus* (Gill, 1858)**

Localidade-tipo: Trinidad (West Indies).

Distribuição: Baixo Amazonas; rios do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hemigrammus vorderwinkleri* Géry, 1963**

Localidade-tipo: Próximo a Tapurucuara, alto rio Negro.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hollandichthys multifasciatus* (Eigenmann & Norris, 1900)**

Localidade-tipo: Cubatão, Brasil.

Distribuição: Rios do leste brasileiro, dos Estados do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1921).

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Holoprion agassizii* Eigenmann, 1903**

Localidade-tipo: Jatuarana (hoje Parintins, Estado do Amazonas), Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas (Brasil).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Souza-Lima (2003), Steindachner (1882), Eigenmann (1915).

***Hyphessobrycon agulha* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Rio Madeira, aproximadamente 200 milhas à leste da longitude 62°20'.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1965).

***Hyphessobrycon amandae* Géry & Uj, 1987**

Localidade-tipo: Rio das Mortes, Brasil, aproximadamente 100 km antes de sua confluência com o Braço Maior do rio Araguaia (porção ocidental da Ilha do Bananal), Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon amapaensis* Zarske & Géry, 1998**

Localidade-tipo: Aproximadamente 45 km ao norte de Macapá, pequeno riacho de savana na BR 156 no Sítio Camaipi, próximo de Santa Clara, aproximadamente 11 km do Sítio Camaipi (bacia do rio Preto), Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon anisitsi* (Eigenmann, 1907)**

Localidade-tipo: Vila Rica [Paraguai].

Distribuição: Bacias dos rios Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Britski (1970).

***Hyphessobrycon balbus* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Planaltina, Lagoa Fervedeira [Distrito Federal, Brasil].

Distribuição: Bacia do alto rio Paranaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon bentosi* Durbin, 1908**

Localidade-tipo: Óbidos.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Palmer (1997b).

***Hyphessobrycon bifasciatus* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Campos.

Distribuição: Rios do leste do Brasil (do sul do Estado da Bahia ao Estado do Rio Grande do Sul); Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1921).

***Hyphessobrycon boulengeri* (Eigenmann, 1907)**

Localidade-tipo: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Drenagens costeiras do Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Malabarba (1989).

***Hyphessobrycon cachimbensis* Travassos, 1964**

Localidade-tipo: Rio Cachimbo, Cachimbo, aeroporto da FAB, abaixo do salto, 9°22'S 54°55'W, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1977).

***Hyphessobrycon coelestinus* Myers, 1929**

Localidade-tipo: Lagoa Bonita no rio São Bartolomeu, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Alto rio Paranaíba.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon copelandi* Durbin, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Weitzman & Palmer (1997b).

***Hyphessobrycon diancistrus* Weitzman, 1977**

Localidade-tipo: Río Vichada, aproximadamente 50 km a oeste de San José de Ocumé, 4°14'S 70°20'W, Estado Vichada, Colômbia.  
Distribuição: Bacia do rio Orinoco; bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Goulding *et al.* (1988).

***Hyphessobrycon duragenys* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Mogí das Cruzes, rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Alto rio Tietê e alto Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1921).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Hyphessobrycon elachys* Weitzman, 1985**

Localidade-tipo: Brejo 3 km à noroeste de Lima, bacia do Río Aguaray-guazu, 23°55'S 56°29'W, Departamento San Pedro, Paraguai.  
Distribuição: Bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Menezes *et al.* (2000).

***Hyphessobrycon epicharis* Weitzman & Palmer, 1997**

Localidade-tipo: Cabeceiras do Río Baria (= Río Mawarinuma), 3 km abaixo do campo base da Neblina, 0°55'S 66°10'W, Estado Amazonas, Venezuela.  
Distribuição: Bacia dos rios Orinoco e Negro.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Weitzman & Palmer (1997b).

***Hyphessobrycon eques* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Vila Bela [= Parintins]; Óbidos.

Distribuição: Bacia Amazônica; bacia do Paraguai (introduzido no Alto Paraná e rios do leste do Brasil).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Palmer (1997a).

***Hyphessobrycon erythrostigma* (Fowler, 1943)**

Localidade-tipo: Sem localidade, presumivelmente Brasil.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman (1977).

***Hyphessobrycon eylios* Lima & Moreira, 2003**

Localidade-tipo: Ribeirão do Sapo, km 464,04 da ferrovia Ferronorte, município de Alto Araguaia, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima *et al.* (2003).

***Hyphessobrycon flammeus* Myers, 1924**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman *et al.* (1988).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro, criticamente em perigo no Município do Rio de Janeiro.

***Hyphessobrycon griemi* Hoedeman, 1957**

Localidade-tipo: Estado de Goiás [localidade presumivelmente errada].

Distribuição: Rios costeiros do Estado de São Paulo ao Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman *et al.* (1988).

***Hyphessobrycon hamatus* Bertaco & Malabarba, 2005**

Localidade-tipo: Córrego Cana Brava, tributário do rio Vermelho, bacia do Ticantins, 14°29'S 46°6'W, Mabaí, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon haraldschultzi* Travassos, 1960**

Localidade-tipo: Ilha do Bananal, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1964a).

***Hyphessobrycon hasemani* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Rio Madeira acima das cachoeiras de Guajará-Mirim, aproximadamente 10°47'S 65°23'W.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Palmer (1997b).

***Hyphessobrycon heliacus* Moreira, Landim & Costa, 2002**

Localidade-tipo: Ribeirão Macuco (= Córrego Duas Bocas), afluente do rio Teles Pires, bacia do rio Tapajós, 71,9 km de Sinop, Município de Cláudia, na BR-163 em direção a Santarém, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon herbertaxelrodi* Géry, 1961**

Localidade-tipo: Coxim, no rio Taquari.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon heteresthes* (Ulrey, 1894)**

Localidade-tipo: Brasil (sem localidade precisa).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Palmer (1997b).

***Hyphessobrycon heterorhabdus* (Ulrey, 1894)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zarske & Géry (1998).

***Hyphessobrycon hexastichos* Bertaco & Carvalho, 2005**

Localidade-tipo: Rio Mutum na BR 364 para a cidade de Vilhena, 13°05'08"S 59°53'32"W, tributário do rio Juruena, bacia do alto Tapajós, Município de Comodor, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon inconstans* (Eigenmann & Ogle, 1907)**

Localidade-tipo: Estado do Pará [duvidoso].

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hyphessobrycon itaparicensis* Lima & Costa, 2001**

Localidade-tipo: Pequeno riacho na Ilha de Itaparica, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon langeanii* Lima & Moreira, 2003**

Localidade-tipo: Córrego Mosquito, km 476,3 da ferrovia Ferronorte, município de Alto Araguaia, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima *et al.* (2003).

***Hyphessobrycon loweae* Costa & Géry, 1994**

Localidade-tipo: Córrego Xavante, um afluente do rio Culuene, bacia do rio Xingú, 40 km ao sul de Paranatinga, 15°01'S, 54°03'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Xingú.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon luetkenii* (Boulenger, 1887)**

Localidade-tipo: São Lourenço do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Drenagens costeiras do Estado do Rio Grande do Sul; rio Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hyphessobrycon maculicauda* Ahl, 1936**

Localidade-tipo: Brasil central (sem localidade precisa).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon megalopterus* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Cáceres.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Palmer (1998).

***Hyphessobrycon melanopleurus* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Alto da Serra, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Hyphessobrycon melazonatus* Durbin, 1908**

Localidade-tipo: Lago do Máximo [perto de Parintins, Brasil].

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hyphessobrycon meridionalis* Ringuelet, Miquelarena & Menni, 1978**

Localidade-tipo: Cantera sobre estrada provincial n°15, 70 m ao sul do Canal Salgado, a 30 m do caminho em direção ao Rio de la Plata, Los Talas, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Baixo rio Paraná; drenagens costeiras do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Malabarba (1989).

***Hyphessobrycon micropterus* (Eigenmann, 1915)**

Localidade-tipo: Lagoa do Porto.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Palmer (1997b).

***Hyphessobrycon moniliger* Moreira, Lima & Costa, 2002**

Localidade-tipo: Araguaçu, fazenda Praia Alta 2, estrada de Araguaçu a Barreira do Piqui, 27 km ao norte de Araguaçu, bacia do rio Água Fria, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tocantins e rio Arinos (alto rio Tapajós).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Moreira *et al.* (2002).

***Hyphessobrycon mutabilis* Costa & Géry, 1994**

Localidade-tipo: Afluente do rio Sete de Setembro, bacia do rio Xingú, 107 km ao sudoeste de Canarana, 13°51'S, 52°40'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Hyphessobrycon negodagua* Lima & Gerhard, 2001**

Localidade-tipo: Rio Pratinha na fazenda Pratinha, 12°21'13"S 41°32'51"W, Município de Iraquara, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon parvellus* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Alagoinhas, rio Catú, Brasil.

Distribuição: Drenagens costeiras do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima & Gerhard (2001).

***Hyphessobrycon piabinhas* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Fortaleza, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1972).

***Hyphessobrycon pulchripinnis* Ahl, 1937**

Localidade-tipo: Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1980).

***Hyphessobrycon pyrrhonotus* Burguess, 1993**

Localidade-tipo: Rio Ererê, afluente do rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon reticulatus* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Rio Paraíba em Campos (Goitacazes), Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Drenagens costeiras dos Estados do Rio de Janeiro a Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1921).

***Hyphessobrycon santae* (Eigenmann, 1907)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hyphessobrycon schauenseei* Fowler, 1926**

Localidade-tipo: Rio Inhangapi, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon scholzei* Ahl, 1937**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

***Hyphessobrycon scutulatus* Lucena, 2003**

Localidade-tipo: Rio Kaiapá, estrada MT 320, aproximadamente 5 km de Nova Canaã do Norte, bacia do rio Teles Pires (sistema do Tapajós), 10°36'S 55°42'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucena (2003c).

***Hyphessobrycon socolofi* Weitzman, 1977**

Localidade-tipo: rio Negro, Barcelos, 0°58"S 62°57'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon stegemanni* Géry, 1961**

Localidade-tipo: Município de Itacajá, entre os rios Manoel Alves Pequeno e Vermelho, bacia do rio Tocantins, aproximadamente 8°19'S, 47°25'W, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima & Géry (2001).

***Hyphessobrycon stramineus* Durbin, 1918**

Localidade-tipo: Tabatinga.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Hyphessobrycon takasei* Géry, 1964**

Localidade-tipo: Serra do Navio, acima de Macapá, baixo Amazonas, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Araguaí e Oiapoque.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon taurocephalus* Ellis, 1911**

Localidade-tipo: Serrinha, rio Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Hyphessobrycon tropis* Géry, 1963**

Localidade-tipo: Tapurucuara, alto rio Negro.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon tukunai* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, próximo de Belém, aproximadamente 60 km abaixo de Letícia, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon vilmae* Géry, 1966**

Localidade-tipo: Bacia do alto rio Arinos-Juruena, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hyphessobrycon weitzmanorum* Lima & Moreira, 2003**

Localidade-tipo: Córrego Mosquito, km 476,3 da ferrovia Ferronorte, município de Alto Araguaia, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima *et al.* (2003).

***Hyphessobrycon weneri* Géry & Uj, 1987**

Localidade-tipo: Região do rio Guamá, igarapé entre Santa Maria do Pará e São Miguel do Guamá, aproximadamente 120 km de Belém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guamá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypobrycon leptorhynchus* Silva & Malabarba, 1996**

Localidade-tipo: Rio Ibicuí, aproximadamente 10 km de sua foz no rio Canoas, bacia do rio Uruguai, perto da Celulose Iguazú, aproximadamente 27°33'S, 51°12'W, Campos Novos, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Alto Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypobrycon maromba* Malabarba & Malabarba, 1994**

Localidade-tipo: Rio das Marombas, aproximadamente 10 km de sua foz na ponte Irineu Bornhausen, na velha estrada para Campos Novos (aprox. 27°11'S, 50°38'W), Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Alto Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Inpaichthys kerri* Géry & Junk, 1977**

Localidade-tipo: Pequeno igarapé da bacia do igarapé Queimada (atualmente igarapé do Aeroporto), cerca de duas horas da cidade de Humboldt (núcleo Aripuanã), na futura estrada para Juruená, alto rio Aripuanã, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Aripuanã (sistema do Madeira).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba acanthogaster* (Eigenmann, 1911)**

Localidade-tipo: Corumbá, Brasil.

Distribuição: Drenagens dos rios Taquari, Jaurú e afluentes do rio Paraguai; drenagens dos rios Itacaiunas e Tapajós (Bacia Amazônica).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiaba apenina* Zanata, 1997**

Localidade-tipo: Rio Peixoto de Azevedo, Cachimbo, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Peixoto de Azevedo e Noedori.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba asymmetrica* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rios Solimões, Içá e Jutai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiaba atypindi* Zanata, 1997**

Localidade-tipo: Igarapé Jaramucu, afluente do rio Cuminá, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba minor* (Travassos, 1964)**

Localidade-tipo: Rio Cachimbo, abaixo do Salto, Aeroporto da FAB, Cachimbo 9°22'S 54°55'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Cachimbo, bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiaba ocellata* (Géry, Planquette & Le Bail, 1996)**

Localidade-tipo: Rio Oiapoque, entre Salto Maripa e Camopi.

Distribuição: Bacias do Oiapoque e Paru de Oeste.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiaba pirana* Zanata, 1997**

Localidade-tipo: Igarapé Pimenta, rio Tapajós, Parque Nacional da Amazônia, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba poekotero* Zanata & Lima, 2006**

Localidade-tipo: praia em lagoa abaixo da Cachoeira do Caruru, 00°16'28,9"N 69°54'53,6"W, aldeia indígena de Caruru, rio

Tiquié, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto rio Tiquié (tributário do baixo curso do rio Uaupés, drenagem do alto rio Negro, bacia Amazônica), abaixo da cachoeira do Caruru.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba polylepis* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Bacias costeiras das guianas, Bacia Amazônica, bacia do Tocantins, bacia do rio Paranaíba.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiaba poranga* Zanata, 1997**

Localidade-tipo: Riacho Monjolinho, rio Arinos, Diamantino, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Drenagens dos rios Peixoto de Azevedo e Preto (bacia do Tapajós).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba scologaster* (Weitzman & Vari, 1986)**

Localidade-tipo: trecho inferior do caño Manu (tributário do Casiquiare), cerca de 250 m a montante de Solano (aprox.

02°00'N, 66°57'W), Território Federal do Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacia dos rios Casiquiare e Negro.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiaba yarina* Zanata, 1997**

Localidade-tipo: Riacho Monjolinho, rio Arinos, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Arinos, bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jupiaba zonata* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto Amazonas e rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zanata (1997).

***Jupiana anteroides* (Géry, 1965)**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, colateral do Amazonas superior próximo a Belém, cerca de 60 km de Leticia, Brasil.

Distribuição: Rios Jutai e Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Zanata (1997).

***Knodus albolineatus* Holly, 1929**

Localidade-tipo: Piquirão, Amazonas, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: É possível que a localidade tipo seja um erro de interpretação do nome comum do exemplar, originalmente proveniente do Museu Paraense Emílio Goeldi.

***Knodus breviceps* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Estado de Goiás [sem localidade precisa], Brasil.

Distribuição: Desconhecida.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Knodus calliurus* Ahl, 1931**

Localidade-tipo: Bacia do rio Capim, Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Anteriormente incluída na sinonímia de *Moenkhausia lepidura* (Kner, 1858).

***Knodus chapadae* (Fowler, 1906)**

Localidade-tipo: Santa Ana da Chapada [=Chapada dos Guimarães], Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Knodus geryi* Lima, Britski & Machado, 2004**

Localidade-tipo: Rio do Peixe, afluente do rio Cabaçal (bacia do alto Paraguai), fazenda Entre Rios, 14°55'S 58°27'W, Barra dos Bugres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima *et al.* (2004).

***Knodus heteresthes* (Eigenmann, 1908)**

Localidade-tipo: Tapajós, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Knodus savannensis* Géry, 1961**

Localidade-tipo: Município Itacajá, entre rios Manoel Alves Pequeno e Vermelho, bacia do Tocantins, aproximadamente 8°19'S 47°25'W ou rio Javaés, Ilha do Bananal, aproximadamente 11°S 51°W, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima & Géry (2001).

***Knodus smithi* (Fowler, 1913)**

Localidade-tipo: Afluente do rio Madeira próximo à Porto Velho, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

Observações: *Bryconamericus jacunda* Fowler é considerado sinônimo.

***Knodus victoriae* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Pequeno riacho perto de sua foz no rio Parnaíba no Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leptagoniates pi* Vari, 1978**

Localidade-tipo: Rio Mamoré, 10 km a oeste de San Pedro, Bolívia.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 17427; MZUSP 76856).

***Leptobrycon jatuaranae* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Jatuarana [provavelmente perto de Parintins, Brasil].

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Markiana nigripinnis* (Perugia, 1891)**

Localidade-tipo: Rio de la Plata [Argentina].

Distribuição: Bacia dos rios Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Microschemobrycon callops* Böhlke, 1953**

Localidade-tipo: Corredeiras de Camanaus, rio Negro, abaixo de São Gabriel da Cachoeira, aproximadamente 0°10'S 66°55'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1973).

***Microschemobrycon casiquiare* Böhlke, 1953**

Localidade-tipo: Corredeiras de São Gabriel, rio Negro, 0°08'03"S 67°03'28"W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1973).

***Microschemobrycon elongatus* Géry, 1973**

Localidade-tipo: Rio Suaizinho, bacia do rio Xingu, 12°49'S 51°46'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microschemobrycon geisleri* Géry, 1973**

Localidade-tipo: Igarapé aproximadamente 35 km a noroeste de Óbidos, bacia do rio Curuçamba, baixo rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microschemobrycon guaporensis* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Rio Guaporé em Maciel.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microschemobrycon meyburgi* Meinken, 1975**

Localidade-tipo: Rio Xerui, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Branco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Mixyops aphos* Zanata & Akama, 2004**

Localidade-tipo: rio Lencóis, tributário do rio Paraguaçu, 3 km a montante de Lençóis, acima da cachoeira do Serrano, 12°34'S 41°22'W, Lençóis, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia affinis* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Foz do rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia agnesae* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, colateral do Amazonas superior próximo à Belém, aproximadamente 60km abaixo de Leticia.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia barbouri* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Vila Bela [=Parintins, Brasil].

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia bonita* Benine, Castro & Sabino, 2004**

Localidade-tipo: Rio Baía Bonita, Parque Baía Bonita, "Áquário Natural", alto rio Miranda, bacia do rio Paraguai, 21°9'S 56°25'W, Bonito, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Benine *et al.* (2004).

***Moenkhausia ceros* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Paraná do Janauari.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1918).

***Moenkhausia chrysargyrea* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Essequibo.

Distribuição: Rios guianenses; bacia do Amazonas; bacia do rio Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia collettii* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Rio Javari; Óbidos.  
Distribuição: Bacia do Amazonas; rios guianenses; bacia do rio Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Moenkhausia comma* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Codajás.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia copei* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Santarém, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas; bacia do rio Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Moenkhausia costae* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Estado do Rio Grande do Norte e Rio Preto em Joazeiro, Barra, Santa Rita, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia cotinho* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).

***Moenkhausia dichroua* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé; Caiçara; rio Paraguai.  
Distribuição: Bacia Amazônica; bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia diktyota* Lima & Toledo-Piza, 2001**

Localidade-tipo: Rio Negro, Igarapé em São João, perto de Santa Isabel do Rio Negro, 0°24'S; 65°02'W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia doceana* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Doce, Brasil.  
Distribuição: Rios do leste brasileiro, entre o sul do Estado da Bahia e o Estado do Espírito Santo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia gracilima* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Vila Bela [= Parintins]; Serpa [= Itacoatiara].  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1918).



***Moenkhausia grandisquamis* (Müller & Troschel, 1845)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Rios guianenses; Bacia Amazônica; bacia do rio Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia hasemani* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Santarém, Brasil.

Distribuição: Baixo rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia hemigrammoides* Géry, 1965**

Localidade-tipo: Weyne, Matoekasie creek, na estrada Albina-Moengo, bacia do Cottica River [Suriname].

Distribuição: Rios guianenses; rio Branco.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30531).

***Moenkhausia icae* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Içá.

Distribuição: Rios Içá e Solimões, Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann (1917b), Géry (1992).

***Moenkhausia intermedia* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga.

Distribuição: Bacia Amazônica; bacia dos rios Paraguai e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia jamesi* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Içá; Óbidos; Lago do Máximo; Tajapuru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia justae* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Provavelmente Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia lata* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia latissima* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia lepidura* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé; rio Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica; bacia do rio Orinoco; rios guianenses.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1992).

***Moenkhausia levidorsa* Benine, 2002**

Localidade-tipo: Núcleo Aripuanã, Igarapé do Aeroporto, furo Bahia, acima da Cachoeira de Dardanelos, aproximadamente 10°10'S 59°25'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Benine (2002).

***Moenkhausia lopesi* Britski & Silimon, 2001**

Localidade-tipo: Ribeirão Sozinho na rodovia BR 163, entre Rondonópolis e Coxim, aproximadamente 17°30'S 55°10'W, Município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia loweae* Géry, 1992**

Localidade-tipo: Rio das Mortes em Xavantina, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia megalops* Eigenmann, 1907**

Localidade-tipo: Itaituba.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia melogramma* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Tabatinga.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia newtoni* Travassos, 1964**

Localidade-tipo: Rio Cachimbo, Cachimbo, Aeroporto da FAB, abaixo do Salto, 9°22'S 54°55'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Alto rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia nigromarginata* Costa, 1994**

Localidade-tipo: Pequeno riacho afluente do rio Cravari, próximo à estrada MT-170, aproximadamente 10 km N de Campo Novo do Parecis, bacia do rio Tapajós, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Alto rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia oligolepis* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Bacia Amazônica; rios guianenses.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia petymbuaba* Lima & Birindelli, 2006**

Localidade-tipo: Rio Curuá, aprox. 8°44'S 54°57'W, Serra do Cachimbo, estrada Santarém-Cuaibá, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia phaeonota* Fink, 1979**

Localidade-tipo: Margens de um lago abaixo do rio dos Peixes, rio Arinos, drenagem do Juruena-Tapajós, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia pyrophthalma* Costa, 1994**

Localidade-tipo: Riacho cruzando a estrada entre Água Boa e Cocalinho, 13 km W do ponto onde a estrada alcança o rio das Mortes, bacia do rio Araguaia-Tocantins, 14°03'S, 51°47'W, Estado do Mato Grosso,

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia sanctaefilomenae* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Laguna em Santa Filomena no Rio Parnaíba, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Parnaíba, São Francisco, Paraguai, Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917b).

***Moenkhausia takasei* Géry, 1964**

Localidade-tipo: Igarapé próximo à Belém do Pará, bacia do Rio Guamá, baixo Amazonas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guamá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia tergimacula* Lucena & Lucena, 1999**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, 3 km abaixo da represa de Serra da Mesa, Minaçu, 13°50'51"S 48°16'60", Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia tridentata* Holly, 1929**

Localidade-tipo: Piquirão (Bacia Amazônica).

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moenkhausia xinguensis* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Xingu, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Myxiops aphos* Zanata & Akama, 2004**

Localidade-tipo: rio Lençóis, 12°34'S 41°22'W, tributário do rio Paraguaçu, 3 km a montante de Lençóis, acima da cachoeira do Serrano, Lençóis, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Nematocharax venustus* Weitzman, Menezes & Britski, 1986**

Localidade-tipo: Rio Jequitinhonha em Itaobim, cerca de 16°40'S 41°23'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman *et al.* (1986).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Odontostoechus lethostigmus* Gomes, 1947**

Localidade-tipo: Rio Maquiné, afluente da Lagoa de Quadros, Município de Conceição do Arroio, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Drenagens dos rios Mampituba e Tramandaí.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Oligobrycon microstomus* Eigenmann, 1915**

Localidade-tipo: Jacareí, rio Paraíba, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

Observações: Espécie conhecida apenas através do material tipo.

***Oligosarcus acutirostris* Menezes, 1987**

Localidade-tipo: Rio Itapemirim, fazenda Boa Esperança, entre Pacotuba e Coutinho, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do leste, entre Estado da Bahia e Estado do Espírito Santo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus argenteus* Günther, 1864**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacias do Doce e rio das Velhas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus brevioris* Menezes, 1987**

Localidade-tipo: Arroio Cachoeirinha, estrada Vacaria-Bom Jesus, Município de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai superior.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus hepsetus* (Cuvier, 1829)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Rios e riachos do Sudeste do Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus jenynsii* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Lago de água doce em Maldonado, Uruguai.

Distribuição: Arroios, rios e lagoas da região costeira e planície interior, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus longirostris* Menezes & Géry, 1983**

Localidade-tipo: Rio Iguaçu, bacia do rio Paraná, em Porto Lupion, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Géry (1983).

***Oligosarcus macrolepis* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Jequitinhonha, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus oligolepis* (Steindachner, 1867)**

Localidade-tipo: Rio de La Plata.

Distribuição: Rios Paraguai, Paraná inferior e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus paranensis* Menezes & Géry, 1983**

Localidade-tipo: Represa de Salesópolis, bacia do rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Géry (1983).

***Oligosarcus pintoï* Campos, 1945**

Localidade-tipo: Rio Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus planaltinae* Menezes & Géry, 1983**

Localidade-tipo: Córrego Planaltina, tributário do rio São Bartolomeu, próximo de Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Parnaíba, Estado de Goiás.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Géry (1983).

***Oligosarcus robustus* Menezes, 1969**

Localidade-tipo: Rio Caí em Montenegro, bacia do rio Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Região costeira do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Oligosarcus solitarius* Menezes, 1987**

Localidade-tipo: Lagoa Carioca, Vale do Rio Doce, aproximadamente 20°S 43°W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do Doce, Estado de Minas Gerais.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1987a).

***Paracheirodon axelrodi* (Schultz, 1956)**

Localidade-tipo: Igarapé perto de Tomar, 0°25'S 63°55'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Fink (1983).

***Paracheirodon innesi* (Myers, 1936)**

Localidade-tipo: Amazônia peruana.

Distribuição: Alto Solimões.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman & Fink (1983).

***Paracheirodon simulans* (Géry, 1963)**

Localidade-tipo: Rio Jufaris (ou Tupari), que desemboca no Rio Negro pouco acima do Rio Branco.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman & Fink (1983).

***Paragoniates alburnus* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em Tefé, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica; bacia do rio Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1915).

***Parecbasis cyclolepis* Eigenmann, 1914**

Localidade-tipo: São Antônio do Rio Madeira.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1915).

***Petitella georgiae* Géry & Boutière, 1964**

Localidade-tipo: Vila de Lagunas, baixo rio Huallaga, Loreto, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry & Mahnert (1986).

***Piabarchus analis* (Eigenmann, 1914)**

Localidade-tipo: Cáceres.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mahnert & Géry (1985).

***Piabarchus torrenticola* Mahnert & Géry, 1985**

Localidade-tipo: Salto Pirareta, prov. Cordillera, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes *et al.* (2000).

***Piabina anhembi* Silva & Kaefer, 2003**

Localidade-tipo: Rio Paraitinga na cachoeira da Porteira, 23°31'37"S 45°45'52"W, afluente do rio Tietê, Município de Salesópolis, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Piabina argentea* Reinhardt, 1867**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Rio São Francisco, rio Paraíba do Sul, rio Itapemirim, rio Itapicurú, alto Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari & Harold (2001).

***Prionobrama filigera* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Pebas, Peru.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Eigenmann (1915).

***Prionobrama nattereri* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Villa Bella (hoje Parintins, Estado do Amazonas, Brasil).  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Britski *et al.* (1999), Souza-Lima (2003), Steindachner (1882).

***Prionobrama paraguayensis* (Eigenmann, 1914)**

Localidade-tipo: Corumbá, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia dos rios Paraguai e Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1915).

***Pristella maxillaris* (Ulrey, 1894)**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Drenagens costeiras da Venezuela ao norte do Brasil (Estado do Pará).  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Probolodus heterostomus* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Campos (Campos dos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro, Brasil).  
Distribuição: Drenagens costeiras do leste do Brasil, do rio Doce ao rio Ribeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann (1915).

***Psolidodon gymnodontus* Eigenmann, 1911**

Localidade-tipo: Porto União, rio Iguaçu, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Eigenmann & Myers (1929).

***Psellogrammus kennedyi* (Eigenmann, 1903)**

Localidade-tipo: Campo Grande, Lagunitas, 5 km de Assunção, bacia do rio Paraguai.  
Distribuição: Bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Britski *et al.* (1986), Britski *et al.* (1999).

***Rachoviscus crassiceps* Myers, 1926**

Localidade-tipo: Vizinhança do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Riachos do litoral sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Weitzman & Cruz (1981), Myers (1926).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo, criticamente em perigo no Estado do Paraná.

***Rachoviscus graciliceps* Weitzman & Cruz, 1981**

Localidade-tipo: Riacho cerca de 1 km ao norte de Prado e aproximadamente 500 m do Oceano Atlântico, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Riachos litorâneos do sul do Estado da Bahia.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 14387.

Referência: Weitzman & Cruz (1981).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Espírito Santo.

***Rhinobrycon negrensis* Myers, 1944**

Localidade-tipo: Santa Isabel, Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhinopetitia myersi* Géry, 1964**

Localidade-tipo: Ilha do Bananal, alto rio Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Roeboexodon guyanensis* (Puyo, 1948)**

Localidade-tipo: Confluência dos rios Ouai e Tampoc, bacia do alto Maroni, Guiana Francesa.

Distribuição: Rios guianenses; rios Tocantins, Xingu e Tapajós.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Roberts (1970a).

***Salminus brasiliensis* (Cuvier, 1816)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e Jacuí; introduzida no Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry & Lauzanne (1990).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul, vulnerável no Estado do Paraná.

Observações: Inclui as espécies nominais *Hydrocyon brevidens* Cuvier; *S. maxillosus* Valenciennes; *S. cuvieri* Valenciennes; *S. orbygnianus* Valenciennes.

***Salminus hilarii* Valenciennes, 1850**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná, rio São Francisco, rio Tocantins, alto Amazonas e alto Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry & Lauzanne (1990).

Categoria de ameaça em listas regionais: Quase ameaçada no Estado do Paraná.



***Salminus iquitensis* (Nakashima, 1941)**

Localidade-tipo: Cercanias do porto de Iquitos, Peru.  
Distribuição: Bacias do Orinoco, Amazonas e Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Serrabrycon magoi* Vari, 1986**

Localidade-tipo: Território Federal Amazonas, Departamento Rio Negro, baixo curso do Caño Manu, que desemboca no rio Casiquiare, aproximadamente 250 m acima de Solano, 2°00'N, 66°57'W, Venezuela.  
Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Goulding *et al.* (1988), Lima & Toledo-Piza (2001).

***Stichonodon insignis* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Bacia Amazônica em tabatinga e Santarém, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1977).

***Stigichthys typhlops* Brittan & Böhlke, 1965**

Localidade-tipo: Jaíba, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Águas subterrâneas da drenagem do córrego Escuro, afluente do rio Verde Grande, bacia do alto rio São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Thayeria boehlkei* Weitzman, 1957**

Localidade-tipo: Sem localidade.  
Distribuição: Rios Araguaia, Xingu e Tapajós.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Géry (1960).

***Thayeria obliqua* Eigenmann, 1908**

Localidade-tipo: Óbidos, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1960).

***Thrissobrycon pectinifer* Böhlke, 1958**

Localidade-tipo: Alto rio Negro em Cucuí, Brasil, aproximadamente 1°12'N 66°51'W.  
Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Tucanoichthys tucano* Géry & Römer, 1997**

Localidade-tipo: Igarapé desembocando no Igarapé Yavuari, um afluente do Rio Uaupés, bacia do alto Rio Negro, 0°14'31"N 68°03'48"W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Uaupés.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Tyttobrycon xerui* Géry, 1973**

Localidade-tipo: Bacia do médio rio Negro, rio Novo, afluente do rio Xerui, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Branco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

## Família Acestrorhynchidae

Naércio Aquino Menezes

### ***Acestrorhynchus abbreviatus* (Cope, 1878)**

Localidade-tipo: Nauta, Peru.

Distribuição: Parte superior da Bacia do Amazônica e bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1992).

### ***Acestrorhynchus altus* Menezes, 1969**

Localidade-tipo: Rio Ararí, Cachoeira do Ararí, Ilha de Marajó, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e Ilha de Marajó.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1992).

### ***Acestrorhynchus britskii* Menezes, 1969**

Localidade-tipo: Represa de Três Marias, rio São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1969).

### ***Acestrorhynchus falcatus* (Bloch, 1974)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orenoco e rios da Guiana.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1969).

### ***Acestrorhynchus falcistrois* (Cuvier, 1819)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Orenoco e rios da Guiana..

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes (1969).

### ***Acestrorhynchus grandoculis* Menezes & Géry, 1983**

Localidade-tipo: Boca do rio Urubaxi, no rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Negro e Orenoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Géry (1983).

### ***Acestrorhynchus heterolepis* (Cope, 1878)**

Localidade-tipo: Parte superior da Bacia Amazônica e bacia do Orenoco.

Distribuição: Bacia do Amazonas superior.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Menezes (1969).

### ***Acestrorhynchus isalineae* Menezes & Géry, 1983**

Localidade-tipo: Tributário do rio dos Marmelos, bacia do rio Madeira.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Géry (1983).

***Acestrorhynchus lacustris* (Lütken, 1875)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Brasil.  
Distribuição: Rio São Francisco e bacia do alto Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes (1992).

***Acestrorhynchus maculipinna* Menezes & Géry, 1983**

Localidade-tipo: Rio Preto da Eva, entre Manaus e Itacoatiara, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes & Géry (1983).

***Acestrorhynchus microlepis* (Schomburgk, 1841)**

Localidade-tipo: Rio Negro, rio Branco e Rio Essequibo.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Orenoco e rios guianensis..  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Menezes (1969).

***Acestrorhynchus minimus* Menezes, 1969**

Localidade-tipo: Lago Jacaré, rio Trombetas, Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Orenoco.zonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Menezes (1969).

***Acestrorhynchus nasutus* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Rockstone, Guiana.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Orenoco..  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Menezes (1969).

***Acestrorhynchus pantaneiro* Menezes, 1992**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Volta Grande, Município de Santo Antônio do Leverger, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Paraguai, Paraná inferior, Uruguai e Prata.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Menezes (1992).

**Família Cynodontidae**

Mônica Toledo-Piza

***Cynodon gibbus* Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Orinoco, rio Pindaré, rio Essequibo (Guiana).  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Toledo-Piza (2000b).

***Cynodon septenarius* Toledo-Piza, 2000**

Localidade-tipo: Rio Tefé, Supiã-Pucu, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Alto Orinoco, rios Essequibo e Demerara (Guiana).  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hydrolycus armatus* (Schomburgk, 1841)**

Localidade-tipo: Rios das Guianas.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Capim, Essequibo e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Günther (1864), Toledo-Piza *et al.* (1999).

Observações: Citado incorretamente em Günther (1864) com o nome *Cynodon scomberoides* (rio Capim).

***Hydrolycus scomberoides* (Cuvier, 1819)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas e tributários acima do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Toledo-Piza *et al.* (1999).

***Hydrolycus tatauaia* Toledo-Piza *et al.*, 1999**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Belo Monte, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Capim, Essequibo e Alto Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hydrolycus wallacei* Toledo-Piza *et al.*, 1999**

Localidade-tipo: Rio Negro, Mandiquié, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Negro e Alto Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhaphiodon vulpinus* Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Capim, Orinoco, Paraná-Paraguai, Uruguai, alto rio Essequibo (Guiana).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Toledo-Piza (2000b).

***Roestes itupiranga* Menezes & Lucena, 1998**

Localidade-tipo: Lago Grande, Itupiranga, rio Tocantins, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Roestes molossus* (Kner, 1860)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Menezes & Lucena (1998).

***Roestes ogilviei* (Fowler, 1914)**

Localidade-tipo: Rio Rupununi, Guiana.

Distribuição: Porções alta e média da bacia do Amazonas, rio Negro, Branco e Essequibo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Menezes (1974), Menezes & Lucena (1998).

**Família Erythrinidae**

Osvaldo Takeshi Oyakawa &

André Luiz Netto-Ferreira

***Erythrinus erythrinus* (Bloch & Schneider, 1801)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Paraguai e bacias costeiras dos Estados da Bahia e Espírito Santo; Suriname; Guiana; Guiana Francesa.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Britski *et al.* (1999), Planquette *et al.* (1996).

***Erythrinus kessleri* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Salvador, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do leste, Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hoplerythrinus unitaeniatus* (Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Paraguai, rios São Francisco, Paraná, Mearim, rios costeiros dos Estados da Bahia e Espírito Santo, lagoas da costa e rios Macaé e São João, Estado do Rio de Janeiro; rios Madalena, Orinoco e das Guianas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britski *et al.* (1999), Planquette *et al.* (1996).

***Hoplias aimara* (Valenciennes, 1847)**

Localidade-tipo: Cayenne, Guiana.

Distribuição: Rios Oiapoque, Amazonas e Tocantins (Brasil); Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Oyakawa (1990), Planquette *et al.* (1996).

Observações: Sinônimo sênior de *Hoplias macrophthalmus*.

***Hoplias brasiliensis* (Spix, in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio Paraguaçu, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraguaçu, Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Oyakawa (1990).

***Hoplias lacerdae* Miranda Ribeiro, 1908**

Localidade-tipo: Bacia do Rio Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Oyakawa (1990), Azevedo (1965), Britski (1970).

***Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794)**

Localidade-tipo: Provavelmente Suriname.

Distribuição: Praticamente em todas as bacias hidrográficas da Costa Rica à Argentina.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Oyakawa (1990), Britski *et al.* (1999), Britski (1970).

***Hoplias microcephalus* (Agassiz, in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Oyakawa (1990).

## Família Lebiasinidae

Osvaldo Takeshi Oyakawa &

André Luiz Netto-Ferreira

### ***Copeina guttata* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas próximo de Óbidos, Estado do Pará; Codajás, Estado do Amazonas; Tabatinga, Estado do Amazonas; rio Negro, Estado do Amazonas.

Distribuição: Rio Amazonas e rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

### ***Copella arnoldi* (Regan, 1912)**

Localidade-tipo: Amazonas.

Distribuição: Bacias Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry (1977).

### ***Copella carsevennensis* (Regan, 1912)**

Localidade-tipo: Calçoene, Amapá, Brasil.

Distribuição: Rio Oiapoque e Guiana Francesa.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Planquette *et al.* (1996).

Observações: Localidade-tipo original: Carsevenne, Guiana Francesa. A modificação da localidade se deve pelo fato da coleta dos tipos, por F. Geay, ter ocorrido durante o período em que parte do Amapá foi anexada à ex-colônia francesa.

### ***Copella compta* (Myers, 1927)**

Localidade-tipo: Remanso acima da Cachoeira de São Gabriel, rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Negro, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

### ***Copella eigenmanni* (Regan, 1912)**

Localidade-tipo: Amazonas, Guiana e Colômbia.

Distribuição: Rios costeiros entre o Estado do Pará (Brasil) e a desembocadura do Rio Orenoco (Venezuela).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Géry (1977).

### ***Copella nattereri* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro, Estado do Amazonas; Óbidos, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias do baixo Amazonas, Negro e alto Rio Orenoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

### ***Copella nigrofasciata* (Meinken, 1936)**

Localidade-tipo: Amazonas, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica, de Manaus ao Rio Ucayali.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 28272).

***Copella vilmae* Géry, 1963**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, próximo de Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Solimões, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Géry (1977).

***Nannostomus anduzei* Fernandez & Weitzman, 1987**

Localidade-tipo: Departamento de Ature, Território Federal de Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Rio Negro, Estado do Amazonas e alto Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lucena (2001).

***Nannostomus beckfordi* Günther, 1872**

Localidade-tipo: Goedverwating, uma plantação na costa de Demerara, Guiana.

Distribuição: Rio Amazonas, próximo de Belém, Estado do Pará e rio Negro; Suriname e Guiana.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Weitzman (1966), Weitzman & Cobb (1975), Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus bifasciatus* Hoedeman, 1954**

Localidade-tipo: Berg en Dal no rio Suriname, Suriname.

Distribuição: Rios costeiros do Suriname e Guiana Francesa; rio Oiapoque, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Weitzman (1966), Weitzman & Weitzman (1982), Planquette *et al.* (1996).

***Nannostomus britskii* Weitzman, 1978**

Localidade-tipo: Igarapé do lago José-Açu, Parintins, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas, Estado do Amazonas e rio Tapajós, Estado do Pará.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus digrammus* (Fowler, 1913)**

Localidade-tipo: Rio Madeira, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas e rio Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Weitzman (1966), Weitzman (1978), Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus eques* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Amazônia Peruana, acima de Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Weitzman (1966), Weitzman & Cobb (1975), Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus limatus* Weitzman, 1978**

Localidade-tipo: Igarapé tributário do lago Mapará, próximo de Santarém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas, Estado do Pará e Amapá.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus marginatus* Eigenmann, 1909**

Localidade-tipo: Maduni Creek, Mahaica River, British Guiana.

Distribuição: Bacia Amazônica rio Orinoco e bacias costeiras da Venezuela, Guiana e Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Weitzman (1966), Weitzman & Cobb (1975), Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus marilynae* Weitzman & Cobb, 1975**

Localidade-tipo: Rio Negro, São Gabriel, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica, Estado do Amazonas e bacia do Rio Vichada, Colômbia.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Weitzman (1978), Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus nitidus* Weitzman, 1978**

Localidade-tipo: Igarapé Candiru Mirim, próximo de Badajós, rio Capim, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Capim, Estado do Pará.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Weitzman & Weitzman (1982).

***Nannostomus stigmasenion* (Fowler, 1913)**

Localidade-tipo: Tributário do rio Madeira, próximo a Porto Velho, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Nannostomus trifasciatus* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Foz do rio Negro e Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica e rios na Guiana.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Weitzman (1966), Weitzman (1978), Géry (1977).

***Nannostomus unifasciatus* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Foz do rio Negro e Tefé, rio Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do alto Orenoco e rios na Guiana.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Weitzman (1966), Weitzman (1978), Weitzman & Weitzman (1982).

***Pyrrhulina australis* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Arroio Trementina, Paraguai.  
Distribuição: Bacia Amazônica e bacias dos rios Paraguai, Paraná, exceto o rio Iguaçu.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 35929.  
Referências: Géry (1977), Britski *et al.* (1999).

***Pyrrhulina brevis* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Foz do rio Negro, Codajás, Tabatinga, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1977).

***Pyrrhulina elongata* Zarske & Géry, 2001**

Localidade-tipo: Itaituba, na estrada Itaituba-Vila Nova, rio Tapajós, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Tapajós, Estado do Pará.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Pyrrhulina filamentosa* Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1847**

Localidade-tipo: Suriname.  
Distribuição: Bacias costeiras entre o Orinoco e a foz do rio Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Planquette *et al.* (1996), Géry (1977).



***Pyrrhulina maxima* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Rio Solimões, Estado do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1977).

***Pyrrhulina semifasciata* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Negro, Codajás, Gurupá, Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1977).

***Pyrrhulina vittata* Regan, 1912**

Localidade-tipo: Obidos, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Amazonas, Estado do Pará.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Géry (1977).

***Pyrrhulina zigzag* Zarske & Géry, 1997**

Localidade-tipo: Riacho na estrada de Campo Verde a Nueva Requena, próximo a Pucalpa, Loreto, Peru.  
Distribuição: Alto Amazonas e rio Paraguai.  
Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 23298, MNRJ 23690, MZUSP 61130).

**Família Ctenoluciidae**

Carlos Alberto Santos de Lucena

***Boulengerella cuvieri* (Agassiz in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica e dos rios Tocantins, Oiapoque, Essequibo e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari (1995).

***Boulengerella lateristriga* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Rio Negro, Amazonas e porção sul do rio Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari (1995).

***Boulengerella lucius* (Cuvier, 1816)**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Bacias do rios Amazonas e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari (1995).

***Boulengerella maculata* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1849)**

Localidade-tipo: Amazonas.  
Distribuição: Rios Negro, Amazonas, Madeira, Tapajós, Tocantins e bacia do Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Vari (1995).

***Boulengerella xyrekes* Vari, 1995**

Localidade-tipo: Rio Marauá, cachoeira do Bicho-Açú, rio Negro, Brasil.

Distribuição: Rios Negro, Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

## Ordem Siluriformes

### Família Cetopsidae

Carlos Alberto Santos de Lucena

***Cetopsidium ferreirai* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Rio Mapuera, bacia do Trombetas, última cachoeira antes do rio Trombetas, aproximadamente 1° 05'S 57° 01'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsidium orientale* (Vari, Ferraris & Keith, 2003)**

Localidade-tipo: Riacho Mindrineti, bacia do Saramanca, Suriname.

Distribuição: Rios costeiros do Suriname e Guiana Francesa, desde a Corantijn até o Oiapoque, rio Araguaia e rio Xingu, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari *et al.* (2005).

***Cetopsidium pemon* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Rio Caroni, foz do rio Claro, Bolívar, Venezuela.

Distribuição: Rios Caroni, Caura, Meta, bacia do Orinoco e alto rio Branco, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari *et al.* (2005).

***Cetopsis arcana* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: São Domingos, Parque Estadual de terra Ronca, Boca da Lapa de Bezerra, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Porções média e alta do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsis caiapo* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Minaçu Cavalcanti (local da usina UHE Serra da Mesa), Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsis candiru* (Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: "Rios equatoriais do Brasil".

Distribuição: Bacia Amazônica na Bolívia, Brasil e Peru; leste do Equador.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsis coecutiens* (Lichtenstein, 1819)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Amplamente distribuída na Bacia Amazônica na Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela; bacias do Tocantins e do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsis gobioides* Kner, 1857**

Localidade-tipo: Irisanga, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto São Francisco, bacias do Paraná e Uruguai, alto rio Paraguai e rio Juquiá, litoral do Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Cetopsis oliveirai* Lundberg & Rapp Py-Daniel, 1994**

Localidade-tipo: Rio Solimões, norte da ilha de Marchantaria, aprox. 15 Km acima da boca do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Porções média e alta da Bacia Amazônica no Brasil e Peru.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsis parma* Oliveira, Vari & Ferraris, 2001**

Localidade-tipo: Rio Tambo, bacia do Ucayali, Pucallpa, Peru.

Distribuição: rio Tiquié, Brasil; bacia do Pastaza, Equador; rio Tambo e região próxima a Iquitos, Peru.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari *et al.* (2005).

***Cetopsis sandrae* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Córrego na Fazenda Buriti, Nova Mutum, 13°52'52"S 56°11'36"W, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Arinos, bacia do alto Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsis sarcodes* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Rio Tocantins entre a UHE Cana Brava e a ilha do orgulho, Minaçu/Cavalcanti, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Denticetopsis epa* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Igarapé do Limão, rio Tocantins, Baião, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Denticetopsis seducta* Vari, Ferraris & de Pinna, 2005**

Localidade-tipo: Arroio Sabalito, pequeno córrego ao sul de Iquitos, Peru.

Distribuição: Porções central e baixa da Bacia Amazônica; sudoeste da bacia do Orinoco, Venezuela.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari *et al.* (2005).

***Helogenes gouldingi* Vari & Ortega, 1986**

Localidade-tipo: Igarapé a 15 Km de Humaitá, rio Madeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Helogenes marmoratus* Günther, 1863**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Drenagens do Atlântico da Guiana, Suriname e Guiana Francesa; parte superior dos rio Orinoco e Negro na Venezuela, bacia do Amazonas no Brasil, Peru e Equador.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari & Ortega (1986).

## Família Aspredinidae

Leonardo Ferreira da Silva Ingenito &  
Luisa M. Soares-Porto

### ***Amaralia hypsiura* (Kner, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Branco, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica e alto Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Ihering (1930).

### ***Aspredinichthys filamentosus* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Cayenne, Guiana Francesa.  
Distribuição: Bacia do baixo Amazonas e rios costeiros do norte do Brasil, Guianas e Suriname.  
Documentação primária: Lote de referência (CAS 57672).

### ***Aspredinichthys tibicen* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Desconhecida (Suriname).  
Distribuição: Bacia do baixo Amazonas e rios costeiros do norte do Brasil, Guianas e Suriname.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 27294.  
Referência: Burgess (1989).

### ***Aspredo aspredo* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: Desconhecida ("in Americae fluviis").  
Distribuição: Bacia do baixo Amazonas e rios costeiros do norte do Brasil, Guianas e Suriname.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 24604.

### ***Bunocephalus amazonicus* (Mees, 1989)**

Localidade-tipo: Riacho próximo de Todos os Santos, Rio Mamoré, Cochabamba, Bolívia.  
Distribuição: Bacia dos rios Solimões e Mamoré.  
Documentação primária: Lote de referência (MCZ 7980).

### ***Bunocephalus coracoideus* (Cope, 1874)**

Localidade-tipo: Nauta, Peru.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 23032).

### ***Bunocephalus doriae* Boulenger, 1902**

Localidade-tipo: Rio Paraná, Villa Rica, Paraguai e Posadas, Argentina.  
Distribuição: Bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 13170.  
Referência: Britski *et al.* (1999).

### ***Bunocephalus iheringii* Boulenger, 1891**

Localidade-tipo: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Uruguai, rios costeiros do Estado do Rio Grande do Sul e médio Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Malabarba (1989), Myers (1927).  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.  
Observações: No Paraíba do Sul há apenas o registro dos holótipos de *Bunocephalus salatheii* Myers, 1927 e *Bunocephalus carvalhoi* Miranda-Ribeiro, 1944.

***Bunocephalus larai* Ihering, 1930**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

***Bunocephalus verrucosus* (Walbaum, 1792)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Essequibo.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 6351).

***Micromyzon akamai* Friel & Lundberg, 1996**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, acima da confluência com o rio Pará, 2°02'S 49°17'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Platystacus cotylephorus* (Bloch, 1794)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacia do baixo Amazonas e rios costeiros do norte do Brasil, Guianas e Suriname.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 8418).

***Pterobunocephalus depressus* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Machupo próximo de San Joaquín, Bolívia.

Distribuição: Bacias dos rios Mamoré, Paraguai e Orinoco.

Documentação primária: Lote de referência (FMNH 70625).

Observações: Ocorrência registrada somente nos rios fronteirissos entre Brasil e Bolívia e Brasil e Paraguai.

***Pterobunocephalus dolichurus* Delsman, 1941**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, próximo de Óbidos, Brasil.

Distribuição: Rio Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Poucos registros.

**Família Trichomycteridae: Copionodontinae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

***Copionodon lianae* Campanario & de Pinna, 2000**

Localidade-tipo: Rio Grisane (Bacia do rio Mucujê), 13°08'S 41°17'W, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Copionodon orthiocarinatus* de Pinna, 1992**

Localidade-tipo: Rio Mucujê, tributário do rio Paraguaçu, 13°00'S e 41°23'W, 1200 m acima do nível do mar, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Copionodon pecten* de Pinna, 1992**

Localidade-tipo: Rio Mucujê, tributário do rio Paraguaçu, 13°00'S e 41°23'W, 1200 m acima do nível do mar, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glaphyropoma rodriguesi* de Pinna, 1992**

Localidade-tipo: Rio Mucujê, tributário do rio Paraguaçu, 13°00'S e 41°23'W, 1200 m acima do nível do mar, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Trichomycteridae: Tridentinae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

***Miuroglanis platycephalus* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Jutahy (= Jutai).

Distribuição: Rio Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Miuroglanis* sp.**

Distribuição: Estado do Amazonas, Parintins, igarapé do lago José-Açu.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 7805).

***Tridens melanops* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Içá.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Tridentopsis pearsoni* Myers, 1925**

Localidade-tipo: Lagoons at Lake Rogoagua, Bolívia.

Distribuição: Santarém.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: La Monte (1939).

***Tridentopsis tocantinsi* LaMonte, 1939**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, nordeste do Brasil.

Distribuição: Rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Tridentopsis* sp.**

Distribuição: Estado do Amazonas, Ati-Paraná, lago Buiucu.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 8030).

**Família Trichomycteridae: Trichogeninae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

***Trichogenes longipinnis* Britski & Ortega, 1983**

Localidade-tipo: Cachoeira do Amor, km 3 da estrada Parati-Ubatuba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Litorais norte do Estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

## Família Trichomycteridae: Trichomycterinae

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

### ***Ituglanis macunaima* de Pinna & Landin, 2005**

Localidade-tipo: Corixo da Saudade (corioxozinho), 14°17'20,6"S 51°9'12,1"W, Cocalzinho, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Tributários da margem esquerda do rio Araguaia, em Mato Grosso.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis amazonicus* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Cudajás, 03°55'S 62°00'W, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis bambui* Bichuette & Trajano, 2004**

Localidade-tipo: Tributário superior do principal curso d'água subterrâneo da caverna Angélica, Parque Estadual Terra Ronca, 13°31'S 46°23'W, São Domingos, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia subterrânea da Caverna Angélica, tributário do rio Paranã, bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis eichorniarum* (Miranda Ribeiro, 1912)**

Localidade-tipo: Cáceres, nas margens do Paraguai (M. Grosso), Estado do Mato Grosso (16°05'S 57°50'W), Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis epikarsticus* Bichuette & Trajano, 2004**

Localidade-tipo: Bacias de travertino na caverna São Mateos, 13°40'S 46°22'W, Parque Estadual de Terra Ronca, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis herberti* (Miranda Ribeiro, 1940)**

Localidade-tipo: Rio Bodoquena, Pantanal, Estado do Mato Grosso, Bodoquena (20°40'S 56°50'W), Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis macuanima* Datovo & Landim, 2005**

Localidade-tipo: Corixo da Saudade, 14°17'20,6S 51°9'12,1"W, bacia do rio Araguaia, Cocalinho, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Tributários da margem esquerda do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Ituglanis parahybae* (Eigenmann, 1918)**

Localidade-tipo: Foz do rio Paraíba do Sul, 21°40'S 41°00'W, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Ituglanis parkoi* (Miranda Ribeiro, 1944)**

Localidade-tipo: Rio Iticoai (entre os rios das Pedras e Ituí) que deságua no Javari, afluente do Amazonas – Benjamin Constant, 4°30'S 70°05'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ituglanis passensis* Fernández & Bichuette, 2002**

Localidade-tipo: Caverna Passa Três, rio subterrâneo na bacia do Tocantins, Município de São Domingos, 13°36'S 46°23'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ituglanis proops* (Miranda Ribeiro, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Ribeira, Iguape, foz do rio Rio Ribeira de Iguape, 24°50'S 47°10'W, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ituglanis ramiroi* Bichuette & Trajano, 2004**

Localidade-tipo: Poço na caverna São Bernardo, 13°49'S 46°21'W, a aproximadamente 700 m da entrada, Parque Estadual Terra Ronca, São Domingos, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Scleronema angustirostris* (Devincenzi, 1942)**

Localidade-tipo: La Cañeda de las Piedras, Rio Uruguai, Uruguai.

Distribuição: Bacia do Uruguai e bacia do Gualba (rio Jacuí), Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 19136).

***Scleronema minutum* (Boulenger, 1891)**

Localidade-tipo: Município de São Lorenzo, 28°30'S 54°40'W, São Lourenço das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Scleronema operculatum* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Cacequi, 29°50'S 54°55'W, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus pauciradiatus* Alencar & Costa, 2006**

Localidade-tipo: Córrego Debaixo da Serra, 21°26'40"S 44°36'09"W, tributário do córrego Água Limpa, Município de Carrancas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus albinotatus* Costa, 1992**

Localidade-tipo: 1 km à oeste da Vila de Maromba, rio Preto, Bacia do rio Paraíba, 22°30'S 44°15'W, Visconde de Mauá, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.



***Trichomycterus alternatus* (Eigenmann, 1917)**

Localidade-tipo: Foz do Rio Doce, 19°30'S 39°40'W, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Sudeste do Brasil entre o Estado do Paraná e a bacia do Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Triques & Vono (2004).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável (como "*Trichomycterus travassosi*") no Estado do Rio de Janeiro.

***Trichomycterus auroguttatus* Costa, 1992**

Localidade-tipo: 1 km à oeste da Vila de Visconde de Mauá, rio Marimbondo, afluente do rio Preto, bacia do rio Paraíba, 22°30'S 44°15'W, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Trichomycterus bahianus* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Una, 6,5 km à sudeste da Vila de São José, córrego afluente do ribeirão Caveira, bacia do rio Una, 15°35'S 39°20'W, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus brasiliensis* Lütken, 1874**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, 17°10'S 46°31'W, foz do rio das Velhas, bacia do Rio São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus candidus* (Miranda Ribeiro, 1949)**

Localidade-tipo: Pequeno córrego que cai no ribeirão Espírito Santo, afluente do Rio Claro e este do Sapucaí, que deságua no Rio Grande, Município de Conceição Aparecida, 21°00'S 46°15'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus castroi* de Pinna, 1992**

Localidade-tipo: Afluente do Rio Iguaçu, próximo à ponte da Rodovia Curitiba-Paranaguá (BR 277), Estado do Paraná, 25°26'S 49°06'W, Brasil.

Distribuição: Alto e médios rio Iguaçu (bacia do Paraná).

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Trichomycterus concolor* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Córrego a 20 km ao sul da Vila de Garapuava, 16°05'S 46°35'W, bacia do rio São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus davisí* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: Serrinha (=Engenheiro Bley), bacia do Rio Iguaçu, 25°35'S 49°30'W, Estado do Paraná,

Distribuição: Alto e médios rio Iguaçu (bacia do Paraná) e nascentes do rio Ribeira do Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus diabolus* Bockmann, Casatti & de Pinna, 2004**

Localidade-tipo: Córrego São Carlos, 22°35'28,0"S 52°14'38,1"W, bacia do Parapanema, Parque Estadual do Morro do Diabo, Município de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Parapanema.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus gabrieli* (Myers, 1926)**

Localidade-tipo: Corredeiras de São Gabriel, Rio Negro, lagos rochosos, bacia do Rio Amazonas, 0°05' S 67°00'W, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus giganteus* Lima & Costa, 2005**

Localidade-tipo: rio Guandu-Mirim, bacia do rio Guandu, Campo Grande, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Guandu, na Serra do Mendanha, Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus goeldii* Boulenger, 1896**

Localidade-tipo: Riacho na Colonia Alpina, Município do Rio Janeiro, altitude de aproximadamente 2600 pés, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Trichomycterus guaraquessaba* Wosiacki, 2005**

Localidade-tipo: Rio Bracinho, Fazenda Salto Dourado, Município de Guaraqueçaba, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus hasemani* (Eigenmann, 1914)**

Localidade-tipo: Santarém, 2°30'S 54°50'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus iheringi* (Eigenmann, 1917)**

Localidade-tipo: Riachos costeiros do Estado de São Paulo, Brasil, Sapina, Estado de São Paulo; 10785 I, Santos, São Paulo (24°00'S 43°25'W), bacia do Rio Ribeira (25°00'S 49°00'W), Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus immaculatus* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Juiz de Fora, Rio Parahybuna (= Paraibuna) Estado de Minas Gerais (21°40'S 43°25'W), Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus itacambirussu* Triques & Vono, 2004**

Localidade-tipo: Córrego Cabral, drenagem do Rio Itacambiruçu, bacia do Rio Jequitinhonha, 42°45'W 16°33'S, Município de Grão Mongol, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Itacambiruçu, bacia do Rio Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus itacarambiensis* Trajano & de Pinna, 1996**

Localidade-tipo: Caverna Olhos d'Águas, 15°06'06"S 44°09'30"W, Município de Itacarambi, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Trichomycterus itatiayae* Miranda Ribeiro, 1906**

Localidade-tipo: Itatiaya, . . . Em córrego afluente do Parahyba, 22°27'S 44°50'W, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus jacupiranga* Wosiacki & Oyakawa, 2005**

Localidade-tipo: Rio do Queimado, Parque Estadual de Jacupiranga, Cajati, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus jequitinhonhae* Triques & Vono, 2004**

Localidade-tipo: Córrego Laranjeiras, bacia do rio Jequitinhonha, 42°18'W 16°45'S, Município de Coronel Murta, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do Rio Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus johnsoni* (Fowler, 1932)**

Localidade-tipo: Descalvados, 16°40'S 57°40'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus landinga* Triques & Vono, 2004**

Localidade-tipo: Córrego Moquéim, bacia do rio Jequitinhonha, Município de Coronel Murta, 42°35'W 16°45'S, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus longibarbus* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Próximo da Vila de Santa Tereza, 19°50'S 40°25'W, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus maracaya* Bockmann & Sazima, 2004**

Localidade-tipo: Córrego sem nome, bacia do rio Pardo, base do Morro do Ferro, Poços de Caldas, 46°31'50"S 21°46'45"W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus mboyacy* Wosiacki & Garavello, 2004**

Localidade-tipo: Foz do rio Jordão, tributário do rio Iguaçu (bacia do rio Paraná), Reservatório do Jordão, Município de Foz do Rio Jordão, Estado do Paraná, Brasil, 25°45'S e 52°10'W.

Distribuição: Médio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus mimonha* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Dois km ao norte da Vila de Piquete, rio Benfica, 22°50'S 45°10'W, bacia do rio Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Trichomycterus mirissumba* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Visconde de Mauá, 22°30'S 44°15'W, 1 km à leste da Vila de Maromba, rio Preto, próximo da confluência do córrego Santa Clara, bacia do rio Paraíba, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Trichomycterus naipi* Wosiacki & Garavello, 2004**

Localidade-tipo: Rio São João, tributário do rio da Várzea (bacia do rio Iguaçu), próximo a Lagoinha, Município de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, Brasil, 25°55'S 49°11'W.

Distribuição: Alto rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus nigricans* Valenciennes, 1846**

Localidade-tipo: Rio Itapocu, 26°10'S 48°35'W, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus pantherinus* Alencar & Costa, 2004**

Localidade-tipo: Rio da Prata, abaixo da Fazenda Sete Quedas, 20°03'15.9"S 40°32'20.5"W, bacia do rio Santa Maria da Vitória, Município de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus paolence* (Eigenmann, 1917)**

Localidade-tipo: Alto da Serra, 23°30'S 46°10'W, Mogi das Cruzes, Rio Tietê, bacia do Paraná, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Trichomycterus papilliferus* Wosiacki & Garavello, 2004**

Localidade-tipo: Foz do rio Jordão, tributário do rio Iguaçu (bacia do rio Paraná), Reservatório do Jordão, Município de Foz do Rio Jordão, Estado do Paraná, Brasil, 25°45'S 52°10'W.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus paquequerense* (Miranda Ribeiro, 1943)**

Localidade-tipo: Rio Paquequer Grande, 22°30'S 43°00'W, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Trichomycterus plumbeus* Wosiacki & Garavello, 2004**

Localidade-tipo: Foz do rio Jordão, tributário do rio Iguaçu (bacia do rio Paraná), Reservatório do Jordão, Município de Foz do Rio Jordão, Estado do Paraná, Brasil, 25°45'S 52°10'W.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus potschi* Barbosa & Costa, 2003**

Localidade-tipo: Rio das Cachoeiras, serra do Matutu, Município de Mangaratiba, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras entre Mangaratiba e Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus pradensis* Sarmento-Soares *et al.*, 2005**

Localidade-tipo: Rio Jucuruçu, 16°50'10"S 40°08'40"W, a 2 km da cidade de Jucuruçu, Município de Jucuruçu, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Jucuruçu, Itanhém e Peruíbe.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus punctatissimus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Araguaia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus reinhardti* (Eigenmann, 1917)**

Localidade-tipo: Rio Itabira, afluente do Rio das Velhas, 20°00'S 47°00'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus santaeritae* (Eigenmann, 1918)**

Localidade-tipo: Santa Rita, Rio Preto, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus stawiarski* (Miranda Ribeiro, 1968)**

Localidade-tipo: Pequeno córrego pertencente à bacia do Rio Paraná, localidade de Bituruna, 26°10'S 51°30'W, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Médio rio Iguaçu (bacia do Paraná).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus taroba* Wosiacki & Garavello, 2004**

Localidade-tipo: Foz do rio Jordão, tributário do rio Iguaçu (bacia do rio Paraná), Reservatório do Jordão, Município de Foz do Rio Jordão, Estado do Paraná, Brasil, 25°45'S e 52°10'W.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trichomycterus trefauti* Wosiacki, 2004**

Localidade-tipo: Riacho Andrequicé, tributário do rio Paraúna, este tributário do rio das Velhas (bacia de rio São Francisco), Município de Trinta Réis, 18°30'S 43°30'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Trichomycterus triguttatus (Eigenmann, 1918)**

Localidade-tipo: Jacareí, 22°30'S 45°50'W, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

**Trichomycterus tupinamba Wosiacki & Oyakawa, 2005**

Localidade-tipo: Rio Betari, tributário do rio Ribeira de Iguape, em frente ao camping do Núcleo Santana, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Drenagens do Betari e do Iporanga, na bacia do Ribeira de Iguape.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Trichomycterus variegatus Costa, 1992**

Localidade-tipo: Vila de São Roque, rio do Peixe, afluente do Alto Rio São Francisco, 20°20'S 46°36'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio do Peixe, afluente do alto rio São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Trichomycterus vermiculatus (Eigenmann, 1918)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, 21°40'S 43°25'W, Juiz de Fora, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

**Trichomycterus zonatus (Eigenmann, 1918)**

Localidade-tipo: Água Quente (Cubatão), sete milhas a oeste de Santos, 23°40'S 46°25'W, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Rios litorâneos dos Estados de São Paulo e Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Trichomycteridae: Stegophilinae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &  
Mário C. C. de Pinna

**Acanthopoma annectens Lütken, 1892**

Localidade-tipo: Huallaga.  
Distribuição: Alto e médio Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30420).

**Apomatoceros alleni Eigenmann, 1922**

Localidade-tipo: Rio Morona, alto Amazonas.  
Distribuição: Alto e médio Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (ANSP 163752).

**Haemomaster venezuelae Myers, 1927**

Localidade-tipo: Playa Matepalma, Orinoco, Venezuela.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30375).

**Henonemus intermedius (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Goyaz, Brasil.  
Distribuição: Rio Araguaia.  
Documentação primária: Localidade tipo.

Naercio 10/27/06 5:09 PM  
Deleted: onas

***Henonemus macrops* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Lago Manacapuru, Bacia do Rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Henonemus punctatus* (Boulenger, 1887)**

Localidade-tipo: Canelos.

Distribuição: Rio Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência.

***Homodiaetus anisitsi* Eigenmann & Ward, 1907**

Localidade-tipo: Riacho em Villa Rica, Paraguai.

Distribuição: Baixo Paraná, rio Uruguai, rio Paraguai e bacias costeiras do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 16035.

Referência: Koch, 2002.

***Homodiaetus banguela* Koch, 2002**

Localidade-tipo: Rio São João, no cruzamento com a BR-101, Município de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio São João, Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Koch, 2002.

***Homodiaetus graciosa* Koch, 2002**

Localidade-tipo: Rio Sagrado, posto florestal, Morrete, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Rio Ribeira de Iguape e rios costeiros no Estado do Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Koch, 2002.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Homodiaetus passarellii* (Miranda Ribeiro, 1944)**

Localidade-tipo: Córrego do Barro Branco, Baía de Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Riachos costeiros desaguando na Baía da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Koch, 2002.

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Homodiaetus sp.***

Distribuição: Rio Cipó, a jusante do Parque Nacional da Serra do Cipó, Estado de Minas Gerais.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 73693).

***Megalocentor echthrus* de Pinna & Britski, 1991**

Localidade-tipo: Rio Madeira, Calama, Praia do Caraparu, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ochmacanthus alternus* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Caño de Quiribana, próximo a Caicara, Venezuela.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Lote de referência.

***Ochmacanthus batrachostoma* (Miranda Ribeiro, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai em São Luiz de Cáceres.

Distribuição: Rio Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ochmacanthus orinoco* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Playa Matepalma, Orinoco, Venezuela.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Lote de referência.

***Ochmacanthus reinhardti* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Rio Içá, Montalegre; Lago Manacapuru.

Distribuição: Rio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ochmacanthus* sp.**

Distribuição: Lago Miúá, acima de Codajás.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 23236).

***Parastegophilus paulensis* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Avanhanda, rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parastegophilus* sp. 1**

Distribuição: Acre, rio Tarauacá.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30415).

***Parastegophilus* sp. 2**

Distribuição: Rio Amazonas, Pará.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 57791).

***Parastegophilus* sp. 3**

Distribuição: Rio Paracá (afl. do rio Paraná), Estado do Paraná.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 22220).

***Pareiodon microps* Kner, 1855**

Localidade-tipo: Borba, Rio Madeira, ca. 4 dias da boca do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudostegophilus nemurus* (Günther, 1869)**

Localidade-tipo: Alto rio Amazonas, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30431).

***Pseudostegophilus* sp.**

Distribuição: Estado de Mato Grosso, Município de Miranda, lagoas ao longo da estrada Transpantaneira.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 38782).

***Schultzichthys bondi* (Myers, 1942)**

Localidade-tipo: Rio Apuré at San Fernando de Apuré, Venezuela.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30417).



***Stegophilus insidiosus* Reinhardt, 1859**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Bacia do Rio São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Stegophilus panzeri* (Ahl, 1931)**

Localidade-tipo: Rio Capim, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Trichomycteridae: Vandelliinae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

***Paracanthopoma parva* Giltay, 1935**

Localidade-tipo: Rio Catrimani superior.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Paracanthopoma sp. 1***

Distribuição: Rio Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30404).

***Paracanthopoma sp. 2***

Distribuição: Rio Branco.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 16555).

***Paracanthopoma sp. 3***

Distribuição: Rio Araguaia.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 53824).

***Paracanthopoma sp. 4***

Distribuição: Estado do Amazonas, rio Capucapu (trib. do rio Jatapu).

Documentação primária: Lote de referência (INPA 12430).

***Paravandellia oxyptera* Miranda Ribeiro, 1912**

Localidade-tipo: Cáceres, margens do Rio Paraguai.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Paravandellia sp.***

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 28450).

***Plectrochilus diabolicus* (Myers, 1927)**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.

Distribuição: Rio Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 63137).

***Plectrochilus machadoi* Miranda Ribeiro, 1917**

Localidade-tipo: Rio Solimões, Alto Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Plectrochilus sp. 1***

Distribuição: Rio Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 29215).

***Plectrochilus sp. 2***

Distribuição: Rondônia, Pimenta Bueno.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 10523).

***Plectrochilus sp. 3***

Distribuição: Rio Purus.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 29524).

***Vandellia cirrhosa Valenciennes, 1846***

Localidade-tipo: Provavelmente da América [= América do Sul].

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência.

***Vandellia sanguinea Eigenmann, 1917***

Localidade-tipo: San Antonio de Rio Madeira.

Distribuição: Bacias Amazônica, do Orenoco e do Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Vandellia sp. 1***

Distribuição: Rio Araguaia.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 63003).

***Vandellia sp. 2***

Distribuição: Rio Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 29155).

***Vandellia sp. 3***

Distribuição: Rio Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 16554).

***Vandellia sp. 4***

Distribuição: Rio Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 63260).

***Vandellia sp. 5***

Distribuição: Lago Supiá, em frente a Codajás.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 9676).

**Família Trichomycteridae: Sarcoglanidinae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

***Ammoglanis diaphanus Costa, 1994***

Localidade-tipo: Riacho afluente do rio Javaés, bacia do rio Araguaia, ca.40 km ao norte de Araguaçu, Estado de Tocantins, Brasil.

Distribuição: Rio Javaés, bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ammoglanis* sp. 1**

Distribuição: Ribeirão Poço Grande (afl. do rio Juquiá, bacia do rio Ribeira de Iguape).  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 22406).

***Microcambeva barbata* Costa & Bockmann, 1994**

Localidade-tipo: rio São João, próximo a Gaviões, Município de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Rio São João, Estado do Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Espírito Santo.

***Microcambeva ribeirae* Costa, Lima & Bizerril, 2004**

Localidade-tipo: Rio São Lourençinho, Bairro São Lourenço, Município Pedro de Toledo, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Rio Ribeira de Iguape.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Microcambeva* sp. 1**

Distribuição: Córrego Urucum (afl. rio São José), Estado do Espírito Santo.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 53223).

***Microcambeva* sp. 2**

Distribuição: Rio Santo Antônio (afl. Rio Doce), Estado de Minas Gerais.  
Documentação primária: Lote de referência (ANSP 174051).

***Sarcoglanis simplex* Myers & Weitzman, 1966**

Localidade-tipo: Poças de pedra abaixo das corredeiras de São Gabriel, rio Negro (abaixo da cidade de Uaupés, antiga São Gabriel), Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Altos rio Negro e rio Branco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Stauroglanis goudingi* de Pinna, 1989**

Localidade-tipo: Cachoeira do Aracu, rio Daraá (bacia do Rio Negro), Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Trichomycteridae: Glanapteryginae**

Wolmar Benjamin Wosiacki &

Mário C. C. de Pinna

***Glanapteryx anguilla* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Corredeiras de São Gabriel, sistema do Rio Negro, Brasil.  
Distribuição: Rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Glanapteryx niobium* de Pinna, 1998**

Localidade-tipo: Parque Nacional do Pico da Neblina, Morro dos Seis Lagos, Lago Esperança, Estado do Amazonas.  
Distribuição: Morro dos Seis Lagos, bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Listrura boticario* de Pinna & Wosiacki, 2002**

Localidade-tipo: Poça adjacente do rio da Figueira (tributário do rio Morato, bacia do rio Guaraqueçaba), na Reserva Particular do Patrimônio Natural Salto Morato, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios da Figueira e Guaraqueçaba, Estado do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Listrura camposi* Miranda Ribeiro, 1957**

Localidade-tipo: Rio Poço Grande, afl. do rio Juquiá, Fazenda Poço Grande, Juquiá, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Ribeirão Poço Grande, bacia do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

***Listrura nematopteryx* de Pinna, 1988**

Localidade-tipo: Pequeno manancial de um córrego tributário do ribeirão Imbariê (tributário do rio Estrela), próximo ao Km 58 da "antiga Rio-Petrópolis (Estrada Automóvel Club), Piabetá, Magé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Conhecida da localidade-tipo e de habitats semelhantes em Picinguaba, Estado de São Paulo

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio de Janeiro.

***Listrura tetradia* Landim & Costa, 2002**

Localidade-tipo: Rio da Represa (tributário do rio Bom Sucesso, rio Ibicuíba da bacia da Lagoa de Araruama), Palmital, aproximadamente 5 km de Bacaxá, Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio Ibicuíba, sistema da Lagoa de Araruama.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Pygidianops eigenmanni* Myers, 1944**

Localidade-tipo: Poças de pedra abaixo das corredeiras de São Gabriel, Rio Negro (abaixo da cidade de Uaupés, antiga São Gabriel), Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pygidianops sp. 1***

Distribuição: Igarapé do Acará (bacia do Rio Negro), Reserva Ducke, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 16556).

***Pygidianops sp. 2***

Distribuição: Rio Tacutu, Bonfim, Estado de Roraima.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 8080).

***Typhlobelus macromycterus* Costa & Bockmann, 1994**

Localidade-tipo: Rio Tocantins próximo a Tucuruí, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Typhlobelus ternetzi* Myers, 1944**

Localidade-tipo: Poças de pedra abaixo das corredeiras de São Gabriel, rio Negro (abaixo da cidade de Uaupés, antiga São Gabriel), Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Alto rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Typhlobelus sp.***

Localidade-tipo: Rio Xingu em Coronel Porfírio, Brasil.

Distribuição: Rio Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 12929).

**Família Callichthyidae**

Marcelo Ribeiro de Britto

***Aspidoras albater* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Rio Tocantininha próximo a São João da Aliança, bacia do Tocantins, 14°46'S 47°30'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras belenos* Britto, 1998**

Localidade-tipo: Córrego na rodovia Primavera do Leste - Paranatinga, 82 km norte de Primavera do Leste, bacia do rio das Mortes, 15°03'S 52°03'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britto (1998).

***Aspidoras brunneus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Serra do Roncador, Km 125 da rodovia Xavantina-Caximba, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingú.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras carvalhoi* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Açude Canabrava, Guaramiranga, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacia litorânea do Nordeste.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

Observações: Possivelmente ocorrendo na bacia do rio Choró.

***Aspidoras depinnai* Britto, 2000**

Localidade-tipo: Córrego na rodovia Amaraji - Primavera, bacia do rio Ipojuca, 08°21'S 35°26'W, Estado de Pernambuco, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Nordeste, da bacia do rio Ipojuca até a bacia do rio Una.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britto (2000), Evers (2001).

***Aspidoras eurycephalus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Córrego Vermelho, rio das Almas, afluente do rio Maranhão, bacia do Tocantins, cerca de 15°S 49°30'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aspidoras fuscoguttatus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Córrego Corguinho, estrada das Três Lagoas, Conceição do Taboado, bacia do Paraná, 20°46'S 51°43'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras lakoi* Miranda Ribeiro, 1949**

Localidade-tipo: Pequeno córrego na floresta do Grotão, Fazenda da Cachoeira, Município de Passos, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Miranda Ribeiro (1949), Miranda Ribeiro (1959), Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras maculosus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Pequeno riacho rápido e pedregoso na Serra Jacobina entre Bom Fim e Jacobina, rio Paiaia, nas cabeceiras do Itapicurú, cerca de 11°S 40° 30'W, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Itapicurú e Paraguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras menezesi* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Rio Granjeiro em Crato, afluente da margem esquerda do rio Salgado, 07°10'S 39°25'W, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Jaguaribe e Salgado.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras microgalaeus* Britto, 1998**

Localidade-tipo: Pequeno afluente do rio Culuene, Km 86 da rodovia Paranatinga - Canarana, bacia do rio Xingú, 14°00'S 54°38'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britto (1998).

***Aspidoras pauciradiatus* (Weitzman & Nijssen, 1970)**

Localidade-tipo: Rio Araguaia próximo a Aruanã, 14°58'S 51°04'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Weitzman & Nijssen (1970), Nijssen & Isbrücker (1976b).

Observações: *Aspidoras cf. pauciradiatus* registrada do rio Negro por Weitzman & Balph (1979).

***Aspidoras poecilus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Córrego a montante da Vila Pororí, margem esquerda do rio Xingú, alto rio Xingú, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Xingu e Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aspidoras psammatides* Britto, Lima & Santos, 2005**

Localidade-tipo: Rio Caldeirão, 12°39'33"S 41°22'12"W, Município de Lençóis, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do alto rio Paraguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aspidoras raimundi* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Em pequenos córregos que desaguam no rio Parnaíba, em Victoria (=alto Parnaíba), Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1907a), Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras rochai* Ihering, 1907**

Localidade-tipo: Proveniente de Fortaleza, 03°45'S 38°35'W, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacia litorânea do Nordeste ao redor de Fortaleza.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Ihering (1907), Nijssen & Isbrücker (1976b).

Observações: Possivelmente bacias dos rios Coco, Coaçu, Maranguape e Ceará.

***Aspidoras pilotus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Riacho dos Macacos, afluente do rio Acaráu, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Acaráu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1976b).

***Aspidoras taurus* Lima & Britto, 2001**

Localidade-tipo: Município de Alto Garças, fazenda Cabeceira do Itiquira, próximo a rodovia BR-364, rio Itiquira, bacia do Paraguai, 16°56'S 53°32'W, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lima & Britto (2001).

***Aspidoras velites* Britto, Lima & Moreira, 2002**

Localidade-tipo: Município de Alto Araguaia, córrego boiadeiro, Km 487,08 da ferrovia Ferronorte, 17°20'01"S 53°14'53"W, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britto *et al.* (2002).

***Aspidoras virgulatus* Nijssen & Isbrücker, 1980**

Localidade-tipo: Córrego Chumbado, estrada de Linhares (19°22'S 40°04'W) a São Mateus (18°44'S 39°53'W), Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacias litorâneas ao norte do rio Doce até ribeirão Trancoso no sul do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Callichthys callichthys* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: Rios da América.

Distribuição: Alto curso das bacias dos rios Amazonas, Araguaia, Paraguai, Uruguai, Madeira, São Francisco, Paraná, litorâneas do Sul e Sudeste.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Linnaeus (1758), Lehmann A. & Reis (2004).

***Callichthys serralabium* Lehmann A. & Reis, 2004**

Localidade-tipo: La Esmeralda, lagoa Tonina, 01 km a montante de La Esmeralda, alto rio Orinoco, 03°08'00"N 65°32'00"W, Estado Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Orinoco e Negro.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 64367).

Referência: Lehmann A. & Reis (2004).

***Corydoras acrensis* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Furo do lago São Francisco, afluente da margem esquerda do rio Juruá, a montante da confluência com Mao [sic] (=Moá) em Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Juruá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras acutus* Cope, 1872**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Bacias do Ambyiacu e Solimões.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 3625).

***Corydoras adolfi* Burgess, 1982**

Localidade-tipo: Pequeno afluente do alto rio Negro, na linha do Equador, próximo a São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Burgess (1982).

***Corydoras aeneus* (Gill, 1858)**

Localidade-tipo: Ilha de Trinidad,Trinidad-Tobago.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná, Paraguai, Ambyacu, Ucayali, Maroni (Marowijne), Saramacca, Gran Rio, Napo, Madeira, Orinoco e Uruguai.

Documentação primária: bibliográfica.

Referências: Nijssen & Isbrücker (1980b), Nijssen & Isbrücker (1986b), Castro (1987).

***Corydoras agassizii* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Amazonas próximo a Tabatinga, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1876), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras amandajanae* Sands, 1995**

Localidade-tipo: Rio Miua, 10 a 12 km da confluência com o Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sands (1995).

***Corydoras amapaensis* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Córrego Cachoeira, na margem direita do rio Amapari, 4 km a jusante de Casa do Sete, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Araguari e Oiapoque.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras ambiacus* Cope, 1872**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Bacias do Ambyiacu e Solimões.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 3610).



***Corydoras araguaiaensis* Sands, 1990**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sands (1990).

***Corydoras areio* Knaack, 2000**

Localidade-tipo: Em afluente da bacia do córrego Areio, nos arredores de Vila-Nova na rodovia 373, cerca de 8,5 km e cerca de 13,5 km do vilarejo em direção a Poxoréu, Estado de Mato Grosso (a leste de Cuiabá), Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Corydoras aurofrenatus* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Aguada, próximo ao arroio Trementina, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 36720).

***Corydoras baderi* Geisler, 1969**

Localidade-tipo: Rio Paru do Oeste e riacho próximo a Missão Tirió, 02°12'N 55°59'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Paru do Oeste e Marowijne.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Geisler (1969), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras bifasciatus* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Córrego na margem esquerda do rio Cururu, afluente do alto curso do rio Tapajós, próximo a Maloca do Gonzalo [sic] (=Gonçalo), cerca de 07°45'S 58°00'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras blochi* Nijssen, 1971**

Localidade-tipo: Essequibo, córrego Moco próximo a Lethem, afluente do rio Tacutú, bacia do rio Branco, Guiana.

Distribuição: Bacias do Essequibo, Orinoco, Solimões e Branco.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 8580).

Referência: Nijssen (1971).

***Corydoras britskii* Nijssen & Isbrücker, 1983**

Localidade-tipo: Lagoas marginais, rodovia Transpantaneira, Poconé, 16°15'S 56°37'W, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Corydoras burgessi* Axelrod, 1987**

Localidade-tipo: Rio Unini, afluente do Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Axelrod (1987).

***Corydoras caudimaculatus* Rösse, 1961**

Localidade-tipo: Cabeceira do rio Guaporé, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rösse (1961), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras cervinus* Rösse, 1962**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rösse (1962), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras cochui* Myers & Weitzman, 1954**

Localidade-tipo: Santa Maria Nova, rio Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Araguaia e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras concolor* Weitzman, 1961**

Localidade-tipo: Las Mangas, em afluente do Parguaza, Estado Bolívar, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Orinoco e Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 35617).

***Corydoras condiscipulus* Nijssen & Isbrücker, 1980**

Localidade-tipo: Córrego Cumuri na margem esquerda do rio Oiapoque, a montante das primeiras correntezas de Grande Roche, a sudoeste do Município de Oiapoque (Brasil, Estado do Amapá), 03°54'S 51°46'W, Guiana Francesa.

Distribuição: Bacia do Oiapoque.

Documentação primária: Lote de referência (ZMA 115.355).

Referência: Nijssen & Isbrücker (1980a).

***Corydoras crimmeni* Grant, 1997**

Localidade-tipo: Rio Branco próximo a Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Branco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Grant (1997).

***Corydoras crypticus* Sands, 1995**

Localidade-tipo: Rio Miuã, 10 a 12 km da confluência com o Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sands (1995).

***Corydoras davidsandsi* Black, 1987**

Localidade-tipo: Rio Unini, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Black (1987).

***Corydoras difluviatilis* Britto & Castro, 2002**

Localidade-tipo: Município de Santa Rita do Passa Quatro, Parque Estadual de Vassununga, Gleba Pé-do-Gigante, córrego Paulicéia, afluente do rio Pardo, bacia do rio Paraná, 21°38'S 47°38'W, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britto & Castro (2002).

***Corydoras duplicareus* Sands, 1995**

Localidade-tipo: Rio Poranga, afluente do Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sands (1995).

***Corydoras ehrhardti* Steindachner, 1910**

Localidade-tipo: Afluentes próximos a Jaraguá, 26°21'S 48°49'W, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras desde a bacia do rio Ribeira de Iguape até a bacia do rio Itajaí-Mirim e bacias dos rios Iguaçu e Paranapanema.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1910), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras elegans* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1876), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras ellisae* Gosline, 1940**

Localidade-tipo: Sapucay, arroio Poná, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 78774).

***Corydoras ephippifer* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Córrego Cachoeira, na margem direita do rio Amapari, 4 km a jusante de Casa do Sete, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguari.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras eques* Steindachner, 1877**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em Codajás, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1876), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras evelynae* Rössel, 1963**

Localidade-tipo: Alto Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rössel (1963), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras flaveolus* Ihering, 1911**

Localidade-tipo: Pequenos riachos afluentes do rio Piracicaba, acima de Salto, 23°10'S 47°16'W, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Ihering (1911), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras garbei* Ihering, 1911**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios São Francisco e Jaguaribe.

Documentação primária: Localidade tipo (MNRJ 1007).

Referências: Ihering (1911), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras gossei* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Córrego próximo a Guajará-Mirim, bacia do rio Mamoré, 10°50'S 65°21'W, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Mamoré.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras gracilis* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Rio Jaúna (=Rio Juma) na Transamazônica, afluente da margem direita do Rio Aripunã (= Roosevelt), bacia do Rio Madeira, 6° 09' S 59° 55' W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1980b).

Observações: Localidade corrigida em Nijssen & Isbrücker (1980).

***Corydoras guapore* Knaack, 1961**

Localidade-tipo: Alto rio Guaporé, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Knaack (1961), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras haraldschultzi* Knaack, 1962**

Localidade-tipo: Rodovia entre Pedro Afonso (8°59'S 48°12'W) e Itacajá (8°18'S 47°45'W), bacia do rio Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Tocantins e Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Knaack (1962), Nijssen & Isbrücker (1980b).

Observações: Localidade tipo restrita por Nijssen & Isbrücker (1980).

***Corydoras hastatus* Eigenmann & Eigenmann, 1888**

Localidade-tipo: Vila Bela (=Parintins), Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1888), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras imitator* Nijssen & Isbrücker, 1983**

Localidade-tipo: Alto rio Negro, localidade exata desconhecida, provavelmente riachos de florestas atravessando a "rodovia Novo Exército", norte de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1983a).

***Corydoras incolicana* Burgess, 1993**

Localidade-tipo: Rio Içana, alto Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Burgess (1993).

***Corydoras julii* Steindachner, 1906**

Localidade-tipo: Na foz de riachos próximos à Victoria (=alto Parnaíba [?]), Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Parnaíba e baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1906), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras kanei* Grant, 1997**

Localidade-tipo: Rio Branco próximo a Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Branco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Grant (1997).

***Corydoras lacerdai* Hieronimus, 1995**

Localidade-tipo: Rio Ribeira da Terra Firme, entre Canavieiras e Ilhéus, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Ribeira da Terra Firme e Ribeira Grande.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Hieronimus (1995).

***Corydoras latus* Pearson, 1924**

Localidade-tipo: Beni, lagoas, lago Rogoágua, Bolívia.

Distribuição: Bacias do Beni e Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 36381).

***Corydoras leopardus* Myers, 1933**

Localidade-tipo: Ao sul do Amazonas; "suspeito que possa ser o rio Itapicuru ou o rio Paraíba. (Myers, 1933)", Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Maracanã.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Myers (1933), Nijssen & Isbrücker (1980b).

Observações: Localidade tipo restrita por Nijssen & Isbrücker (1980): Maracanã (0° 46 ' S 47° 24' W), Estado do Pará, Brasil.

***Corydoras maculifer* Nijssen & Isbrücker, 1971**

Localidade-tipo: Riacho Sangadina, 2 km a oeste de Xavantina, afluente do rio das Mortes, 14°45'S 52°20'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen & Isbrücker (1971), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras melini* Lönnberg & Rendahl, 1930**

Localidade-tipo: Iuaretê, na confluência dos rios Papuri e Uaupés, 0°35'N 69°13'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Negro, Orinoco e Japurá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Lönnberg & Rendahl (1930), Nijssen & Isbrücker (1980b), Nijssen & Isbrücker (1983c).

***Corydoras multimaculatus* Steindachner, 1907**

Localidade-tipo: Afluente do rio Preto, próximo a Santa Rita de Cássia, cerca de 11°00'S 44°30'W, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1907b), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras multiradiatus* (Orcés V., 1960)**

Localidade-tipo: Afluente ocidental do rio Lagartococha, próximo ao povoado de Garza-Cocha, bacia do alto Napo, Equador.

Distribuição: Bacias do Napo, Marañon, Ucayali e Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 26822).

Referência: Nijssen & Isbrücker (1983b).

***Corydoras narcissus* Nijssen & Isbrücker, 1980**

Localidade-tipo: Bacia do rio Purus, afluente do rio Ipixuna, 30 km a oeste de Humaitá, 7°31'S 63°16'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1980a).

***Corydoras nattereri* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Afluente do rio Paraíba do Sul, 3 milhas acima, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias litorâneas desde a bacia do rio Mucuri até a bacia do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1876), Nijssen & Isbrücker (1980b), Nijssen & Isbrücker (1980c).

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Corydoras nijsseni* Sands, 1989**

Localidade-tipo: Principais afluentes de águas claras do rio Negro, a montante de São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sands (1989).

***Corydoras ornatus* Nijssen & Isbrücker, 1976**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, 80 km a leste de Jacareacanga, 6°09'S 58°15'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen & Isbrücker (1976a), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras ourastigma* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Rio Iquiri (=Rio Ituxi), na rodovia Rio Branco - Abunã, 47 km de Rio Branco, bacia do Rio Purus, 10°00'S 67°30'W, Estado do Acre, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras paleatus* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Originalmente não registrada; Buenos Aires, rio Paraná em San Pedro, 220 km a noroeste de Buenos Aires, 33°43'S 59°45'W, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Uruguai e Paraná, e bacias litorâneas desde a bacia do rio Itapocu (Santa Catarina) até a bacia da lagoa dos Patos (Rio Grande do Sul).

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 8970).

Referências: Cope (1894), Nijssen & Isbrücker (1980b), Miranda Ribeiro (1959).

***Corydoras parallelus* Burgess, 1993**

Localidade-tipo: Rio Içana, alto Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Burgess (1993).

***Corydoras pinheiroi* Dinkelmeyer, 1995**

Localidade-tipo: Rio Ribeiro próximo a Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Mamoré.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Dinkelmeyer (1995).

***Corydoras polystictus* Regan, 1912**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Regan (1912), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras pulcher* Isbrücker & Nijssen, 1973**

Localidade-tipo: Rio Purus, norte de Lábrea, Bacia Amazônica, 7°20'S 64°46'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker & Nijssen (1973), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras pygmaeus* Knaack, 1966**

Localidade-tipo: Nos arredores de Calama, ao longo do rio Madeira próximo a foz do rio Ji-paraná (=rio Machado), 8°05'S 62°52'W, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Knaack (1966), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras rabauti* La Monte, 1941**

Localidade-tipo: Em um afluente do rio Amazonas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: La Monte (1941), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras reticulatus* Fraser-Brunner, 1938**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em Monte Alegre, 2°00'S 54°04'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Fraser-Brunner (1938), Nijssen & Isbrücker (1980b), Weitzman (1960).

***Corydoras robineae* Burgess, 1983**

Localidade-tipo: Rio Aiuna, um afluente, ao sul, do médio Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Burgess (1983).

***Corydoras robustus* Nijssen & Isbrücker, 1980**

Localidade-tipo: Bacia do rio Purus, afluente do rio Ipixuna, 30 km a oeste de Humaitá, 7°31'S 63°16'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1980a).

***Corydoras sararensis* Dinkelmeyer, 1995**

Localidade-tipo: Rio Sararé, afluente do Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Dinkelmeyer (1995).

***Corydoras schwartzi* Rössel, 1963**

Localidade-tipo: Foz do rio Purus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rössel (1963), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras semiaquilus* Weitzman, 1964**

Localidade-tipo: Igarapé Preto, pequeno córrego de floresta nas cabeceiras de córregos de água preta, que desembocam no alto Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Weitzman (1964), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras serratus* Sands, 1995**

Localidade-tipo: Rio Poranga, oito km ao norte de Nobua Oba, onde os dois rios unem-se em um pequeno afluente do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sands (1995).

***Corydoras seussi* Dinkelmeyer, 1996**

Localidade-tipo: Pequenos afluentes do rio Pacaás Novos, afluente da margem direita do rio Mamoré próximo a Guajará-Mirim, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Mamoré.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Dinkelmeyer (1996).

***Corydoras similis* Hieronimus, 1991**

Localidade-tipo: Afluente do rio Madeira, próximo a Ariquemes, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Hieronimus (1991).



***Corydoras sodalis* Nijssen & Isbrücker, 1986**

Localidade-tipo: Rio Yavari, Cano de Guavariba na confluência com o lago Matamata, 4°12'S 70°17'W, Loreto, Peru.

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 26817).

Referência: Nijssen & Isbrücker (1986a).

***Corydoras solox* Nijssen & Isbrücker, 1983**

Localidade-tipo: Bacia do rio Oiapoque, 60 km sul de Vila Martinique, 03°51'N 51°53'W, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Oiapoque.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Nijssen & Isbrücker (1983a).

***Corydoras spectabilis* Knaack, 1999**

Localidade-tipo: Vila Bela, alto rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Knaack (1999).

***Corydoras splendens* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Castelnau (1855), Nijssen & Isbrücker (1970).

***Corydoras steindachneri* Isbrücker & Nijssen, 1973**

Localidade-tipo: Paranaguá, 25°32'S 48°36'W, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia de Paranaguá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker & Nijssen (1973), Nijssen & Isbrücker (1980b).

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Corydoras sterbai* Knaack, 1962**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Knaack (1962), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras treitlii* Steindachner, 1906**

Localidade-tipo: Em pequenos córregos que desaguam no rio Parnaíba, Em Victoria (=alto Parnaíba), Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Steindachner (1906), Nijssen & Isbrücker (1980b), Weitzman (1964).

***Corydoras trilineatus* Cope, 1872**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Bacias Amazônica, dos rios Ambyiacu, Solimões, Madeira, Ucayali, Napo, e bacias ao redor de Paramaribo, Suriname.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 27537).

***Corydoras tukano* Britto & Lima, 2003**

Localidade-tipo: Rio Tiquié, comunidade de Caruru, praias em poça abaixo de cachoeira, 0°16'28,9"N 69°54'53,6"W (UTM 19N0398191/0030366), Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britto & Lima (2003).

***Corydoras undulatus* Regan, 1912**

Localidade-tipo: La Plata, Argentina.

Distribuição: Bacia do rio da Prata e lagoa dos Patos.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 23092).

***Corydoras vittatus* Nijssen, 1971**

Localidade-tipo: Afluente do rio Itapicuru em Caxias, 04°53'S 43°20'W, Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Itapicuru, Parnaíba e Caeté.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1971), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Corydoras xinguensis* Nijssen, 1972**

Localidade-tipo: Córrego Suia-Miçú, afluente do alto rio Xingú, próximo ao posto Diauarum, 11°15'S 53°00'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Nijssen (1972), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Dianema longibarbis* Cope, 1871**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Solimões e Ambyiacu.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30863).

***Dianema urostriatum* Miranda Ribeiro, 1911**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Miranda Ribeiro (1912).

***Hoplosternum littorale* (Hancock, 1828)**

Localidade-tipo: Demerara, Guiana.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Araguaia, Paraguai, Uruguai, Madeira, São Francisco, Paraná e litorâneas do leste da América do Sul.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 21217).

Referência: Reis (1997).

***Lephoplosternum ucamara* Reis & Kaefer, 2005**

Localidade-tipo: Pequeno riacho tributário da cocha Zapote, tributário do rio Pacaya, 5°20'16"S, 74°29'10"W, Reserva Nacional Pacaya-Samiria, Loreto, Peru.

Distribuição: Várzeas do alto Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Reis & Kaefer (2005).

***Lepthoplosternum altamazonicum* Reis, 1997**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, Pucallpa, Peru.

Distribuição: Rios Ucayali e Solimões.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 29327).

***Lepthoplosternum pectorale* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Chaco, Monte Sociedad, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 20953).

Referência: Reis (1997).

***Lepthoplosternum stellatum* Reis & Kaefer, 2005**

Localidade-tipo: Igarapé Repartimento, tributário do lago Tefé, 1,5 Km a jusante da ponta da estrada Tefé-Agrovila, 3°24'28"S, 64°44'10"W, Município de Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Conhecido apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Lepthoplosternum tordilho* Reis, 1997**

Localidade-tipo: Lagoa marginal próximo a sanga do Junco, na estrada de terra entre a rodovia BR-116 e Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis (1997).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Megalechis personata* (Ranzani, 1841)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Orinoco, Negro, Solimões, Marañon, Branco, Essequibo, Maroni, Coppename,

Corañínie, Araguari, Tocantins, Xingu, Tapajós, Madeira, Jurua, Japurá, e baía de São Marcos,

Paraguai e litorâneas do Nordeste.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Ranzani (1841), Reis (1997).

***Megalechis thoracata* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Mana, Guiana Francesa.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Orinoco, Negro, Solimões, Marañon, Branco, Essequibo, Maroni, Tocantins, Tapajós e Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 28432).

Referência: Reis (1997).

***Scleromystax barbatus* (Quoy & Gaimard, 1824)**

Localidade-tipo: Fazenda da Japubyba, próximo a Angra dos Reis, 22°59'S 41°17'W, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias litorâneas do Sudeste do Paraíba do Sul (Rio de Janeiro) até a bacia do rio Itapocu (Santa Catarina).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Quoy & Gaimard (1824), Nijssen & Isbrücker (1980b).

***Scleromystax macropterus* (Regan, 1913)**

Localidade-tipo: Paranaguá, 25°32'S 48°36'W, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Rios ao redor de Itanhaém (SP), bacia do rio Ribeira de Iguape (rios Cavoçu e Momuna), bacia de Paranaguá, bacia de Guaratuba (PR), bacia de São Francisco (SC) e lagoa Dourada, (rio Tibagi, Paranapanema).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Regan (1913), Nijssen & Isbrücker (1980b), Eigenmann & Allen (1942).

Estado de conservação: Vulnerável (como "*Corydoras macropterus*").

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados (como "*Corydoras macropterus*") no Estado do Paraná.

***Scleromystax prionotos* (Nijssen & Isbrücker, 1980)**

Localidade-tipo: Linhares, lagoa Juparanã, bacia do rio Doce, 19°22'S 40°04'W, Estado do Espírito Santo, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras desde a bacia do ribeirão Trancoso (Bahia) até a bacia do rio Ribeira de Iguape (São Paulo).  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Nijssen & Isbrücker (1980c).

***Scleromystax salmacis* Britto & Reis, 2005**

Localidade-tipo: Arroio Molha Coco em Vila Rosa, cerca de 5,5 Km a noroeste de Praia Grande, 29°10'14"S, 49°58'53"W, Estado de Santa Catarina, Brasil.  
Distribuição: Bacias de dos rios Mampituba e Araranguá no sul de Santa Catarina e bacia do rio Ratonas na ilha de Florianópolis.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Scoloplacidae**

Roberto Esser dos Reis

***Scoloplax dicra* Bailey & Baskin, 1976**

Localidade-tipo: Lagoa isolada do rio Itenez, cerca de 400 a sudoeste do rio, num ponto oposto a Costa Marques (Brasil), Departamento de Beni, Bolívia.  
Distribuição: Bacias Amazônica e do Paraguai, na Bolívia, Brasil e Peru.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Schaefer *et al.* (1989).

***Scoloplax distolothrix* Schaefer, Weitzman & Britski, 1989**

Localidade-tipo: Pequeno tributário do rio Batovi, alto rio Xingu, Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Tocantins, Araguaia, Xingu e Paraguai, no Brasil e Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Schaefer *et al.* (1989).

***Scoloplax dolicholophia* Schaefer, Weitzman & Britski, 1989**

Localidade-tipo: Igarapé tributário do rio Tarumãzinho, aproximadamente 45 km ao norte de Manaus, Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Schaefer *et al.* (1989).

***Scoloplax empousa* Schaefer, Weitzman & Britski, 1989**

Localidade-tipo: Rio Ivinheima, 70 km acima da sua confluência com o rio Paraná e rio dos Bandeirantes, Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacias Amazônica e dos rios Paraná e Paraguai, no Brasil e Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Schaefer *et al.* (1989).

**Família Loricariidae: Neoplecostominae**

Paulo Andreas Buckup

***Neoplecostomus espiritosantensis* Langeani, 1990**

Localidade-tipo: Braço sul do rio Jucu, Vitor Hugo, Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Jucu e Timbuí, no Estado do Espírito Santo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Neoplecostomus franciscoensis* Langeani, 1990**

Localidade-tipo: Riacho afluente do córrego da Mutuca, à direita da estrada Belo Horizonte - Nova Lima, Km 20, Estado de Minas Gerais, Brasil, 43°55'N, 20°06'W.

Distribuição: Riachos de cabeceiras do rio das Velhas e rio Paraopeba (Afluentes do rio São Francisco), na Serra da Moeda.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Neoplecostomus granosus* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Caiena e Rio de Janeiro.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani (1990).

Observações: O material é conhecido apenas da série tipo, e Langeani (1990) acredita que citação das localidades tipo seja incorreta.

***Neoplecostomus microps* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul e rios costeiros adjacentes, entre a baixada de Jacarepaguá e o rio Itabapoana.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Langeani (1990), Bizerril (1995).

***Neoplecostomus paranensis* Langeani, 1990**

Localidade-tipo: Rio Cubatão, Fazenda Santa Carlota, Cajuru, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Riachos de cabeceira da bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

***Neoplecostomus ribeirensis* Langeani, 1990**

Localidade-tipo: Riacho afluente do rio Bananal, km 7 da rodovia Biguá-Iguape (SP-222), Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Riachos afluentes do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

***Neoplecostomus variipictus* Bizerril, C.R.S.F., 1995**

Localidade-tipo: Rio Santo Antônio, tributário do rio Bengala, bacia do rio Paraíba do Sul, Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio Santo Antonio, tributário do rio Bengala (bacia do Paraíba do Sul).

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

**Família Loricariidae: Hypoptopomatinae**

Roberto Esser dos Reis

***Acestridium discus* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Igarapé da Cachoeira Grande, perto de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Baixo Negro, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Acestridium martini* Retzer, Nico & Provenzano, 1999**

Localidade-tipo: Igarapé Pozo Azul, tributário do Orinoco próximo ao balneário Pozo Azul, Estado Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Orinoco e Negro.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 61945).

***Corumbataia cuestae* Britski, 1997**

Localidade-tipo: Cachoeira de Analândia, rio Corumbataí, Analândia, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Corumbataia tocantinensis* Britski, 1997**

Localidade-tipo: Rio Vermelho, Goiás, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias do Araguaia e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Epactionotus bilineatus* Reis & Schaefer, 1998**

Localidade-tipo: Boca do arroio do Ouro no rio Maquiné, entre Barra do Ouro e Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do Maquiné e Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Schaefer (1998).

***Epactionotus gracilis* Reis & Schaefer, 1998**

Localidade-tipo: Rio Jordão em Jordão Alto, Nova Veneza, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araranguá, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Schaefer (1998).

***Epactionotus itaimbezinho* Reis & Schaefer, 1998**

Localidade-tipo: Rio Canoas, tributário do Mampituba, cerca de 8 km de Praia Grande em direção a Mãe dos Homens, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Mampituba, Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Schaefer (1998).

***Eurycheilichthys limulus* Reis & Schaefer, 1998**

Localidade-tipo: Rio Jacuí na estrada RS-010, entre Marau e Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Eurycheilichthys pantherinus* Reis & Schaefer, 1992**

Localidade-tipo: Riacho tributário do rio dos Touros, na estrada de Silveira para Rondinha, Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto e médio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Eurycheilichthys* sp. 1**

Distribuição: Bacia do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 25678).

***Eurycheilichthys sp. 2***

Distribuição: Bacia do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Lote de referência (MCP 25568).

***Eurycheilichthys sp. 3***

Distribuição: Bacia do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Lote de referência (MCP 22261).

***Eurycheilichthys sp. 4***

Distribuição: Bacia do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Lote de referência (MCP 22134).

***Eurycheilichthys sp. 5***

Distribuição: Bacia do Taquari, Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Lote de referência (MCP 22800).

***Hisonotus depressicauda* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Sorocaba, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tietê.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus depressinotus* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tietê.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus francirochai* (R. Ihering, 1928)**

Localidade-tipo: Riachos em Pirangi, cabeceiras do Turvo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Grande.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus insperatus* Britski & Garavello, 2003**

Localidade-tipo: Rio Capivara, bacia do Tietê, Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tietê.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus laevior* Cope, 1894**

Localidade-tipo: Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Jacuí.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus leptochilus* Cope, 1894**

Localidade-tipo: Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Jacuí.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus leucofrenatus* (Miranda Ribeiro, 1908)**

Localidade-tipo: Rio das Pedras [bacia do Ribeira de Iguape, Brasil].  
Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus nigricauda* (Boulenger, 1891)**

Localidade-tipo: Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Jacuí.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus notatus* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Bacias do sudeste do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus paulinus* (Regan, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tietê.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hisonotus taimensis* (Buckup, 1981)**

Localidade-tipo: Novo canal do arroio Taim, Estação Ecológica do Taim, Estado do Rio Grande do Sul,  
Distribuição: Bacias costeiras do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypoptopoma inexpectatum* Boulenger, 1895**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Província de Formosa, Argentina.  
Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.  
Documentação primária: Lote de referência (BMNH 1895.5.17.77-82, síntipos de *H. guentheri*).

***Hypoptopoma joberti* (Vaillant, 1880)**

Localidade-tipo: Calderon, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Schaefer (2003).

***Hypoptopoma steindachneri* Boulenger, 1895**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, próximo à foz do Negro, Brasil.  
Distribuição: Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypoptopoma thoracatum* Günther, 1868**

Localidade-tipo: Xeberos, alto Amazonas, Peru.  
Distribuição: Parte superior da Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Schaefer (2003).

***Microlepidogaster bourguyi* (Miranda Ribeiro, 1911)**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: ?  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Observações: A identidade desta espécie necessita avaliação. Ela é considerada como *Species Inquirenda* por Schaefer (2003).

***Microlepidogaster perforatus* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Rio Carandaí, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Carandaí, alto Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.



***Microlepidogaster sp. 1***

Distribuição: Bacia do Grande em Goiás.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 23323).

***Nannoptopoma sternoptychum* Schaefer, 1996**

Localidade-tipo: Quebrada Mariposa, Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios, Peru.

Distribuição: Bacia do Madeira e baixo Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Schaefer (1996).

***Otocinclus affinis* Steindachner, 1877**

Localidade-tipo: Rios em Santa Cruz, nos arredores do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus bororo* Schaefer, 1997**

Localidade-tipo: Riacho na estrada ente Barra do Bugres e Cáceres, 51 km ao sul de Barra do Bugres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus caxarari* Schaefer, 1997**

Localidade-tipo: Região entre Guajará Mirim e Mato Grosso, bacia do Guaporé, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus cocama* Reis, 2004**

Localidade-tipo: Quebrada Yanayacu, aprox. 4°55'S 73°43'W, tributário do caño cocha Supay, Jenaro Herreara, Provincia Requena, Departamento Loreto, Peru.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Otocinclus flexilis* Cope, 1894**

Localidade-tipo: Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Médio e baixo Paraná/Paraguai, Uruguai e bacias costeiras do sul do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus gibbosus* (Miranda Ribeiro, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Betari, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: A identidade desta espécie necessita avaliação. Ela foi descrita como *Otocinclus* mas não pertence a este gênero.

***Otocinclus hasemani* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Engenhão de Água, bacia do Parnaíba, Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacias do Parnaíba e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus hoppei* Miranda Ribeiro, 1939**

Localidade-tipo: Belém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus mariae* Fowler, 1940**

Localidade-tipo: Boca Chapare, rio Chimore, tributário do Ichilo, Cochabamba, sistema do Mamoré, Bolívia.

Distribuição: Bacias do alto Madeira e baixo Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus mimulus* Axenrot & Kullander, 2003**

Localidade-tipo: Riacho na Estância Maria Belém, a 8 km de Coronel Patrício Colman, Departamento Caaguazú, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Prata.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 26814).

***Otocinclus mura* Schaefer, 1997**

Localidade-tipo: Rio Sanabani, bacia do lago Canaçari, Silves, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Médio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus tapirape* Britto & Moreira, 2002**

Localidade-tipo: Córrego Água Parada, tributário do Pintado, 11 km a oeste de Novo Planalto, sistema do Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Otocinclus vittatus* Regan, 1904**

Localidade-tipo: Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica e dos rios Orinoco, Paraná, Paraguai, Xingu e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus xakriaba* Schaefer, 1997**

Localidade-tipo: Rio Pau de Colher, na estrada entre Guanambi e Mutas, bacia do São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schaefer (1997).

***Otocinclus* sp. 1**

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 35594).

***Otothyris juquiae* Garavello et alli, 1998**

Localidade-tipo: Riacho Juquiá na fazenda Cantagalo, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Garavello *et al.* (1998).

***Otothyris lophophanes* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Santa Cruz, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Garavello *et al.* (1998).

***Otothyris rostrata* Garavello et alli, 1998**

Localidade-tipo: Canal entre a lagoa Emboaba e lagoa Emboabinha, na estrada entre Osório e Tramandaí, Osório, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Garavello *et al.* (1998).

***Otothyris travassosi* Garavello et alli, 1998**

Localidade-tipo: Rio Barra Seca na estrada de Linhares para São Mateus, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Garavello *et al.* (1998).

***Otothyropsis marapoama* Ribeiro, Carvalho, Melo, 2005**

Localidade-tipo: Ribeirão Cubatão, bacia do Tietê, estrada entre Marapoama e Elisiário, 21°11'35"S 49°07'22"W, Município de Marapoama, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Drenagem do Cubatão, na bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Oxyropsis acutirostra* Miranda Ribeiro, 1951**

Localidade-tipo: Paricachoeira, Rio Tiquié, afluente do Vaupes, afluente do Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Negro e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Oxyropsis carinata* (Steindachner, 1879)**

Localidade-tipo: Afluente da bacia do Amazonas no Peru.

Distribuição: Bacias do alto e médio Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Schaefer (2003).

***Oxyropsis wrightiana* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Lago Janauari, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: alto e médio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus amazonensis* Garavello, 1977**

Localidade-tipo: Ilha Sorubim, Solimões, Estados do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus aripuanensis* Garavello, 1988**

Localidade-tipo: Ingazeiro, 20 km acima da foz do Canumã, Aripuanã, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Aripuanã.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus bahiensis* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Vila Nova, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus bidentatus* Gauger & Buckup, 2005**

Localidade-tipo: Rio Pirapetinga, tributário da margem esquerda do Paraíba do Sul, Município de Resende, 22°28'08" 44°26'48"W, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus britskii* Boeseman, 1974**

Localidade-tipo: Tributário do lado esquerdo do Coppename, Suriname.

Distribuição: Bacia do Orinoco, e bacias costeiras das Guianas e do Xingu.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Schaefer & Provenzano (1993).

***Parotocinclus cearensis* Garavello, 1977**

Localidade-tipo: Cachoeira do Gusmão, Ipu, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Estado do Ceará.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus cesarpintoi* Miranda Ribeiro, 1939**

Localidade-tipo: Quebrângulo, Estado de Alagoas, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Estado de Alagoas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus cristatus* Garavello, 1977**

Localidade-tipo: Fazenda Almada, Ilhéus, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros próximo a Ilhéus, Estado da Bahia, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus doceanus* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Rio Doce, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Doce.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus haraldi* Garavello, 1988**

Localidade-tipo: Córrego Otaviano, poço do Sanharó, riacho Sanharó, Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Estado do Piauí.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus jimi* Garavello, 1977**

Localidade-tipo: Rio do Peixe, tributário do Contas, fazenda Pedra Branca, Itagibá, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Contas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus jumbo* Britski & Garavello, 2002**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Norte, na estrada PB-408, NW de Umbuzeiro, Estado da Paraíba, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus longirostris* Garavello, 1988**

Localidade-tipo: Rio Preto da Eva, no km 80 da estrada de Manaus para Itacoatiara, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus maculicauda* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Santa Cruz, rio Quenda e vizinhanças do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros entre os Estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus minutus* Garavello, 1977**

Localidade-tipo: Rio Vasa-Barris, Canudos, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Vasa-Barris.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus muriaensis* Gauger & Backup, 2005**

Localidade-tipo: rio Muriaé, tributário da margem esquerda do Paraíba do Sul, próximo à intersecção da BR 356 e BR 186, 20

Km a jusante de Itaperuna, aprox. 21°15'S 41°45"W, Município de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus planicauda* Garavello & Britski, 2003**

Localidade-tipo: Rio Suaçuí Pequeno na fazenda Antônio Pereira de Oliveira, a 20 km de Coroaci, Barra do Rochedo,

Coroaci, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do Doce.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus prata Ribeiro, Melo & Pereira, 2002***

Localidade-tipo: Riacho tributário do Ribeirão Quiricó na fazenda São Zeferino, próximo à Galena, cabeceiras do rio da Prata,

bacia do São Francisco, Presidente Olegário, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus spilosoma* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Campina Grande, Estado da Paraíba, Brasil.

Distribuição: Estado da Paraíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus spilurus* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Rio Salgado, Icó, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Estado do Ceará.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parotocinclus sp. 1***

Distribuição: Rio São Francisco.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 16638).

***Parotocinclus sp. 2***

Distribuição: Sistema laguna dos Patos.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 20273).

***Pseudotocinclus juquiae* Takako, Oliveira, Oyakawa, 2005**

Localidade-tipo: Primeiro tributário do rio Juquiá, próximo a ribeirão das Antas, na estrada de São Lourenço da Serra a Juquitiba, 23°59'49,1"S 46°56'01,0W, Município de Juquitiba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Juquiá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudotocinclus parahybae* Takako, Oliveira, Oyakawa, 2005**

Localidade-tipo: Tributário do ribeirão Grande, Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, 22°46'S 45°27'W, bacia do Paraíba do Sul, Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudotocinclus tietensis* (R. Ihering, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

***Pseudotothyris janeirensis* Britski & Garavello, 1984**

Localidade-tipo: Rio dos Macacos, represa Engenho da Serra, Paulo de Frontin, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudotothyris obtusa* (Miranda Ribeiro, 1911)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Rios do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Schizolecis guntheri* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Praia do Piraique na ilha de São Sebastião, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***zGen. 1 sp. 1***

Distribuição: Alto Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32692).

***zGen. 1 sp. 2***

Distribuição: Alto Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32672).

***zGen. 1 sp. 3***

Distribuição: Alto Xingu e alto Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32649).

***zGen. 1 sp. 4***

Distribuição: Alto Xingu e alto Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32662).

***zGen. 1 sp. 5***

Distribuição: Alto Xingu e alto Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32668).

**zGen. 1 sp. 6**

Distribuição: Alto Xingu e alto Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32678).

**zGen. 1 sp. 7**

Distribuição: Alto Tapajós.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 32676).

**Família Loricariidae: Loricariinae**

Miriam Sant'Anna Ghazzi &

Osvaldo Takeshi Oyakawa

***Brochiloricaria macrodon* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Sistema do rio Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Farlowella amazona* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Santarém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Xingu, Tapajós, Trombetas, Branco, Gurupi, Negro (na boca), baixo Tocantins e Paraná-Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Farlowella henriquei* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: Rio Vermelho, afluente do rio Araguaia, Santa Rita das Antas, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Farlowella isbruckeri* Retzer & Page, 1997**

Localidade-tipo: Riacho na rodovia Cuiabá - Porto Velho, ca. 32 km de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Farlowella jauruensis* Eigenmann & Vance, 1917**

Localidade-tipo: Jaura [= rio Jauru], Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Farlowella nattereri* Steindachner, 1910**

Localidade-tipo: Rio Negro [do médio Amazonas, sem localidade precisa, provavelmente do rio Negro], Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica (rios Beni, Mamoré, Matapi, Solimões, Purus, Caquetá, Napo, Bobonaza, Aguarico, Huallaga, Manu) e do Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Farlowella oxyrryncha* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Cachoeira da Bananeira, rio Mamoré, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e dos rios Gurupi e Cauru (bacia do Orinoco).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Farlowella paraguayensis* Retzer & Page, 1997**

Localidade-tipo: Arroyo Carimbatay, Departamento de Cabendiyu, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

***Farlowella platorynchus* Retzer & Page, 1997**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, Departamento de Ucayali, Pucallpa, Yarinachocha, Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Solimões, Arari, Yarapec, Ucayali).

Documentação primária: Bibliográfica.

***Farlowella schreitmuelleri* Ahl, 1937**

Localidade-tipo: Santarém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas, baixo Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Farlowella smithi* Fowler, 1913**

Localidade-tipo: Rio Madeira, aproximadamente 200 milhas leste (62°20'W), Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Médio rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Retzer & Page (1997).

***Furcodontichthys novaesi* Rapp Py-Daniel, 1981**

Localidade-tipo: Rio Solimões, lago Tefé, Caititu, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Solimões, Juruá, Negro, Trombetas e Tapajós).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia carvalhoi* Miranda Ribeiro, 1939**

Localidade-tipo: Rio Paquequer, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio Paquequer, rio Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia depressa* Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001**

Localidade-tipo: Rio Pitinga, bacia do rio Uatumã, abaixo da represa Paranapanema Enterprise, Cachoeira 40 Ilhas, Estado do Amazonas, Brasil, 0°53'20"S 59°34'24"W.

Distribuição: Bacia do rio Uatumã.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia dissidens* Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Pimental, 4°35'22"S 56°15'16"W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia duriventris* Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Igarapé Bacuri, 4°29'44"S 49°30'32"W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins, acima da represa de Tucuruí.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Harttia garavelloi* Oyakawa, 1993**

Localidade-tipo: Rio Fanado, ponte da cidade de Minas Novas, 17°15'S 42°35'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Fanado, bacia do Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia gracilis* Oyakawa, 1993**

Localidade-tipo: Riacho afluente do rio São João, Município de Fortaleza de Minas, próximo da estrada de ferro Minas-Perobas, 20°58'S 46°47'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia kronei* Miranda Ribeiro, 1908**

Localidade-tipo: Rio Bethary [Betari], Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia leiopleura* Oyakawa, 1993**

Localidade-tipo: Riacho afluente do córrego Mutuca, à direita da estrada Belo Horizonte - Nova Lima, km 20, 20°60'S 43°55'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia longipinna* Langeani, Oyakawa & Montoya-Burgos, 2001**

Localidade-tipo: Rio Pará, sob a ponte na BR-262, entre Nova Serrana e Pará de Minas, aprox. 19°53'S 44°52'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco, nos Estados de Minas Gerais e Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia loricariformis* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul e rios costeiros dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia novalimensis* Oyakawa, 1993**

Localidade-tipo: Riacho afluente do córrego Mutuca, à direita da estrada Belo Horizonte - Nova Lima, km 20, 20°60'S 43°55'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia punctata* Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, nos rochedos logo abaixo da represa de Tucuruí, 3°49'43"S 49°38'10"W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio e alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia rhombocephala* Miranda Ribeiro, 1939**

Localidade-tipo: Rio Farias (afluente do rio Jacaré, sistema da Baía de Guanabara), Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

***Harttia torrenticola* Oyakawa, 1993**

Localidade-tipo: Riacho afluente do rio Paraopeba, Água Limpa, Município de Moeda, 3 km da BR-040, acima das cachoeiras, 20°20'S 44°02'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia trombetensis* Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, cachoeira Vira-Mundo, 1°02'04"S 57°3'38"W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trombetas-Mapuera, acima da cachoeira Porteira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Harttia uatumensis* Rapp Py-Daniel & Oliveira, 2001**

Localidade-tipo: Rio Uatumã, em Santa Luzia, 1°50'13"S 59°28'36"W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Uatumã e nos afluentes Pitinga e Jatapu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiodontichthys acipenserinus* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Guaporé, Madeira, Juruá, Solimões, Negro, Branco, Arari, Tocantins, Tapajós, Ampiyacu), rio Paraguai e rio Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1974).

***Lamontichthys filamentosus* (La Monte, 1935)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rios Juruá, Purus, Amazonas e Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Paixão (2004).

***Limatulichthys griseus* (Eigenmann, 1909)**

Localidade-tipo: Conawaruk (=Konawaruk) Guiana.

Distribuição: Alto e médio rio Amazonas, rios Solimões, Branco, Tocantins, Xingu, Ucayali, Essequibo, Meta, Orinoco e Parnaíba.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1976).

Observações: Originalmente descrita como *Loricaria punctata* Regan, do rio Negro, Manaus.

***Loricaria cataphracta* Linnaeus, 1758**

Localidade-tipo: America Meridionali.

Distribuição: Ilha de Marajó, rio Amazonas, rio Marowijne (Suriname), rio Oyapock (Guiana Francesa) e rios Rupununi e Essequibo (Guiana).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Isbrücker (1981), Le Bail *et al.* (2000).

***Loricaria clavipinna* Fowler, 1940**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, Contamana, bacia Amazônica, 7°19'S 75°04'W, Província de Loreto, Peru.

Distribuição: Rio Ucayali, rios Tapajós e Amazonas, Estado do Pará.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker (1981).

***Loricaria lata* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Alto rio Vermelho, sistema do rio Araguaia, 15°57'S 50°7'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1973b).

***Loricaria lentiginosa* Isbrücker, 1979**

Localidade-tipo: Represa de Volta Grande, Rio Grande, bacia do alto Paraná, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Loricaria parnahybae* Steindachner, 1907**

Localidade-tipo: Rio Parnaíba, foz de um rio na cidade de Vitória (atualmente Alto Parnaíba, Estado do Maranhão, Brasil, 9°8'S 45°56'W).

Distribuição: Rio Parnaíba e rio Oyapock (Guiana Francesa).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1981).

***Loricaria piracicabae* Ihering, 1907**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil, 22°45'S 47°40'W.

Distribuição: Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1981).

***Loricaria proluxa* Isbrücker & Nijssen, 1978**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, estendendo-se ao rio Tietê, bacia do rio Paraná, Piracicaba, 22°45'S 47°40'W, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Loricaria simillima* Regan, 1904**

Localidade-tipo: Rio Bobobonaza em Canelos, drenagem do alto rio Pastaza, sistema do rio Amazonas, Província de Pastaza, Peru.

Distribuição: Bacias Amazônica Paraguai, Branco, Ucayali e Guarapiche (Venezuela).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker (1981).

***Loricariichthys anus* (Valenciennes, 1836)**

Localidade-tipo: Rio da Prata, Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Baixo rio Paraná, rio da Prata, rio Uruguai, Laguna dos Patos e rios costeiros do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Reis & Pereira (2000).

***Loricariichthys castaneus* (Casteulnau, 1855)**

Localidade-tipo: Nas proximidades do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do sudeste do Brasil entre os Estados de São Paulo e Espírito Santo (rios Ribeira de Iguape, Paraíba do Sul, Doce e São Mateus).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Pereira (2000).

***Loricariichthys labialis* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Paraguai.

Distribuição: Rio Paraguai e médio Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Reis & Pereira (2000).

***Loricariichthys melanocheilus* Reis & Pereira, 2000**

Localidade-tipo: Boca do rio Ijuí-Mirim, tributário do rio Ijuí, 28°03'S 55°11'W, Pirapó, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Baixo rio Paraná e baixo e médio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Loricariichthys platymetopon* Isbrücker & Nijssen, 1979**

Localidade-tipo: Lago Ypacarai, San Bernardino, bacia do rio Paraguai, Paraguai.

Distribuição: Rio Paraguai, baixo Paraná, baixo e médio Uruguai e Guaporé (Madeira).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Reis & Pereira (2000).

***Loricariichthys rostratus* Reis & Pereira, 2000**

Localidade-tipo: Rio São Francisco Falso, 24°54'S 54°12'W, entre Diamante do Oeste e Santa Helena, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná, acima da boca do rio Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Planiloricaria cryptodon* (Isbrücker, 1971)**

Localidade-tipo: Rio Ucayali próximo de Pucallpa, Peru.

Distribuição: Rios Purus, Solimões, Amazonas, Mamoré e Ucayali.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1986).

***Pseudohemiodon amazonus* (Delsman, 1941)**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, próximo de Óbidos, Estado do Pará, Brasil

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudohemiodon platycephalus* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Cuiabá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudoloricaria laeviscula* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacias Amazônica (Tapajós, Xingú, Trombetas, Amazonas, Branco, Madeira, Negro) e do rio Capim (baixo Tocantins).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1976).

***Pterosturisoma microps* (Eigenmann & Allen, 1942)**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.

Distribuição: Rio Solimões, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Lote de Referência (MZUSP 54717).

***Pyxiloricaria menezesi* Isbrücker & Nijssen, 1984**

Localidade-tipo: Lagoas marginais da rodovia Transpantaneira, 20°10'S 56°19'W, Município de Miranda, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Reganella depressa* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Alto rio Negro, Marabitanos, 0°57'S 66°55'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica (rios Negro, Solimões, Branco, Xingu, Trombetas e Tapajós).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1974).

***Rineloricaria aequalicuspis* Reis & Cardoso, 2001**

Localidade-tipo: Rio Três Forquilhas, em frente a igreja da vila Itati, 29°30'43"S 50°05'31"W, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Maquiné, rio Três Forquilhas (nordeste do Estado do Rio Grande do Sul), rios Mambituba e Araranguá (sul de Estado de Santa Catarina).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria cacerensis* (Miranda Ribeiro, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Cáceres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria cadeae* (Hensel, 1868)**

Localidade-tipo: Rio Cadeia, afluente do Rio Caí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema do rio Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis (1983).

***Rineloricaria castroi* Isbrücker & Nijssen, 1984**

Localidade-tipo: Trapiche da Reserva Biológica de Trombetas, rio Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria cubataonis* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Cubatão, Teresópolis [rio Cubatão Sul, próximo de Águas Mornas], Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Distribuição incerta, provavelmente nos rios costeiros de Santa Catarina, acima de Florianópolis até o sistema do rio Itapocu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria fallax* (Steindachner, 1915)**

Localidade-tipo: Igarapé de Carauná, próximo de Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Rio Branco, Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1979).

***Rineloricaria formosa* Isbrücker & Nijssen, 1979**

Localidade-tipo: Lago no rio Inírida, 1 km acima de Porto Inírida, Bacia do Rio Orinoco, Colômbia.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Bibliográfica.

***Rineloricaria hasemani* Isbrücker & Nijssen, 1979**

Localidade-tipo: Maguari, perto de Belém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria henselli* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Cubatão, Teresópolis [rio Cubatão Sul, próximo de Águas Mornas], Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Distribuição incerta, provavelmente nos rios costeiros de Santa Catarina, acima de Florianópolis até o sistema do rio Itapocu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria heteroptera* Isbrücker & Nijssen, 1976**

Localidade-tipo: Riacho na Reserva Ducke, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Preto da Eva, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria hoehnei* (Miranda Ribeiro, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Coxim, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria jaraguensis* (Steindachner, 1909)**

Localidade-tipo: Jaraguá [rio Itapocu em Jaraguá do Sul], Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Da bacia do rio Itapocu aos rios costeiros ao norte de Florianópolis.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria konopickyi* (Steindachner, 1879)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria kronei* Miranda Ribeiro, 1911**

Localidade-tipo: Rio Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria lanceolata* (Günther, 1868)**

Localidade-tipo: Xeberos (= Jeberos), Peru.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Isbrücker (1973a).

***Rineloricaria latirostris* (Boulenger, 1900)**

Localidade-tipo: Rio Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Langeani & Araújo (1994) .

***Rineloricaria lima* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Rio Paraíba do Sul e rios costeiros da baixada fluminense.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria longicauda* Reis, 1983**

Localidade-tipo: Estação Ecológica do Taim, Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: banhado do Taim (Estado do Rio Grande do Sul).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria maquinensis* Reis & Cardoso, 2001**

Localidade-tipo: Arroio Água Parada, afluente do rio Maquiné, 29°40'S 50°12'W, Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema do rio Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul e sistema do rio Araranguá, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria melini* (Schindler, 1959)**

Localidade-tipo: Rio Solimões, próximo de Manacapuru, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker & Nijssen (1979).

***Rineloricaria microlepidogaster* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Lagoa dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema da Lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba (1989).

Observações: Restrito a Lagoa dos Patos (Malabarba, 1989).

***Rineloricaria microlepidota* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria nigricauda* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio Paraíba do Sul (médio) e baías de Guanabara e Sepetiba, Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria parva* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Descalvados, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria pentamaculata* Langeani & Araujo, 1994**

Localidade-tipo: Rio Turvo, Ourinhos, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

***Rineloricaria phoxocephala* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Coari, rio Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria quadrensis* Reis, 1983**

Localidade-tipo: Lagoa dos Quadros, Osório, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Sistemas da lagoa dos Quadros e rio Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rineloricaria steindachneri* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Rio Preto, afl. Rio Paraíba, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Baixo Paraíba do Sul (rios Preto, Pomba, Muriaé, Grande e Dois Rios).  
Documentação primária: Localidade tipo.


***Rineloricaria strigilata* (Hensel, 1868)**

Localidade-tipo: Rio Santa Cruz, afl. do Rio Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Sistema do rio Jacuí, lago Gualba e rio Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis (1983).

***Rineloricaria teffeana* (Steindachner, 1879)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas (= Solimões), Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Spatuloricaria evansii* (Boulenger, 1892)**

Localidade-tipo: Brasil, Jangada, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Rio  Paraguai e Beni.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Spatuloricaria nudiventris* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.  
Distribuição: Desconhecida.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Observações: Localidade-tipo provavelmente incorreta, pois não há registro do gênero na bacia do São Francisco.

***Sturisoma barbatum* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraguai e baixo Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Ghazzi (2003).  
Observações: Sinônimo sênior de *S. robustum* em Ghazzi (2003).

***Sturisoma brevirostre* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rio Içá, afluente do Rio Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Sturisoma lyra* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Juruá.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Ghazzi (2003).



***Sturisoma rostratum* (Agassiz in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.

Distribuição: Rio Tocantins, rio Tapajós, rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ghazzi (2003).

**Família Loricariidae: Hypostominae**

Murilo de Carvalho &

Flávio Alicino Bockmann

***Aphanotorulus phrixosoma* (Fowler, 1940)**

Localidade-tipo: Contamana, bacia do rio Ucayali, Peru.

Distribuição: Bacia do alto Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Fowler (1954), Isbrücker *et al.* (2001).

***Aphanotorulus unicolor* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Purus, entre Cachoeira (7°42'S 65°59'W) e Porto Alegre (8°57'S 67°52'W), Brasil.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Armbruster (1998a), Armbruster & Page (1996).

***Glyptoperichthys gibbiceps* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Rio Negro perto de Marabitanos, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Médio e alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glyptoperichthys joselimaianus* Weber, 1991**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, bacia do Tocantins, bacia Amazônica, Aruanã, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas, bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glyptoperichthys lituratus* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé perto do Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Médio Amazonas, bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glyptoperichthys parnaíbae* Weber, 1991**

Localidade-tipo: Lago de Parnaguá, rio Paraim, bacia do rio Parnaíba, Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Drenagens do nordeste do Brasil, bacia do Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glyptoperichthys punctatus* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Bacia Amazônica, São Vicente, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Médio e alto Amazonas, bacias dos rios Madeira, Purus e Juruá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glyptoperichthys xinguensis* Weber, 1991**

Localidade-tipo: Rio Fresco, afluente do Xingu, Bacia Amazônica, Aldeia Gorotire, Município de São Felix do Xingu, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas, bacia do Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus affinis* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Campos, 21°50'S 41°20'W, rio Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mazzoni *et al.* (1994).

Observações: Designação de lectótipos por Mazzoni *et al.* (1994).

***Hypostomus agna* (Miranda Ribeiro, 1907)**

Localidade-tipo: Rio da Ribeira, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus alatus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Rio Sabará, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco, drenagem do rio das Velhas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus albopunctatus* (Regan, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Weber (1987), Weber *et al.* (1992).

***Hypostomus ancistroides* (Ihering, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Tatuf, afluente do lado esquerdo do rio Sorocaba, rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná, bacia do rio Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Castro & Casatti (1997), Casatti *et al.* (2001).

***Hypostomus angipinnatus* (Leege, 1922)**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus asperatus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus aspilogaster* (Cope, 1894)**

Localidade-tipo: Rio Jacuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai e bacia da lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus atropinnis* (Eigenmann & Eigenmann, 1890)**

Localidade-tipo: Alto curso do rio Vermelho, 15°57'S, 50°07'W, drenagem do rio Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins, bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1973b).

***Hypostomus auroguttatus* Kner (ex Natterer & Heckel), 1854**

Localidade-tipo: Rio Paraíba, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Steindachner (1881b).

***Hypostomus boulengeri* (Eigenmann & Kennedy, 1903)**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso, Brasil ou Asunción, Paraguai.  
Distribuição: Bacia do Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Weber (1986).

***Hypostomus breviceauda* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus brevis* (Nichols, 1919)**

Localidade-tipo: Poço Grande, rio Juquiá [bacia do Ribeira de Iguape], Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Observações: Conhecido somente o holótipo.

***Hypostomus carinatus* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em Jatuarana (provavelmente em Parintins, próximo a Barreirinha), lago Iranduba e lago de Saracá, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Rapp Py-Daniel (1988).

***Hypostomus carvalhoi* (Miranda Ribeiro, 1937)**

Localidade-tipo: Rio Granjeiro, Crato, Estado do Ceará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Jaguaribe.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus cochliodon* Kner, 1854**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraguai e médio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus commersoni* Valenciennes, 1836**

Localidade-tipo: Rio da Prata, Montevideo, Uruguai.  
Distribuição: Bacia do médio e baixo rio Paraná, bacia do Uruguai, bacia da lagoa dos Patos.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Weber (1986), Reis *et al.* (1990).

***Hypostomus derbyi* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: Porto União da Victoria (bacia do Iguaçu), Brasil.  
Distribuição: Bacia do Iguaçu e arroio Urugaí.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus eptingi* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do norte do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (2001).

***Hypostomus ericae* Hollanda Carvalho & Weber, 2004**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Porto Alfredinho, 14°02'22,1"S 48°31'28,6"W, bacia do Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Alto Tocantins, Estado de Goiás, Brasil, na região de influência da barragem de Serra da Mesa.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus fluviatilis* (Schubart, 1964)**

Localidade-tipo: Córrego da Lazica, perto de Ouro Fino (Estado de Minas Gerais); cachoeira do Espraiado, no alto Mogi Guaçu, 5 Km jusante de Inconfidentes, acima de Soledade, Ouro Fino, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Grande.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus francisci* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Alto São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus garmani* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, leste do Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Casatti & Castro (1998).

***Hypostomus goyazensis* (Regan, 1908)**

Localidade-tipo: Bacia do Araguaia, alto rio Vermelho, 15°57'S, 50°07'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins, drenagem do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1973b).

***Hypostomus hemicochliodon* Armbruster, 2003**

Localidade-tipo: Rio Nanay em Pampa Chica, 4,54 Km do centro de Iquitos, 03°45'07"S 73°16'59"W, drenagem do Amazonas, Peru.

Distribuição: Bacias do alto Solimões, Tapajós, Xingu e alto rio Negro.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Armbruster (2003).

***Hypostomus hermanni* (Ihering, 1905)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus hoplonites* Rapp Py-Daniel, 1988**

Localidade-tipo: Rio Solimões, complexo de lagos do Janauacá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus iheringii* (Regan, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus interruptus* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Rio Juquiá, Poço Grande, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus isbrueckeri* Reis, Weber & Malabarba, 1990**

Localidade-tipo: Rio Conceição, Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Alto e médio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Hypostomus jaguribensis* (Fowler, 1915)**

Localidade-tipo: Rio Jaguaribe, Barro Alto, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jaguaribe.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus johnii* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Puti e rio Preto, Brasil.

Distribuição: Bacia do Parnaíba e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus latirostris* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Rio Jangada, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Hypostomus lexi* (Ihering, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Pardo, perto de Barretos, quase na foz do rio que é afluente do rio Grande, por sua vez tributário do lado esquerdo do rio Paraná, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Grande.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus lima* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, ribeirão do Mato e lagoa Santa, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lütken (1875b).

***Hypostomus longiradiatus* (Holly, 1929)**

Localidade-tipo: Rio Guanã, presumivelmente tributário do rio Madeira, por sua vez tributário do rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guamã.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Localidade tipo duvidosa: pode ser rio Guamã, próximo de Belém, Estado do Pará (Weber, 2003).

***Hypostomus luteomaculatus* (Devincenzi, 1942)**

Localidade-tipo: Rio Uruguai em Paysandú, Uruguai.

Distribuição: Bacia do Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Fowler (1954), Isbrücker (2001), Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Hypostomus luteus* (Godoy, 1980)**

Localidade-tipo: Rio Pelotas em Volta Grande 2, Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Alto Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Reis *et al.* (1990), Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Hypostomus macrops* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco, drenagem do rio das Velhas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus macushi* Armbruster & Souza, 2005**

Localidade-tipo: Rio Takutu, drenagem do rio Negro, 4,01957°S 59,60170°W, Rupununi, Guiana.

Distribuição: Bacia do Irenge e Takutu, na fronteira com a Guiana.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Armbruster & Souza (2005).

Observações: Espécie registrada nos rios Irenge e Takutu, na fronteira Brasil-Guiana.

***Hypostomus margaritifer* (Regan, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto e médio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Sinônimo de *P. margaritifer butantanis* Ihering (1911) Weber (2003).

***Hypostomus meleagris* (Marini, Nichols & La Monte, 1933)**

Localidade-tipo: Sudeste do Brasil (restrita entre a alta e média drenagem do rio Paraná).

Distribuição: Alto e médio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mazzoni *et al.* (1994).

***Hypostomus mutuae* Knaack, 1999**

Localidade-tipo: Rio Mutuca, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Cuiabá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus myersi* (Gosline, 1947)**

Localidade-tipo: Rio Iguaçu em Porto União, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná, drenagem do rio Iguaçu e arroio Uruga-i.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Agostinho & Gomes (1997).

***Hypostomus niger* (Marini, Nichols & La Monte, 1933)**

Localidade-tipo: Sudeste do Brasil.

Distribuição: Rios do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus nigromaculatus* (Schubart, 1964)**

Localidade-tipo: Cachoeira de Emas, do rio Mogi Guaçu, na região da corredeira (topava), Município de Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto e médio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Casatti *et al.* (2001), Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Hypostomus nudiventris* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Rio Choró, próximo à Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus obtusirostris* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Cubatão, Teresópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus pantherinus* Kner, 1854**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, alto Rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Conhecido somente o holótipo (jovem).

***Hypostomus papariae* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Lago Papari, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Grande do Norte.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1980).

***Hypostomus paucipunctatus* Hollanda Carvalho & Weber, 2004**

Localidade-tipo: Igarapé Pojuca, Serra dos Carajás, rio Itacaiúnas, 5°52'S, 50°32'W, Município de Caldeirão, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Itacaiúnas, Serra dos Carajás, Estado do Pará, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus paulinus* (Ihering, 1905)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weber *et al.* (1992).

***Hypostomus piratatu* Weber, 1986**

Localidade-tipo: Braço intermitente do rio Tebicuary, bacia do Paraguai, drenagem do Paraná, Sapucaí, Paraguai.

Distribuição: Tributários ao leste do rio Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (LIRP 5226 a 5243).

***Hypostomus punctatus* Valenciennes, 1840**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Drenagens costeiras do sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Hypostomus pusalum* (Starks, 1913)**

Localidade-tipo: Mirim, Estado do Ceará, Brasil.  
Distribuição: Drenagens costeiras do nordeste do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus pyrineusi* (Miranda Ribeiro, 1920)**

Localidade-tipo: Jamari, rio Madeira, bacia do rio Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Madeira.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Weber & Montoya-Burgos (2002).

***Hypostomus regani* (Ihering, 1905)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis *et al.* (1990).

***Hypostomus rondoni* (Miranda Ribeiro, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Tapajós em São Manuel, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus roseopunctatus* Reis, Weber & Malabarba, 1990**

Localidade-tipo: Rio Pelotas na estrada de Esmeralda para Anita Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus scabriceps* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Rio São Mateus, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Mateus.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Isbrücker (1980).

***Hypostomus scaphyiceps* (Nichols, 1919)**

Localidade-tipo: Cerqueira César, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paranapanema.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Fowler (1954).

***Hypostomus seminudus* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Brasil?  
Distribuição: Brasil?  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Observações: Conhecido somente o holótipo.

***Hypostomus simios* Hollanda Carvalho & Weber, 2004**

Localidade-tipo: Rio Cupixi (estação nº MIG 84010006), ponte na estrada para Serra do Navio, Estado do Amapá, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.



***Hypostomus soniae* Hollanda Carvalho & Weber, 2004**

Localidade-tipo: Lagoas temporárias nas margens do rio Tapajós, entre Vila Nova e Uruá, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus strigaticeps* (Regan, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus subcarinatus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco [?]; drenagens costeiras do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus taphorni* (Lilyestrom, 1984)**

Localidade-tipo: Rio Botanamo, próximo a ponte sobre a estrada para Bochínche, Estado Bolívar, Venezuela.

Distribuição: Bacia Cuyuni, Venezuela e bacias do Ireng e Takutu, na fronteira com a Guiana.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Armbruster & Souza (2005).

***Hypostomus tapijara* Oyakawa, Akama & Zanata, 2005**

Localidade-tipo: Rio Catas Altas, Ribeira, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rios de maior porte na bacia do Ribeira de Iguape, rios Ribeira de Iguape, Catas Altas, Pardo e Batatal. Riachos costeiros da Estação Ecológica da Juréia-Itatins, ao norte da drenagem do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus ternetzi* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Paraguai.

Distribuição: Médio Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fowler (1954).

***Hypostomus tietensis* (Ihering, 1905)**

Localidade-tipo: Rio Tietê, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus topavae* (Godoy, 1969)**

Localidade-tipo: Cachoeira de Emas, região da Topava, Rio Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Grande.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Conhecido somente o holótipo.

***Hypostomus unae* (Steindachner, 1878)**

Localidade-tipo: Rio Una, Brasil.

Distribuição: Bacia do Una, Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus uruguayensis* Reis, Weber & Malabarba, 1990**

Localidade-tipo: Rio Uruguai em "Rancho da Amizade", São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Hypostomus vaillanti* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Preto em Villa de Santa Rita, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco, drenagem do rio Preto.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mazzoni *et al.* (1994).

***Hypostomus variipictus* (Ihering, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Pardo, próximo a Barretos, quase em sua foz no Rio Grande, tributário do lado esquerdo do Rio Paraná, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Grande.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus varimaculosus* (Fowler, 1945)**

Localidade-tipo: Morelia, drenagem do Rio Caquetá, Colômbia.

Distribuição: Alto Japurá.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fowler (1954).

***Hypostomus variostictus* (Miranda Ribeiro, 1912)**

Localidade-tipo: Coxim, tributário do rio Paraguai, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Conhecido somente o holótipo.

***Hypostomus vermicularis* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba, Estado do Rio de Janeiro; Mendez; Macacos; Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mazzoni *et al.* (1994).

***Hypostomus waiampi* Hollanda Carvalho & Weber, 2004**

Localidade-tipo: Rio Cupixi (estação nº MIG 84010006), ponte na estrada para Serra do Navio, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypostomus wuchereri* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Isbrueckerichthys alipionis* (Gosline, 1947)**

Localidade-tipo: Quase certamente no ribeirão do Monjolinho, bacia do rio Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio Betari, bacia do Ribeira do Iguape, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

***Isbrueckerichthys duseni* (Miranda Ribeiro, 1907)**

Localidade-tipo: Ribeirão do Monjolinho, 300m acima do nível do mar, tributário do rio Betari, Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Riachos do alto Ribeira de Iguape, no Estado do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

***Isbrueckerichthys epakmos* Pereira & Oyakawa, 2003**

Localidade-tipo: Rio Verde em Piúva, na estrada para Rio Verde, 23°58'22"S 47°34'23"W, drenagem do rio Ribeira do Iguape, Tapiraí, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do Juquiá, bacia do Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Kronichthys heylandi* (Boulenger, 1900)**

Localidade-tipo: Riacho de montanha, 400 acima do nível do mar, próximo a Santos, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Drenagens costeiras do Brasil, entre Santos e Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Miranda Ribeiro (1918a), Gosline (1947).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Kronichthys lacerta* (Nichols, 1919)**

Localidade-tipo: Poço Grande, rio Juquiá, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias da baía de Paranaguá e Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Armbruster & Page (1997).

***Kronichthys subteres* Miranda Ribeiro, 1908**

Localidade-tipo: Rio Betari, rio Pardo e rio Iporanga, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Liposarcus anisitsi* (Eigenmann & Kennedy, 1903)**

Localidade-tipo: Lago do rio Paraguai em Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Prata, bacias do Paraguai e Uruguai; médio Paraná.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Miranda Ribeiro (1912), Weber (1992).

***Liposarcus disjunctivus* Weber, 1991**

Localidade-tipo: Rio Madeira, sistema do rio Amazonas, Restauração, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weber (1992).

***Liposarcus pardalis* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Weber (1992).

***Pareiorhaphis azygolechis* Pereira & Reis, 2002**

Localidade-tipo: Rio Araraquara cerca de 8 Km N de Guaruva, 25°57'58"S 48°49'43"W, Guaratuba, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio São João.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis bahianus* (Gosline, 1947)**

Localidade-tipo: Fazenda Almada, Município de Ilheus, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Pequenas drenagens costeiras próximas a Ilhéus, entre as bacias dos rios Pardo e das Contas, sul do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis calmoni* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Cubatão, próximo ao Município de Água Mornas, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Cubatão, Tubarão e Araranguá e riachos costeiros no Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis cerosus* Miranda Ribeiro, 1951**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Distribuição desconhecida.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 648A.

Referência: Pereira & Reis (2002).

Observações: Redescrição e designação de lectótipos em Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhaphis eurycephalus* Pereira & Reis, 2002**

Localidade-tipo: Riacho tributário do rio Canoas ao leste da Vila São José, na estrada para serra do Corvo Branco, 28°03'33"S 49°25'42"W, Município de Urubici, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Canoas, no Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis garbei* Ihering, 1911**

Localidade-tipo: Curso superior, montanha acima, rio Macaé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Tributários de rios ao sul da serra dos Órgãos, bacias dos rios Macaé e Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio de Janeiro.

***Pareiorhaphis hypselurus* Pereira & Reis, 2002**

Localidade-tipo: Rio Forqueta tributário do Rio Maquiné, 29°32'42"S 50°14'21"W, Município de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Maquiné e Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul; bacias dos rios Mampituba e rio Araranguá, Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis hystrix* Pereira & Reis, 2002**

Localidade-tipo: Riacho tributário do rio dos Touros, estrada de Silveira para Rondinha, 28°39'18"S 50°18'25"W, Município de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do Pelotas, (alto Uruguai), rios Ijuí e Piratini (rio Uruguai) e rio das Antas (rio Jacuí).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis mutuca* Oliveira & Oyakawa, 1999**

Localidade-tipo: Bacia do rio das Velhas, Município de Nova Lima, córrego Mutuca, ao lado direito da estrada de Belo Horizonte para Nova Lima, km 20, ca. 20°60'S 43°55'W, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Pareiorhaphis nudulus* Reis & Pereira, 1999**

Localidade-tipo: Rio Jordão em Jordão Alto, aproximadamente 28°35'S 49°27'W, Município de Nova Veneza, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araranguá, sul do Estado de Santa Catarina; bacias do Mampituba, Três Forquilhas e Maquiné, Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhaphis parmula* Pereira, 2005**

Localidade-tipo: rio dos Patos, 25°50'36,8"S 49°43'39,2"W, tributário do rio da Várzea, na estrada PR-427 entre Lapa e Campo do Tenente, bacia do rio Iguaçu, Município de Lapa, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio dos Patos, nas cabeceiras da bacia do rio Iguaçu, no Estado do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis regani* Giltay, 1936**

Localidade-tipo: Rio Curi Curiay (atualmente Curicuriari), sul do alto rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Curicuriari e possivelmente no rio Jaú, tributários do rio Negro, Bacia Amaz.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhaphis splendens* Bizerril, 1995**

Localidade-tipo: Rio Cubatão, próximo à cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Drenagens costeiras do Estado de Santa Catarina (rio Cubatão Norte, rio Itajaí-Açu e rio Cubatão Sul) e Paraná (rio Nhundiaquara e rio São João).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

Observações: Redescrição e distribuição em Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhaphis steindachneri* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: Rio Itapocú, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Rio Cubatão Norte, rio Itapocu, rio Itajaí-Açu e rio Cubatão Sul, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

Observações: Lectótipo designado em Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhaphis stephanus* Oliveira & Oyakawa, 1999**

Localidade-tipo: Ribeirão das Pedras, ca. 1300 masl, 3 km ao norte de Diamantina, aprox. 18°10'S 43°37'W, drenagem do rio Jequitinhonha, Município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacias do Jequitinhonha, Itacarambi e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhaphis stomias* Pereira & Reis, 2002**

Localidade-tipo: Rio Mãe Luzia em Forquilha, 28°27'66"S 49°30'06"W, bacia do rio Araranguá, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Rios Araranguá e Tubarão, no sul da região costeira do Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhaphis vestigipinnis* Pereira & Reis, 1992**

Localidade-tipo: Riacho tributário do rio Caveiras em Paniel, aproximadamente 27°55'S 50°05'W, na estrada de São Joaquim para Lajes, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Cabeceiras do rio Canoas e seus tributários no Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Pereira & Reis (2002).

***Pareiorhina brachyrhyncha* Chamon, Aranda & Buckup, 2005**

Localidade-tipo: Ribeirão Grande e canal adjacente, bacia do Paraíba do Sul, 22°46'14,1"S 45°26'42,5"W, Fazenda Vera Cruz, Bairro Ribeirão Grande, Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Drenagens do ribeirão Grande, Guamerai e Piagüi, na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, junto à encosta da Serra da Mantiqueira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhina carrancas* Bockmann & Ribeiro, 2003**

Localidade-tipo: Córrego Debaixo da Serra (tributário do córrego do Beijinho, margem esquerda do rio Grande no reservatório de Carmargos), na base da Serra de Carrancas, Município de Carrancas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Córrego Debaixo da Serra, bacia do rio Grande, base da Serra de Carrancas, Município de Carrancas, Estado de Minas Gerais.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pareiorhina rudolphi* (Miranda Ribeiro, 1911)**

Localidade-tipo: Piquete (Lorena), Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Riachos tributários do Paraíba do Sul, próximo a Lorena no Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Gosline (1947), Bockmann & Ribeiro (2003).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Pogonopoma obscurum* Quevedo & Reis, 2002**

Localidade-tipo: Rio Canoas na estrada de Anita Garibaldi para Abdon Batista, aproximadamente 27°39'S 51°05'W, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Alto Uruguai no Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pogonopoma parahybae* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Armbruster (1998b), Quevedo & Reis (2002).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Pogonopoma wertheimeri* (Steindachner, 1867)**

Localidade-tipo: Rio Mucuri, Santa Clara, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Rios Mucuri, São Mateus e Doce.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Armbruster (1998b), Quevedo & Reis (2002).

***Pseudorinelepis genibarbis* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Armbruster & Hardman (1999).

***Pterygoplichthys barbatus* (Steindachner, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Tapajós em Vila Braga, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pterygoplichthys etentaculatus* (Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Januária, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann & Eigenmann (1889b), Weber (1992).

***Rhinelepis aspera* Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco e alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro, vulnerável no Estado do Paraná.

***Rhinelepis strigosa* Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840**

Localidade-tipo: Rio Paraná e outros rios da província de Corrientes, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Armbruster (1998b).

***Squaliforma annae* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Estado do Pará (= Belém, Brasil).

Distribuição: Bacia do Guamá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker *et al.* (2001).

***Squaliforma biseriata* (Cope, 1872)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas (Peru ou Brasil).

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker *et al.* (2001).

***Squaliforma emarginata* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker *et al.* (2001), Montoya-Burgos *et al.* (2002).

***Squaliforma gomesi* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jaguaribe.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Squaliforma horrida* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Forte do Príncipe, rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker *et al.* (2001).

***Squaliforma scopularia* (Cope, 1871)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas acima da desembocadura do Rio Negro.

Distribuição: Bacia do médio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker *et al.* (2001).

***Squaliforma squalina* (Jardine, 1841)**

Localidade-tipo: Rio Branco, rio Negro, rio Essequibo.

Distribuição: Bacia dos rios Negro e Branco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Jardine & Schomburgk (1841), Isbrücker *et al.* (2001), Montoya-Burgos *et al.* (2002).

**Família Loricariidae: Ancistrinae**

Luisa Maria Soares-Porto &

Leonardo Ferreira da Silva Ingenito

***Acanthicus adonis* Isbrücker & Nijssen, 1988**

Localidade-tipo: Cametá, bacia do rio Tocantins, 0°14'S 49°30,5'W, Brasil.

Distribuição: Bacias Amazônica e do Baixo Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Burgess (1989).

***Acanthicus hystrix* Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ortega & Vari (1986).

***Ancistrus aguaboensis* Fisch-Muller, Mazzoni & Weber, 2001**

Localidade-tipo: Córrego Água Boa, afluente do rio Bonito, alto Tocantins, 13°35'S 48°14'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ancistrus brevipinnis* (Regan, 1904)**

Localidade-tipo: Sistema da Laguna dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema da Laguna dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ancistrus claro* Knaack, 1999**

Localidade-tipo: Rio Claro, a montante da ponte em direção a Chapada dos Guimarães, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Cuiabá.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Ancistrus cryptophthalmus* Reis, 1987**

Localidade-tipo: Caverna Passa Três, cerca de 300 m no interior da caverna, Bacia do rio São Vicente, São Domingos, 13°20' a 13°52'S 46°16' a 46°30'W, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Sistemas das cavernas São Vicente e Angélica-Bezerra.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Trajano & Souza (1994).

***Ancistrus cuiabae* Knaack, 1999**

Localidade-tipo: Poça permanente do rio Bento Gomes, 36 km a sudeste de Poconé, Pantanal, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Cuiabá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ancistrus damasceni* (Steindachner, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Parnaíba, próximo de Vitória e Santa Filomena, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Miranda Ribeiro (1911).

***Ancistrus dolichopterus* Kner, 1854**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do médio Amazonas e Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann & Eigenmann (1890).

***Ancistrus dubius* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Gurupá, Brasil.

Distribuição: Bacias do baixo Amazonas e sistema Paraná-Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1980).

***Ancistrus formoso* Sabino & Trajano, 1997**

Localidade-tipo: Caverna Buraco do Ducho, 21°08'S 56°28'W, Serra da Bodoquena, Bonito, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Trajano & Gerhard (1997).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Ancistrus fulvus* (Holly, 1929)**

Localidade-tipo: Alto rio Acará, Baixo Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Conhecido apenas do holótipo.

***Ancistrus hoplogenyis* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio Capim, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Capim, Tocantins e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Ancistrus latifrons* (Günther, 1869)**

Localidade-tipo: Marañon, Alto Amazonas.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: BMNH 1869.5.21.9.

Referência: Isbrücker (1980).

***Ancistrus maculatus* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Cudajas (= Codajás); Óbidos e rio Tajapouru (= Tajapuru).

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1980).

Observações: Há exemplares tipos de várias localidades; talvez esses exemplares representem espécies distintas.

***Ancistrus mattogrossensis* Miranda Ribeiro, 1912**

Localidade-tipo: Desconhecida (Estado do Mato Grosso?).

Distribuição: Desconhecida.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (1980), Armbruster (1997).

Observações: Espécie com validade duvidosa. *A. mattogrossensis* só é conhecida através de sua descrição, não havendo registro de capturas posteriores. Tipos provavelmente perdidos.

***Ancistrus minutus* Fisch-Muller, Mazzoni & Weber, 2001**

Localidade-tipo: Córrego Batéias, tributário do alto Tocantins, 13°49'S 48°20'W, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ancistrus multispinis* (Regan, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Humboldt, bacia do rio Itapocú, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Sul do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Muller (1989).

***Ancistrus parecis* Fisch-Muller, Cardoso, Silva, Bertaco, 2005**

Localidade-tipo: rio Formiga, tributário do rio Juruena, bacia do alto Tapajós, na estrada entre Campos de Júlio e Sapezal, Município de Campos de Júlio, 13°41'01"S 59°12'11"W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Tributário do rio Juruena, na Chapada dos Parcis, bacia do alto Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ancistrus ranunculus* Muller, Py-Daniel & Zuanon, 1994**

Localidade-tipo: Rio Xingu, furo do Tucum Seco, próximo à Arroz Cru, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Xingú e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Ancistrus stigmaticus* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: São Mateus, provavelmente no Estado do Espírito Santo, e Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Estado do Espírito Santo ao Estado de Santa Catarina e bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Muller (1989).

***Ancistrus taunayi* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: Rio Lageado, Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Muller (1989).

***Ancistrus verecundus* Fisch-Muller, Cardoso, Silva, Bertaco, 2005**

Localidade-tipo: Igarapé Piracolina, 12°43'33"S 60°11'34"W, cerca de 8 Km a oeste de Vilhena, na BR 364, bacia do alto

Madeira, Município de Vilhena, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Baryancistrus longipinnis* (Kindle, 1895)**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Trocera, 3°21'S 61°26'W, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (2001).

***Baryancistrus niveatus* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rapp Py-Daniel (1989).

***Chaetostoma jegui* Rapp Py-Daniel, 1991**

Localidade-tipo: Rio Uraricoera, Ilha de Maracá, a jusante do furo de Maracá, Bacia do rio Branco, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Dekeyseria amazonica* Rapp Py-Daniel, 1985**

Localidade-tipo: Rio Solimões, lago Janauacá, Manaquiri, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Dekeyseria brachyura* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Desembocadura do rio Negro, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Van der Stigchel (1947).

***Dekeyseria picta* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Desembocadura do rio Negro, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Dekeyseria pulcher* (Steindachner, 1915)**

Localidade-tipo: Desembocadura do rio Negro em Moura, 1°32'S 61°38'W, Brasil.

Distribuição: Rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rapp Py-Daniel (1985), Isbrücker (1980), Armbruster (1997).

***Dekeyseria scaphirhyncha* (Kner, 1854)**

Localidade-tipo: Desembocadura do rio Negro, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rapp Py-Daniel (1985).

***Exastilithoxus hoedemani* Isbrücker & Nijssen, 1985**

Localidade-tipo: Rio Marauí, cachoeira Pora Comeschie.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus chlorostictus* Cardoso & Malabarba, 1999**

Localidade-tipo: Represa de Passo Fundo, Ronda Alta, bacia do Uruguai, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Hemiancistrus fuliginosus* Cardoso & Malabarba, 1999**

Localidade-tipo: Rio Jacutinga, estrada Seara-Concórdia (BR-283), Concórdia, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto e médio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus megalopteryx* Cardoso, 2004**

Localidade-tipo: Rio Braço do Norte, aprox. 28°16'38"S 49°11'11,1"W, Braço do Norte, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tubarão, no Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus meizospilos* Cardoso & Silva, 2004**

Localidade-tipo: Rio Chapecó, Coronel Freitas, bacia do Uruguai, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus micrommatos* Cardoso & Lucinda, 2003**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, na barragem da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, entre Minaçu e Cavalcante, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus punctulatus* Cardoso & Malabarba, 1999**

Localidade-tipo: Rio dos Sinos, praia João Fernandes, Caraá, sistema da Lagoa dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema da Lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus spilomma* Cardoso & Lucinda, 2003**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, próximo da foz do rio Lajeado, Porto Franco, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus spinosissimus* Cardoso & Lucinda, 2003**

Localidade-tipo: Rio Maranhão, próximo da foz do rio Tocantinzinho, divisa dos Municípios de Niquelândia e Campinaçu, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemiancistrus votouro* Cardoso & Silva, 2004**

Localidade-tipo: Arroio Lageado Grande, tributário do rio Passo Fundo, Benjamin Constant, bacia do Uruguai, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hopliancistrus tricornis* Isbrücker & Nijssen, 1989**

Localidade-tipo: Poça de pedra, rio Tapajós, São Luis, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rios Tapajós e Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Armbruster (1997).

***Hypancistrus zebra* Isbrücker & Nijssen, 1991**

Localidade-tipo: Rio Xingu, aproximadamente uma hora de barco a motor acima de Altamira, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Pará.

***Lasiancistrus guapore* Knaack, 2000**

Localidade-tipo: Rio Guaporé.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Lasiancistrus multispinis* (Holly, 1929)**

Localidade-tipo: Mercado de Belém.

Distribuição: Desconhecida.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Armbruster (1997), Isbrücker (2001).

Observações: Localidade tipo incerta (Fisch-Muller, 2003).

***Lasiancistrus saetiger* Armbruster, 2005**

Localidade-tipo: Rio Guamá, próximo a Ourém, 1°34'07"S 47°10'08"W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Lasiancistrus scolymus* Nijssen & Isbrücker, 1985**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, Humboldt, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Armbruster (1997), Burgess (1989).

Observações: Registro para o sistema do rio Madeira, Estado de Mato Grosso do Sul.

***Leporacanthicus galaxias* Isbrücker & Nijssen, 1989**

Localidade-tipo: Lagoa em frente a Jatobal, rio Tocantins, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporacanthicus heterodon* Isbrücker & Nijssen, 1989**

Localidade-tipo: Cachoeira von Martius, rio Xingu, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leporacanthicus joselimai* Isbrücker & Nijssen, 1989**

Localidade-tipo: Maloquinha, perto de Itaituba, rio Tapajós, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Lithoxancistrus genisetiger* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Rio Jaguaribe, Orós, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Jaguaribe.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (2001), Burgess (1989).

***Lithoxancistrus papariae* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Lago Papari, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do nordeste brasileiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (2001), Burgess (1989).

***Megalancistrus aculeatus* (Perugia, 1891)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacias dos rios Paraguai e Alto Paraná.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 24435).

Referência: Armbruster (1997).

Observações: Sinônimo sênior de *Megalancistrus gigas* em Steindachner (1910).

***Megalancistrus barrae* (Steindachner, 1910)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Stawikowski (1992).

***Megalancistrus parananus* (Peters, 1881)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14982).

Referências: Fowler (1954), Isbrücker (1980).

***Oligancistrus punctatissimus* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Porto de Moz, rio Xingu, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rios Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 36871).

Referências: Isbrücker & Nijssen (1991), Rapp Py-Daniel (1989), Burgess (1989).

***Panaque nigrolineatus* (Peters, 1877)**

Localidade-tipo: Calabozo, rio Guarico, Venezuela.

Distribuição: Rio Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 24124).

Referência: Eigenmann & Eigenmann (1889b).

***Panaque purusiensis* La Monte, 1935**

Localidade-tipo: Rio Purus, próximo ao rio Machauan, um afluente do rio Yacu, o qual é tributário do rio Purus.

Distribuição: Alto rio Purus.

Documentação primária: Lote de referência (AMNH 12600).

Referências: Schaeffer & Stewart (1993), Burgess (1989).

***Parancistrus aurantiacus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Ucayali.

Distribuição: Rios Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 23108).

Referências: Rapp Py-Daniel (1985), Stawikowski (1991).

***Parancistrus nudiventris* Rapp Py-Daniel, 2005**

Localidade-tipo: Rio Xingu, ilha do Bacabal, 3°23'19"S 51°43'24"W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Xingu

Documentação primária: Localidade tipo.

***Parancistrus vicinus* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Ucayali.

Distribuição: Rios Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 36870).

Referências: Regan (1904), Armbruster (1997), Burgess (1989).

***Peckoltia albocincta* (Ahl, 1936)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (1980), Armbruster (1997), Paepke (1995).

***Peckoltia bachi* (Boulenger, 1898)**

Localidade-tipo: Rio Juruá.

Distribuição: Rio Juruá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Regan (1904).

***Peckoltia brevis* (La Monte, 1935)**

Localidade-tipo: Rio Purus, próximo a boca do rio Macauhan, tributário do rio Yacu o qual é tributário do rio Purus.

Distribuição: Bacia do rio Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (1980), Conci & Michelangeli (1974).

***Peckoltia filicaudata* (Miranda Ribeiro, 1917)**

Localidade-tipo: Rio Solimões.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1980).

***Peckoltia kuhlmanni* (Miranda Ribeiro, 1920)**

Localidade-tipo: Tapajós, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1980).

***Peckoltia oligospila* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio Capim, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Regan (1904), Isbrücker (1980).

***Peckoltia salgadae* (Fowler, 1941)**

Localidade-tipo: Rio Salgade (rio Salgado), Icó, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (1980), Armbruster (1997).

***Peckoltia snethlageae* (Steindachner, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, Vila Braga, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Isbrücker (1980), Armbruster (1997), Fisch-Muller (2003).

Observações: Descrição original como *Ancistrus snethlageae* posteriormente mencionado como *Lasiancistrus* (Armbruster, 1997). Nova combinação por Fisch-Muller (2003).

***Peckoltia vermiculata* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Médio e Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Isbrücker (1980).

***Peckoltia vittata* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Porto de Moz, rios Madeira e Xingu.

Distribuição: Bacias dos rios Tocantins e do baixo Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 19374).

Referência: Miranda Ribeiro (1912).

***Pseudacanthicus hystrix* (Valencienes, 1840)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Regan (1904).

Observações: Tipos possivelmente perdidos.

***Pseudacanthicus spinosus* (de Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 3730.

Referência: Regan (1904).

***Pseudancistrus barbatus* (Valencienes, 1840)**

Localidade-tipo: Proximidades de Paramaribo, Suriname.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 25002).

Referências: Bleeker (1864), Regan (1904), Le Bail *et al.* (2000).



***Pseudancistrus luederwaldti* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: Hansa, Estado de Santa Catarina, Brasil.  
Distribuição: Drenagens costeiras do Estado de Santa Catarina.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Isbrücker (1980), Armbruster (1997).

***Scobinancistrus aureatus* Burgess, 1994**

Localidade-tipo: Ilha da Fazenda, rio Xingu, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Xingu e Bacia Amazônica.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Armbruster (1997).

***Scobinancistrus pariolispos* Isbrücker & Nijssen, 1989**

Localidade-tipo: Rio Tocantins em Jatobal, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rios Tocantins, Tapajós e Itacaiunas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Spetracanthicus murinus* Nijssen & Isbrücker, 1987**

Localidade-tipo: Poça de pedra, rio Tapajós, São Luis, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Baixo rio Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Loricariinae: Delturinae**

Murilo de Carvalho,

Flávio Alicino Bockmann,

Paulo Andreas Buckup

***Delturus angulicauda* (Steindachner, 1877)**

Localidade-tipo: Rio Mucuri em Santa Clara, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Drenagem do alto rio Mucuri.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis *et al.* (2006).

***Delturus brevis* (Reis & Pereira, 2006)**

Localidade-tipo: Rio Araçuaí, tributário do rio Jequitinhonha, Araçuaí, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Drenagem do alto rio Jequitinhonha.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Delturus carinotus* (La Monte, 1933)**

Localidade-tipo: Rio Doce, Estado do Espírito Santo, leste do Brasil.  
Distribuição: Drenagem do alto rio Doce.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis *et al.* (2006).

***Delturus parahybae* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, Brasil.  
Distribuição: Drenagem do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Reis *et al.* (2006).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: "Endangered" (Pompeu And Vieira, 2003).

***Hemipsilichthys gobio* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul, Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Pereira & Reis (2002).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável (como "*Upsilonodus victori*") no Estado do Rio de Janeiro.

Observações: Localidade tipo restrita por Pereira *et al.* (2000).

***Hemipsilichthys nimius* Pereira, Reis, Souza & Lazzarotto, 2003**

Localidade-tipo: Rio Carrasquinho abaixo da Cachoeira do Tobogã, bacia do alto Perequê-Açu, Penha, ca. 7,5 Km a oeste da rodovia BR101, estrada Parati - Cunha, 23°12'51"S 44°47'28"W, Município de Parati, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio Perequê-Açu e proximidades do rio Taquari, na costa sul do Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hemipsilichthys papillatus* Pereira, Oliveira & Oyakawa, 2000**

Localidade-tipo: Drenagem do Paraíba do Sul, Município de Rio Preto, 22°02'S 43°47'W, ribeirão Santana, tributário do rio Preto, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Tributários do rio Preto, bacia do Paraíba do Sul, Estado de Minas Gerais.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Pseudopimelodidae**

Oscar Akio Shibatta

***Batrochoglanis raninus* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Mana, Guiana Francesa.

Distribuição: Ampla distribuição na Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 23407.

Referência: Shibatta (1998).

Observações: Gênero revalidado. Ver discussão em Shibatta (1998).

***Batrochoglanis villosus* (Eigenmann, 1840)**

Localidade-tipo: Potaro Landing, Guiana.

Distribuição: Ampla distribuição na Bacia Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 31092).

Referência: Shibatta (1998).

Observações: Gênero revalidado. Ver discussão em Shibatta (1998).

***Cephalosilurus fowleri* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Cidade da Barra, rio São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1986).

***Lophiosilurus alexandri* Steindachner, 1889**

Localidade-tipo: Provavelmente Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1986).

Observações: Localidade tipo incorreta no trabalho de descrição da espécie. Espécie endêmica da bacia do rio São Francisco.

***Microglanis cibela* Malabarba & Mahler Jr., 1998**

Localidade-tipo: Arroio do Ouro, rio Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros da formação Serra Geral, Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microglanis cottoides* (Boulenger, 1891)**

Localidade-tipo: Rio Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Laguna dos Patos e bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba & Mahler (1998).

***Microglanis eurystoma* Malabarba & Mahler Jr., 1998**

Localidade-tipo: Rio Uruguai, Itá, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Alto Uruguai, Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microglanis garavello* Shibatta & Benine, 2005**

Localidade-tipo: Ribeirão Taquari, 23°12'24"S 50°56'50"W, Município de Jataizinho, Estado do Paraná,

Distribuição: Bacias dos rios Paranapanema e Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microglanis malabarbai* Bertaco & Cardoso, 2005**

Localidade-tipo: Arroio Albino, tributário do rio Ijuí, bacia do Uruguai, 28°09'10"S 54°55'28"W, Município de São Pedro do Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguí, no Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Microglanis nigripinnis* Bizerril & Perez-Neto, 1992**

Localidade-tipo: Rio Macacu, Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Rio Macacu, Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Microglanis parahybae* (Steindachner, 1880)**

Localidade-tipo: Rios Paraíba do Sul e Santa Cruz, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Malabarba & Mahler (1998).

***Microglanis pataxo* Sarmiento-Soares *et al.*, 2006**

Localidade-tipo: Córrego Jundiá na estrada BR-101 para Jucuruçu, 17°01'34"S 39°35'56"W, próximo a Itamaraju, Município de Itamaraju, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Cahy, Jucuruçu e Peruípe, no Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudopimelodus bufonius* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Caiena, Guiana Francesa.

Distribuição: Ampla distribuição na Bacia do Amazônica.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 6202).

Referência: Shibatta (1998).

***Pseudopimelodus charus* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Sabará, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Shibatta (1998).

***Pseudopimelodus mangurus* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: De Misiones às confluências dos rios Paraná e do Prata, bacia do rio da Prata.

Distribuição: Ampla distribuição na bacia dos rios Paraná-Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 13087.

Referência: Shibatta (1998).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

**Família Heptapteridae**

Flávio Alicino Bockmann

***Acentronichthys leptos* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Sao Matheos [=São Mateus, Estado do Espírito Santo, Brasil].

Distribuição: Rios costeiros do Estado do Rio de Janeiro ao Estado de Santa Catarina, e São Mateus, no Estado do Espírito Santo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro, em perigo no Estado do Espírito Santo.

***Brachyglanis frenata* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Amatuk [na bacia do rio Essequibo, Guiana].

Distribuição: Bacia do Urubu (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Brachyglanis microphthalmus* Bizerril, 1991**

Localidade-tipo: Município de Oriximiná, bacia do rio Trombetas, drenagem do lago Sapucúá, Igarapé Saracá, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Trombetas (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Brachyglanis nocturnus* Myers, 1928**

Localidade-tipo: Poços de pedra nas corredeiras de São Gabriel, rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Negro (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Brachyrhamdia heteropleura* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Rupununi Pan [bacia do Essequibo, Guiana].

Distribuição: Bacia do Negro (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Brachyrhamdia marthae* Sands & Black in Sands, 1985**

Localidade-tipo: Peru.

Distribuição: Bacias dos rios Juruá e Mamoré/Madeira (afluentes do rio Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Brachyrhamdia meesi* Sands & Black in Sands, 1985**

Localidade-tipo: Próximo à Belém, Brasil.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Brachyrhamdia rambarrani* (Axelrod & Burgess in Axelrod, 1987)**

Localidade-tipo: Rio Unini, tributário do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Unini (afluente do Negro).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsorhamdia iheringi* Schubart & Gomes, 1959**

Localidade-tipo: Ribeirão Areia Branca, próximo à estrada carroçável para Piraçununga, bacia do Rio Mogi Guaçu, Município de Descalvado, Brasil.

Distribuição: Cursos superiores dos rios Paraná e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cetopsorhamdia insidiosa* (Steindachner, 1917)**

Localidade-tipo: Rio Branco em Bem Querer e no rio Surumu, em algum afluente do rio Miang.

Distribuição: Bacia do Branco (afluente do rio Negro, afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

***Cetopsorhamdia molinae* Miles, 1943**

Localidade-tipo: Bugalagrande [Colômbia].

Distribuição: Alto Tocantins.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Chasmocranus brachynema* Gomes & Schubart, 1958**

Localidade-tipo: Rio Mogi Guaçu, Cachoeira de Emas, Município de Piraçununga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Mogi Guaçu (afluente do alto Paraná).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Chasmocranus brevior* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Waratuk.

Distribuição: Bacias costeiras no Estado do Amapá.

Documentação primária: Lote de referência (LIRP 3271).

***Chasmocranus longior* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Amatuk.

Distribuição: Bacia do Negro (afluente do Amazonas) e baixo Xingú.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Chasmocranus lopezi* Miranda Ribeiro, 1968**

Localidade-tipo: Córrego Quente, Cubatão [?], Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Rio costeiro indeterminado no Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Chasmocranus truncatorostris* Borodin, 1927**

Localidade-tipo: Col. Hansa, Joinville, Estado de Santa Catharina, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

Observações: O registro como espécie ameaçada no Estado do Rio de Janeiro pode ser um erro de identificação (nota dos editores).

***Gladioglanis conquistador* Lundberg, Bornbusch & Mago-Leccia, 1991**

Localidade-tipo: Bacia do rio Napo, sub-bacia do rio Aguarico, tributário ao norte do rio Cuyabeno, ca. 3 km acima de Laguna Grande de Cuyabeno, 0°1.5'S 76°13.2'W, Província Napo, Equador.

Distribuição: Bacias dos rios Capim, Purus e Solimões (afluentas do Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Gladioglanis machadoi* Ferraris & Mago-Leccia, 1989**

Localidade-tipo: Caño Manu do canal Casiquiare, aprox. 250 m a montante de Solano, 2°00'N 66°57'W, Venezuela.

Departamento Rio Negro, Território Federal Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacia do Negro (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Goeldiella eques* (Müller & Troschel in Schomburgk, 1848)**

Localidade-tipo: Rios das Guianas.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Heptapterus bleekeri* Boeseman, 1953**

Localidade-tipo: Riacho na bacia do Marowini, Nassau Mountains, Suriname.

Distribuição: Bacias costeiras no Estado do Amapá, Guiana Francesa e Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: LIRP 3270.

Referência: Mees (1974).

Observações: Mees (1983) corrigiu a localidade-tipo desta espécie para um riacho no lado leste das Nassau Mountains, na bacia do Marowijne/Maroni, no Suriname.

***Heptapterus fissipinnis* Miranda Ribeiro, 1911**

Localidade-tipo: Córrego afluente do rio Estrela [provavelmente no Estado do Rio de Janeiro, Brasil].

Distribuição: Rios costeiros no Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Heptapterus multiradiatus* Ihering, 1907**

Localidade-tipo: Ribeirão do Alto da Serra, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Curso superior do rio Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Heptapterus mustelinus* (Valenciennes in d'Orbigny, 1835)**

Localidade-tipo: Bacia do rio da Prata.

Distribuição: Bacias do Uruguai e drenagens costeiras do Estado de Santa Catarina ao Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Buckup (1988), Bockmann (1998).

Observações: Considerada sinônimo sênior de *Heptapterus eigenmanni* Steindachner por Buckup (1988).

***Heptapterus ornaticeps* Ahl, 1936**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro [provavelmente errada].

Distribuição: Desconhecida.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Heptapterus stewarti* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Serrinha, em um riacho cerca de meia milha do rio Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Alto Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Severi & Cordeiro (1994).

***Heptapterus sympterygium* Buckup, 1988**

Localidade-tipo: Canal no lado leste da rodovia BR-471 próximo à casa de bombas do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, 52°31'W, 32°32'S, Estação Ecológica do Taim, Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Alagados e águas lânticas das baixadas costeiras do leste do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Horiomyzon retropinnatus* Stewart, 1986**

Localidade-tipo: Rio Napo em Añangu, imediatamente a jusante da confluência com o rio Añangu Cocha, 0°31,6'S 76°22,9'W, Província Napo, Equador.

Distribuição: Calha central dos grandes rios das bacias do Amazonas e Solimões.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Imparfinis borodini* Mees & Cala, 1989**

Localidade-tipo: Franca, rio Grande, Província [Estado] de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Curso superior das bacias dos rios Paraná, São Francisco e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

Observações: Borodin (1927b) descreveu esta espécie como *Imparfinis longicauda*.

***Imparfinis hasemani* Steindachner, 1917**

Localidade-tipo: Rio Surumu próximo à Serra do Melo, rio Branco Branco próximo à Bem Querer e rio Tapajós próximo à Santarém.

Distribuição: Bacias dos rios Branco e Tapajós (afluentes do rio Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Imparfinis hollandi* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Porto União da Vitória, rio Iguaçu, Brasil.

Distribuição: Curso superior do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Severi & Cordeiro (1994).

***Imparfinis minutus* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Estado de Minas Gerais próximo à cidade de Lagoa Santa, especialmente no rio das Velhas e afluentes, Brasil.

Distribuição: Alto São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Britski (2001).

***Imparfinis mirini* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Próximo à Piracicaba acima das quedas do rio Piracicaba-Mirim, Brasil.

Distribuição: Cursos superiores dos rios Araguaia (afluente do Amazonas) e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Imparfinis piperatus* Eigenmann & Norris, 1900**

Localidade-tipo: São Paulo, Brasil.

Distribuição: Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Imparfinis pristis* Mees & Cala, 1989**

Localidade-tipo: Segundo tributário, no lado esquerdo, da boca do rio Tomo, Vichada, Colômbia.

Distribuição: Bacia do Negro (afluente do Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Imparfinis schubarti* (Gomes, 1956)**

Localidade-tipo: Cachoeira de Emas, rio Mogi-Guaçu, e do córrego do Tijuco Preto, um seu afluente, Município de Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Imparfinis stictonotus* (Fowler, 1940)**

Localidade-tipo: Todos Santos, rio Chapare, Bolívia.

Distribuição: Bacia dos rios Mamoré/Madeira (afluentes do Amazonas) e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Bockmann (1998).

***Leptorhamdia essequibensis* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Crab Falls.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 12243.

Referências: Bizerril & Borba (1994), Bockmann (1998).

***Leptorhamdia marmorata* Myers, 1928**

Localidade-tipo: Poços de pedra nas corredeiras de São Gabriel, rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Negro (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).



***Leptorhamdia schultzi* (Miranda Ribeiro, 1964)**

Localidade-tipo: Alto rio Xingu, Brasil.

Distribuição: Alto Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Mastiglanis asopos* Bockmann, 1994**

Localidade-tipo: Igarapé Saracazinho, tributário do rio Trombetas, próximo à Porto Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Amazonas, Capim e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Nemuroglanis lanceolatus* Eigenmann & Eigenmann, 1889**

Localidade-tipo: Jutai [= rio Jutai, afluente do rio Solimões, Estado do Amazonas, Brasil].

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Ferraris (1988a), Bockmann & Ferraris (2005).

***Nemuroglanis pauciradiatus* Ferraris, 1988**

Localidade-tipo: Morichal 26.9 km de Puerto Ayacucho ao longo da rodovia Puerto Ayacucho - Caicara, Território Federal Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacia dos rios Negro e Sanabani (afluentes do Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Bockmann (1998), Bockmann & Ferraris (2005).

***Phenacorhamdia hoehnei* (Miranda Ribeiro, 1914)**

Localidade-tipo: Rio Taquari, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Taquari (afluente da bacia do Paraguai).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Britski (1993).

***Phenacorhamdia somnians* (Mees, 1974)**

Localidade-tipo: Sangadina, um tributário do rio das Mortes, 2 km de Xaventina [Nova Xavantina], Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio das Mortes (afluente do Araguaia, afluente do Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Britski (1993).

***Phenacorhamdia tenebrosa* (Schubart, 1964)**

Localidade-tipo: Rio Mogi Guaçu, entre o pesqueiro da [Estação Experimental de Piscicultura de Pirassununga] e o pesqueiro do Sr. Firmino (Faz. Graciosa) ca. 1 km abaixo da Cachoeira [de Emas], Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Cursos superiores dos rios Paraná e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Britski (1993).

***Phenacorhamdia unifasciata* Britski, 1993**

Localidade-tipo: Ribeirão Santana, afluente do rio São Bartolomeu, 15°50'N 47°40'W, Distrito Federal, Brasil.

Distribuição: Alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Phreatobius cisternarum* Göldi, 1905**

Localidade-tipo: Água no interior de um lençol freático profundo na desembocadura do rio Amazonas na Ilha de Marajó, Brasil.

Distribuição: Lençóis freáticos na Ilha de Marajó, na desembocadura do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Carvalho (1967).

***Pimelodella australis* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Uruguiana, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai, e **bacias** costeiras do Estado de Santa Catarina até as lagoas costeiras do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Pimelodella avanhandavae* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Rio Tietê no Salto Avanhandava, acima da queda, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella boschmai* Van der Stigchel, 1964**

Localidade-tipo: Rio Mogi-Guaçu, acima da cachoeira de Emas, Pirassununga, Brasil.

Distribuição: Bacia do Mogi-Guaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mees (1974).

Observações: Considerada sinônimo sênior de *Pimelodella insignis* Schubart por Mees (1974).

***Pimelodella brasiliensis* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917a).

***Pimelodella breviceps* (Kner, 1857)**

Localidade-tipo: Marabitanos [Marabitanas, Estado do Amazonas, Brasil].

Distribuição: Bacia do alto Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella dorseyi* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Rio Salgado, Icó, Estado do Ceará [rio Salgado, Estado do Ceará, Brasil].

Distribuição: Bacia do Salgado (afluente do Jaguaribe).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella eigenmanni* (Boulenger, 1891)**

Localidade-tipo: Macacos, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917a).

***Pimelodella eigenmanniorum* (Miranda Ribeiro, 1911)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul e Macacos, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul e Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella enochi* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Açude Pilões, Estado da Paraíba, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Mamanguape, no Estado da Paraíba.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella gracilis* (Valenciennes in d'Orbigny, 1835)**

Localidade-tipo: Corrientes, no rio Paraná e riachos abaixo de 28° da latitude sul.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Paraná/Paraguai/Uruguai.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Mees (1974), Eigenmann (1917a).

***Pimelodella harttii* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Eigenmann (1917a), Eigenmann (1917a).

***Pimelodella hasemani* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: San Antonio de Rio Madeira.  
Distribuição: Bacia do Madeira (afluente do Amazonas).  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella itapicuruensis* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Queimadas, rio Itapicuru, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Itapicuru.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella kronei* (Miranda Ribeiro, 1907)**

Localidade-tipo: Iguape, em águas das cavernas do Iporanga, também no Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Cavernas na bacia do Ribeira do Iguape, no Estado de São Paulo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Eigenmann (1917a), Eigenmann (1917a).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.  
Observações: Considerada sinônimo sênior de *Caecorhamdella brasiliensis* (Borodin) por Trajano & Britski (1992).

***Pimelodella lateristriga* (Lichtenstein, 1823)**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Eigenmann (1917a), Eigenmann (1917a).  
Observações: Segundo Mees (1983), a localidade-tipo desta espécie pode ser próxima ou no Rio de Janeiro.

***Pimelodella laurenti* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Jatobá, Rio São Francisco, Estado do Pernambuco, Brasil.  
Distribuição: Curso inferior da bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella meeki* Eigenmann, 1910**

Localidade-tipo: São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tietê.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Eigenmann (1917a), Eigenmann (1917a).

Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo.

Observações: Eigenmann (1910) criou este nome em substituição a *Pimelodella eigenmanni* Meek (1905).

***Pimelodella megalura* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: São Luiz de Cáceres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella notomelas* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: São Luiz de Cáceres.

Distribuição: Alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella pappenheimi* Ahl, 1925**

Localidade-tipo: Rio Pedro perto de Humboldt, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Itajaí-Açú, Itapocú e Cubatão, no Estado de Santa Catarina, e Paranaguá, no Estado do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella parnahybae* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Rio Parnaíba, Teresina, Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Bacia do Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella pectinifer* Eigenmann & Eigenmann, 1888**

Localidade-tipo: Campos.

Distribuição: Rio Muriaé (afluente do Paraíba do Sul).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Eigenmann (1917a), Eigenmann (1917a).

***Pimelodella rendahli* Ahl, 1925**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Desconhecida.

Documentação primária: Bibliográfica.

***Pimelodella rudolphi* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: Mercado de São Paulo.

Distribuição: Estado de São Paulo.

Documentação primária: Bibliográfica.

***Pimelodella spelaea* Trajano, Reis & Bichuette, 2004**

Localidade-tipo: Riacho subterrâneo tributário do Rio São Bernardo, bacia do Alto Rio Tocantins, no interior da Caverna São Bernardo, 13°49'S 46°21'W, São Domingos, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella steindachneri* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Maues; Rio Madeira; Estado do Pará; Codajás; Santarém; rio Poti; Manacapuru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella taeniophora* (Regan, 1903)**

Localidade-tipo: Descalvado, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella taenioptera* Miranda Ribeiro, 1914**

Localidade-tipo: Tapirapuã, rio Sepotuba [Estado do Mato Grosso, Brasil].

Distribuição: Alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella transitoria* Miranda Ribeiro, 1907**

Localidade-tipo: Ribeirão do Alambari, Iporanga, Brasil.

Distribuição: Bacia do Ribeira do Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodella vittata* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Alto São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Eigenmann (1917a).

***Pimelodella witmeri* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Rio Jaguaribe, Orós, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jaguaribe.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhamdella eriarcha* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jacuí.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Lucena & Silva (1991), Malabarba (1989).

Observações: Considerada sinônimo sênior de *Rhamdella straminea* Cope e *Rhamdella lemai* Bertoletti por Malabarba (1989).

***Rhamdella exsudans* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro [?].

Distribuição: Estado do Rio de Janeiro [?].

Documentação primária: Bibliográfica.

***Rhamdella ignobilis* Steindachner, 1907**

Localidade-tipo: Rio Cubatão no Estado de Santa Catarina próximo a Teresópolis (Brasil).

Distribuição: Bacia do Cubatão, no Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdella jenynsii* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Estado do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhamdella longipinnis* Borodin, 1927**

Localidade-tipo: Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdella longiuscula* Lucena & Silva, 1991**

Localidade-tipo: Arroio Passo do Alto, próximo a localidade de Mineral, São Nicolau, aproximadamente 28°08'S 55°20'W,

Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Tributários da margem esquerda do médio Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdella papariae* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Lago Papari, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdella robinsoni* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: São José do Egito, Estado do Pernambuco, Brasil.

Distribuição: Rio Pajeú (afluente do baixo São Francisco).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdella wolffi* Fowler, 1941**

Localidade-tipo: Rio Choró, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdia enfurnada* Bichuette & Trajano, 2005**

Localidade-tipo: Gruta do Enfurnado, 13°38'44"S 44°12'05,9"W, bacia do médio São Francisco, povoado de Descoberto,

Serra do Ramalho, Município de Coribe, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhamdia foina* (Müller & Troschel in Schomburgk, 1848)**

Localidade-tipo: Porções rochosas no rio Tacutu.

Distribuição: Bacias dos rios Branco, Negro, Tocantins e Trombetas (afluentes do Amazonas).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Silfvergrip (1996).

***Rhamdia itacaiunas* Silfvergrip, 1996**

Localidade-tipo: Bacia do rio Tocantins, 'igarapé Repartimento', Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Médio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhamdia jequitinhonha* Silfvergrip, 1996**

Localidade-tipo: Rio Araçuaí, Santa Rita, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Rhamdia laukidi* Bleeker, 1858**

Localidade-tipo: Primeiro riacho do rio Casiquiare, ca. 5 minutos da confluência do rio Casiquiare e do lado esquerdo do rio Orinoco, Caño Caripo, ca. 3 km da desembocadura, 03°06'N 65°50'W, Estado do Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacia Amazônica.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Silfvegríp (1996).

Observações: Silfvegríp (1996) designou o neótipo.

***Rhamdia muelleri* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Brasil; Suriname; rio Capim; Estado do Pará; Pará; Suriname.

Distribuição: Bacia Amazônica, e rios Aripuanã (afluente do Madeira), Capim, Madeira, Negro, Solimões, Tocantins e Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Silfvegríp (1996).

***Rhamdia poeyi* Eigenmann & Eigenmann, 1888**

Localidade-tipo: Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Mamoré (afluente do Madeira) e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Silfvegríp (1996).

***Rhamdia quelen* (Quoy & Gaimard in Freycinet, 1824)**

Localidade-tipo: Margem direita do tributário do rio Samiria entre Caño Pastos e Hamburgo, Departamento Loreto, Peru.

Distribuição: Praticamente todas as bacias hidrográficas brasileiras.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 6905.

Referência: Silfvegríp (1996).

Observações: Silfvegríp (1996) designou o neótipo.

***Rhamdioglanis frenatus* Ihering, 1907**

Localidade-tipo: Riachos da Ilha de São Sebastião, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdioglanis transfasciatus* Miranda Ribeiro, 1908**

Localidade-tipo: Rio Betari.

Distribuição: Riachos costeiros do Estado do Rio de Janeiro ao Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Bockmann (1998).

***Rhamdiopsis microcephala* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Cursos superior dos rios Paraná e São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Bockmann (1998), Britski (2001).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Rhamdiopsis moreirai* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Serrinha, rio Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil.  
Distribuição: Curso superior dos rios Iguaçu e Ribeira de Iguape.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Bockmann (1998), Wosiacki & Cury (1990).  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

***Taunayia bifasciata* (Eigenmann & Norris, 1900)**

Localidade-tipo: São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Curso superior dos rios Paraíba do Sul e Tietê.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Oliveira & Britski (2000).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Observações: Considerada sinônimo sênior de *Taunayia marginata* Miranda-Ribeiro por Oliveira & Britski (2000).

**Família Pimelodidae**

Oscar Akio Shibatta &  
Flávio Alicino Bockmann

***Aguarunichthys inpai* Zuanon, Rapp Py-Daniel & Jégu, 1993**

Localidade-tipo: Brasil drenagem do rio Solimões, norte da ilha Marchantaria, cerca de 15 km acima de confluência com a drenagem do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Solimões (afluente do rio Amazonas).  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Aguarunichthys tocantinsensis* Zuanon, Rapp Py-Daniel & Jégu, 1993**

Localidade-tipo: Drenagem do rio Tocantins, corredeiras acima de Marabá, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia dos rios Juruá e Tocantins (afluentes do rio Amazonas).  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Silvano *et al.* (2001).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Pará.

***Bagropsis reinhardtii* Lütken, ex Reinhardt, 1874**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Curso superior da bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Britski *et al.* (1988), Burgess (1989).  
Estado de conservação: Deficiente de dados.

***Bergiaria westermanni* (Lütken, ex Reinhardt, 1874b)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Curso superior da bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Britski *et al.* (1988), Burgess (1989).

***Brachyplatystoma affine* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Desconhecida.  
Distribuição: Bacia do rio Araguaia (afluente do rio Amazonas).  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNHN A.9360.  
Referência: Castelnau (1855).



***Brachyplatystoma capapretum* Lundberg & Akama, 2005**

Localidade-tipo: Rio Tefé, praia arenosa, Lago Mucura, Supiã-Pucu, Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas, de Belém, Brasil, até Iquitos no Peru, e tributários, incluindo Trombetas, Madeira, Negro, Manacapuru, Purus, Tefé, Juruá, Jutai e Içá, e grandes lagos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lundberg & Akama (2005).

***Brachyplatystoma filamentosum* (Lichtenstein, 1819)**

Localidade-tipo: América do Sul, provavelmente Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MNHN A.8823).

Referências: Lichtenstein (1819), Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998).

Estado de conservação: Sobreexplotada ou ameaçada de sobreexploração.

***Brachyplatystoma flavicans* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Amazonas.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Santos *et al.* (1984), Barthem & Goulding (1997).

***Brachyplatystoma goeldii* Eigenmann & Bean, 1907**

Localidade-tipo: Rio Amazonas entre Estado do Pará e Manaus, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Brachyplatystoma juruense* (Boulenger, 1898)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Boulenger (1898b), Ferreira *et al.* (1998), Barthem & Goulding (1997).

***Brachyplatystoma paraense* Steindachner, 1909**

Localidade-tipo: Mercado de peixes do Pará.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: NMW 47590.

***Brachyplatystoma parnahybae* Steindachner, 1908**

Localidade-tipo: Rio Parnaíba, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Brachyplatystoma platynemum* Boulenger, 1898**

Localidade-tipo: Pará, Brasil.

Distribuição: Planície da bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998), Lundberg & Akama (2005).

***Brachyplatystoma rousseauxii* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNHN A.9457.

***Brachyplatystoma tigrinus* (Britski, 1981)**

Localidade-tipo: Cachoeira de Teotônio, Rio Madeira, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Ferreira *et al.* (1998), Lundberg & Akama (2005).

Observações: Britski (1981), baseado em identificação equivocada de *Brachyplatystoma juruensis* do baixo curso do rio Bobonaza, Equador (Orcés, 1976), mencionou que esta espécie talvez tenha ampla distribuição pela bacia do rio Amazonas.

***Brachyplatystoma vaillantii* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Caiena, Suriname.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 9476).

Referências: Kner (1858), Santos *et al.* (1984), Barthem & Goulding (1997).

Estado de conservação: Sobreexplotada ou ameaçada de sobreexploração.

***Calophysus macropterus* (Lichtenstein, 1819)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Ferreira *et al.* (1998), Silvano *et al.* (2001).

***Cheirocerus eques* Eigenmann, 1917**

Localidade-tipo: Villa Bella, San Antonio, Rio Mamoré [Bolívia].

Distribuição: Bacias dos rios Madeira, Purus e Napo.

Documentação primária: Lote de referência (FMNH 58257).

Referências: Stewart & Pavlik (1985), Silvano *et al.* (2001).

***Cheirocerus goeldii* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Rio Purus, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 30790).

Referência: Stewart & Pavlik (1985).

***Conorhynchos conirostris* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco [Brasil].

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britski *et al.* (1988), Burgess (1989).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Conorhynchos glaber* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio em Porto Seguro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Buranhém, no Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Duopalatinus emarginatus* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco [Brasil].

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britski *et al.* (1988), Burgess (1989).

***Duopalatinus peruanus* Eigenmann & Allen, 1942**

Localidade-tipo: Rio Puinagua, desembocadura do Rio Pacaya, bacia do Rio Ucayali, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 27612).

Referências: Fowler (1951b), Silvano *et al.* (2001), Burgess (1989).

***Exallodontus aguanai* Lundberg, Mago-Leccia & Nass, 1991**

Localidade-tipo: Rio Orinoco próximo a Los Castillos, 159 milhas a norte da bóia no fim do canal de navegação em Boca Grande, 8°32'N 62°23'W, 20-30 m, Território Federal Delta Amacuro, Venezuela.

Distribuição: Curso principal do rio Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 4450).

***Hemisorubim platyrhynchos* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Não estabelecida, provavelmente Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência.

Referências: Kner (1858), Britski *et al.* (1999), Ferreira *et al.* (1998).

***Hypophthalmus edentatus* Agassiz in Spix & Agassiz, 1829**

Localidade-tipo: Rio do Brasil equatorial.

Distribuição: Bacias do Amazonas e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Spix & Agassiz (1829), Oliveira (1981), Ferreira *et al.* (1998).

***Hypophthalmus fimbriatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Negro.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 32118).

Referências: Kner (1858), Oliveira (1981), Ferreira *et al.* (1998).

***Hypophthalmus marginatus* Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840**

Localidade-tipo: Caiena, Suriname.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 5530).

Referências: Oliveira (1981), Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998).

***Hypophthalmus oremaculatus* Nani & Fuster, 1947**

Localidade-tipo: Rio Paraná, Puerto Gaboto, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Iheringichthys labrosus* (Lütken, ex Kröyer, 1874a)**

Localidade-tipo: Rio da Prata.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 22721).

Referências: Boulenger (1898a), Britski *et al.* (1999), Burgess (1989).

***Iheringichthys megalops* Eigenmann & Ward in Eigenmann, McAtee & Ward, 1907**

Localidade-tipo: Bahia Negra, rio Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Leiarius marmoratus* (Gill, 1870)**

Localidade-tipo: Peru ou Equador, sistema do Amazonas, rio Marañon ou rio Napo.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 59951).  
Referências: Eigenmann & Eigenmann (1888), Ferreira *et al.* (1998).

***Leiarius pictus* (Müller & Troschel, 1849)**

Localidade-tipo: Não estabelecida.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (ZMB 2991).  
Referências: Kner (1858), Britski *et al.* (1999), Burgess (1989).

***Luciopimelodus pati* (Valenciennes in D'Orbigny, 1835)**

Localidade-tipo: Corrientes [Argentina].  
Distribuição: Bacias dos rios Paraná (baixo curso), Paraguai e Uruguai.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 40969).  
Referência: Britski *et al.* (1999).

***Megalonema platanus* (Günther, 1880)**

Localidade-tipo: [Rio] Paraná.  
Distribuição: Bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Eigenmann & Norris (1900), Britski *et al.* (1999), Bertoletti *et al.* (1989).

***Megalonema platycephalum* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Tumatumari [Guiana].  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Santos *et al.* (1984).

***Megalonema xanthum* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Girardot [Colômbia].  
Distribuição: Rio Madeira (afluente do Rio Amazonas).  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 57769).

***Parapimelodus nigribarbis* (Boulenger, 1889)**

Localidade-tipo: Rio Camaquã [sistema da Laguna dos Patos], Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Sistema da Laguna dos Patos.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Lucena *et al.* (1992).

***Parapimelodus valenciennis* (Lütken, ex Kröyer, 1874a)**

Localidade-tipo: Rio de La Plata, Argentina.  
Distribuição: Bacia dos rios Paraná (cursos médio e baixo), Paraguai, Prata e Uruguai.  
Documentação primária: Lote de referência (MCP 12510).  
Referências: Ihering (1898a), Lucena *et al.* (1992).

***Phractocephalus hemiliopterus* (Bloch & Schneider, 1801)**

Localidade-tipo: Rio Maranhão [Brasil].  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998).

***Pimelodina flavipinnis* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Amazonas nas proximidades do Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Stewart (1986), Ferreira *et al.* (1998).

***Pimelodus absconditus* Azpelicueta, 1995**

Localidade-tipo: San Javier, rio Uruguai, Misiones, Argentina.

Distribuição: Curso inferior da bacia do rio Paraná e bacia do Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 13341).

Referência: Vidal & Lucena (1999).

***Pimelodus albofasciatus* Mees, 1974**

Localidade-tipo: Sipalawini [Suriname].

Distribuição: Bacia do rio Arinos (bacia do rio Tapajós, bacia do rio Amazonas).

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 60425).

***Pimelodus altissimus* Eigenmann & Person in Eigenmann & Allen, 1942**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, próximo a Orellana [Peru].

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 57386).

Referência: Fowler (1951b).

***Pimelodus argenteus* Perugia, 1891**

Localidade-tipo: Rio da Prata, Rio Paraná.

Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 44403).

Referência: Britski *et al.* (1999).

Observações: Esta espécie carece de um novo nome, pois o nome está pré-ocupado por *Pimelodus argenteus* LaCepède, 1803.

***Pimelodus atrobrunneus* Vidal & Lucena, 1999**

Localidade-tipo: Rio Ligeiro na estrada entre Marcelino Ramos e Maximiliano de Almeida, Marcelino Ramos, 27°38'S 51°52'W, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Curso superior da bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodus blochii* Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 53747).

Referências: Santos *et al.* (1984), Silvano *et al.* (2001).

***Pimelodus fur* (Lütken, ex Reinhardt, 1874b)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, em riachos afluentes, pequenos lagos próximos, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios São Francisco, Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britski *et al.* (1988), Britski *et al.* (1999).

***Pimelodus heraldoi* Azpelicueta, 2001**

Localidade-tipo: Município de Pirassununga, bacia do rio Mogi-Guaçu em Emas, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Curso superior da bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodus jivaro* Eigenmann & Pearson in Eigenmann & Allen, 1942**

Localidade-tipo: Riacho, rio Morona [Peru].

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fowler (1951b).

***Pimelodus maculatus* LaCepède, 1803**

Localidade-tipo: No grande Rio da Prata [Argentina].

Distribuição: Bacias dos rios São Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (LIRP 3569).

Referências: Hensel (1870), Britski *et al.* (1988), Britski *et al.* (1999).

***Pimelodus microstoma* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Irisanga, rio Branco e Barra do rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro (afluente do bacia do rio Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodus mysteriosus* Azpelicueta, 1998**

Localidade-tipo: Candelaria, Arroio Anselmo, Misiones, Argentina.

Distribuição: Curso inferior do rio Paraná e bacia do rio Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 44403).

***Pimelodus ornatus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Suriname, rio Negro e Cujaba.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 36857).

Referências: Britski *et al.* (1999), Burgess (1989).

***Pimelodus ortmanni* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Porto União da Victoria, Rio Iguaçu, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Severi & Cordeiro (1994).

***Pimelodus paranaensis* Britski & Langeani, 1988**

Localidade-tipo: Ilha Solteira (ensecadeira), Rio Paraná, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Curso superior da bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodus pictus* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, [Rio] Javari [na fronteira entre o Brasil e o Peru].

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

***Pimelodus platicirris* Borodin, 1927**

Localidade-tipo: Salto de Pirassununga, Rio Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Mogi-Guaçu (afluente do curso superior do rio Paraná).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pimelodus spegazzinii* Perugia, 1891**

Localidade-tipo: Rio Durazno, [Uruguai].

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Fowler (1951b).

***Pinirampus pirinampu* (Agassiz in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Ferreira *et al.* (1998), Britski *et al.* (1999).

***Platynematchthys notatus* (Schomburgk in Jardine, 1841)**

Localidade-tipo: Forte São Joaquim no Rio Branco; Rio Negro.

Distribuição: Planícies da bacia do rio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998).

***Platysilurus barbatus* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: São Antonio de Rio Madeira, [Bolívia].

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 50528).

Referências: Ferreira *et al.* (1998), Silvano *et al.* (2001).

***Platystomatichthys mucosus* (Vaillant, 1880)**

Localidade-tipo: Caldéron (Alto Amazonas).

Distribuição: Curso superior da bacia do rio Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNHN A.1955.

Referência: Fowler (1951b).

***Platystomatichthys sturio* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Branco, [Brasil].

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Santos *et al.* (1984), Ferreira *et al.* (1998).

***Propimelodus eigenmanni* (Van der Stigchel, 1946)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Baixo curso do rio Amazonas e grandes tributários incluindo o Xingu, Jari, trombetas e baixo Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lundberg & Parisi (2002).

Observações: Identificado erroneamente como *Pimelodus altipinnis*.

***Pseudoplatystoma corruscans* (Agassiz in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco no Brasil central.

Distribuição: Bacias dos rios São Francisco, Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britski *et al.* (1988), Britski *et al.* (1999).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul, quase ameaçada no Estado do Paraná.

***Pseudoplatystoma fasciatum* (Linnaeus, 1766)**

Localidade-tipo: Brasil, Suriname.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, São Francisco (?), Paraná, Paraguai e Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 61983).

Referências: Ferreira *et al.* (1998), Britski *et al.* (1999).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Pseudoplatystoma tigrinum* (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 24900).

Referência: Ferreira *et al.* (1998).

***Sorubim elongatus* Littmann, Burr, Schmidt & Isern, 2001**

Localidade-tipo: Ulpa Caño, 50 m a montante da confluência com Caño Moena, drenagem do Rio Itaya, bacia do Rio Amazonas (aproximadamente 3°46'20"S 73°14'17"W), Província Maynas, Dept. Loreto, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 7012).

***Sorubim lima* (Bloch & Schneider, 1801)**

Localidade-tipo: Rio Maranhão, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Paraná, Paraíba e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Britski *et al.* (1999), Burgess (1989).

***Sorubim maniradii* Littmann, Burr & Buitrago-Suarez, 2001**

Localidade-tipo: Rio Yasuni, drenagem do Rio Napo, 0°59'06"S 75°25'36"W, Estado Napo, Equador.

Distribuição: Rio Amazonas e tributários, a montante de Manaus.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 7011).

***Sorubim trigonocephalus* Miranda Ribeiro, 1920**

Localidade-tipo: Porto Velho [Brasil].

Distribuição: Bacia do rio Madeira (afluente do rio Amazonas).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sorubimichthys planiceps* (Agassiz in Spix & Agassiz, 1829)**

Localidade-tipo: Rios do Brasil equatorial: Rio Solimões, Rio Amazonas e Rio Negro.

Distribuição: Planície da bacia do rio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Lundberg *et al.* (1989), Santos *et al.* (1984).

***Steidachneridion melanodermatum* Garavello, 2005**

Localidade-tipo: Rio Iguaçu, a jusante da barragem de Salto Osório, aprox. 25°35'S 53°05'W, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Steidachneridion puntatum* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Rio Uruguai, Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Garavello (2005).

***Steindachneridion amblyurus* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: [Rio] Jequitinhonha, [Brasil].

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Garavello (2005).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.



***Steindachneridion doceanum* (Eigenmann & Eigenmann, 1889)**

Localidade-tipo: Rio Doce, [Brasil].  
Distribuição: Bacia do Doce.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Garavello (2005).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.

***Steindachneridion parahybae* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba próximo a Juiz de Fora, Rio Jequitinhonha, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraíba do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Garavello (2005).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Provavelmente ameaçada no Estado de São Paulo, vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Steindachneridion scriptum* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, [Brasil].  
Distribuição: Bacias do alto Paraná e Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Bertolotti *et al.* (1989), Garavello (2005).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Rio Grande do Sul, vulnerável no Estado do Paraná.

***Zungaro jahu* (Ihering, 1898)**

Localidade-tipo: Rio Tietê, São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Paraná e Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Ihering (1898b), Lundberg & Litmann (2003), Souza Filho *et al.* (2003).  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de Minas Gerais, onde foi listada como "*Paulicea luetkeni* (Machado *et al.*, 1998)", vulnerável no Estado do Paraná.  
Observações: Considerada sinônimo de *Z. zungaro* e *Paulicea luetkeni* (Steindachner, 1877) até recentemente, esta espécie foi revalidada por Souza Filho *et al.* (2003).

***Zungaro zungaro* (Humboldt in Humboldt & Valenciennes, 1821)**

Localidade-tipo: Próximo a Tomependa, Rio Marañon, bacia do Rio Amazonas, Peru.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 23066).  
Referências: Silfvergrip (1992), Barthem & Goulding (1997).  
Estado de conservação: Sobreexplotada ou ameaçada de sobreexplotação.

**Família Doradidae**

Alberto Akama

***Acanthodoras cataphractus* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: América do Sul.  
Distribuição: Rio Amazonas e bacia do Essequibo.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Acanthodoras depressus* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Lago Aleixo, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas e Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Acanthodoras spinosissimus* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Coari, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Agamyxis pectinifrons* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Amblydoras affinis* (Kner, 1855)**

Localidade-tipo: Rios Brancos e Guaporé, Brasil.

Distribuição: Bacias do Branco, Guaporé e Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Amblydoras monitor* (Cope, 1872)**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Alto Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Anadoras regani* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Mercado de peixes em Belém do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Oiapoque.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Anadoras weddellii* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Chiquitos, Bolívia.

Distribuição: Bacias do alto Mamoré, Paraguai e Pilcomayo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Anduzedoras oxyrhynchus* (Vallenciennes, 1821)**

Localidade-tipo: Porção Oriental da América do Sul.

Distribuição: Alto rios Negro e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Astrodoras asterifrons* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Negro na barra do rio Guaporé.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Centrodoras brachiatus* (Cope, 1872)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas entre a boca do rio Negro (Brasil) e Huallaga (Peru).  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Centrodoras hasemani* (Steindachner, 1915)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Negro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Doradidae sp.***

Localidade-tipo: Nhecolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.  
Distribuição: Nhecolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo (MZUSP 41098).  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Doras carinatus* (Linnaeus, 1766)**

Localidade-tipo: Suriname.  
Distribuição: Baixo Amazonas, Essequibo e outras drenagens costeiras a oeste da boca do Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Doras eigenmanni* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Descalvados, Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Amazonas e Alto Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Doras fimbriatus* Kner, 1855**

Localidade-tipo: Rio Guaporé.  
Distribuição: Bacia do Guaporé.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Doras punctatus* Kner, 1853**

Localidade-tipo: Rio Guaporé.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Franciscodoras marmoratus* (Reinhardt, 1874)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Hassar affinis* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Rio Poti, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Parnaíba.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Hassar orestis* (Steindachner, 1875)**

Localidade-tipo: Rios Xingu e Içá, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Amazonas, Orinoco e Essequibo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Hassar wilderi* Kindle, 1895**

Localidade-tipo: Trocera, rio Tocantins, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Hemidoras morrisi* Eigenmann, 1925**

Localidade-tipo: Iquitos, Loreto, Peru.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Hemidoras stenopeltis* (Kner, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Kalyptodoras bahiensis* Higuchi, Britski & Garavelo, 1990**

Localidade-tipo: Rio Paraguaçu, abaixo da represa de Bananeiras, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Rio Paraguaçu, abaixo da represa de Bananeiras, Estado da Bahia, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).  
Estado de conservação: Em perigo.

***Leptodoras acipenserinus* (Günther, 1868)**

Localidade-tipo: Xeberos, Loreto, Peru.  
Distribuição: Cabeceiras andinas dos rios do oeste da bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Sabaj (2005).

***Leptodoras catanaí* Sabaj, 2005**

Localidade-tipo: Rio Sasiquire da foz do rio Pamoni a 4 Km a jusante da foz, oeste de Pamoni, 2°48'N 65°57'W, Amazonas, Venezuela.  
Distribuição: Bacias do alto Orinoco e alto Negro.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Sabaj (2005).  
Observações: Sabaj (2005) registra populações dubiamente identificadas ao longo de todo o Amazonas.

***Leptodoras copei* (Fernández-Yépez, 1968)**

Localidade-tipo: Lagoa ao lado do rio Capanaparo, Apure, Venezuela.  
Distribuição: Rio Amazonas, bacia do Negro e bacia do alto Orinoco.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Sabaj (2005).

***Leptodoras hasemani* (Steindachner, 1915)**

Localidade-tipo: Rio Branco, bacia do rio Negro, Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacias do médio Negro, incluindo a drenagem do Branco, e bacias do Orinoco e Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sabaj (2005).

***Leptodoras juruensis* Boulenger, 1898**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Calha principal da bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sabaj (2005).

***Leptodoras linnelli* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Rio Potaro, Tumatumari, Guiana.

Distribuição: Bacias do Essequibo, Demerara, Araguari, alto Orinoco e tributários da margem esquerda do baixo Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj (2005).

***Leptodoras praelongus* (Myers & Weitzman, 1956)**

Localidade-tipo: Cachoeira de São Gabriel, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas e bacia do alto Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sabaj (2005).

***Lithodoras dorsalis* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: América do Sul.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Megalodoras uranoscopus* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Lago Januari, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Nemadoras elongatus* (Boulenger, 1898)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Nemadoras hemipeltis* (Eigenmann, 1925)**

Localidade-tipo: Rio Ucayali em Contanama, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Nemadoras humeralis* (Kner, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Nemadoras leporhinus* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Potaro em Tumatumari e rio Essequibo em Crab Falls, Guiana.

Distribuição: Bacias do Branco, Essequibo e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Nemadoras trimaculatus* (Boulenger, 1898)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Opsodoras boulengeri* (Steindachner, 1915)**

Localidade-tipo: Boca do rio Negro, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Opsodoras morei* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Opsodoras stuebelli* (Steindachner, 1882)**

Localidade-tipo: Rio Huallaga, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Opsodoras ternetzi* Eigenmann, 1925**

Localidade-tipo: Mercado de peixes de Santarém (possivelmente do rio Tapajós).

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Oxydoras kneri* Bleeker, 1863**

Localidade-tipo: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná-Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Oxydoras niger* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: América do Sul Oriental.

Distribuição: Drenagens das Guianas e bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Physopyxis ananas* Sousa & Rapp Py-Daniel, 2005**

Localidade-tipo: Rio Jutai, 02°45'40"S 66°47'59"W, bacia do Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas e Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Physopyxis cristata* Sousa & Rapp Py-Daniel, 2005**

Localidade-tipo: Fóz do igarapé Zamula, rio Negro, 00°51'48"S 62°46'44"W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio rio Negro, na Amazônia central.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Physopyxis lyra* Cope, 1871**

Localidade-tipo: Rio Ampyiacu, [Peru].  
Distribuição: Bacia do Amazonas entre o rio Ampyiacu e o rio Uatumã, exceto na bacia do rio Negro.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Higuchi (1992), Sousa & Rapp Py-Daniel (2005).

***Platyodoras armatulus Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1840***

Localidade-tipo: Rio Paraná, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraná-Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Platyodoras costatus* Linnaeus, 1766**

Localidade-tipo: América do Sul.  
Distribuição: Bacias do Amazonas e Orinoco.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Pterodoras granulosus* (Valenciennes in Humboldt & Valenciennes, 1821)**

Localidade-tipo: Porção Oriental da América do Sul.  
Distribuição: Bacia do Paraná-Paraguai.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Pterodoras lentiginosus* (Eigenmann, 1917)**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Rhinodoras boehlkei* Glodek, Whitmire & Orcés, 1976**

Localidade-tipo: Rio Bobonazo, entre Montalvo e Chinchirato, Equador.  
Distribuição: Alto e Médio Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 86812).

***Rhinodoras dorbignyi* (Kner, 1855)**

Localidade-tipo: Rio da Prata.  
Distribuição: Sistema do Paraná-Paraguai.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Rhynchodoras woodsi* Glodek, 1976**

Localidade-tipo: Rio Bobonazo, entre Montalvo e Sarayacu, Equador.  
Distribuição: Alto e Médio Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 86815, 86816).

***Rhynchodoras xingui* Klausewitz & Rössel, 1961**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Brasil.

Distribuição: Bacia do Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Scorpiodoras heckelii* (Kner, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacias do Negro, Orinoco e Alto Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Trachydoras brevis* (Kner, 1853)**

Localidade-tipo: Barra do Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacias do Negro e Essequibo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Trachydoras microstomus* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Rockstone, Essequibo, Guiana.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Orinoco e Essequibo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Trachydoras nattereri* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Trachydoras paraguayensis* (Eigenman & Ward, 1907)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai em Corumbá, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná-Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

***Trachydoras steindachneri* (Perugia, 1897)**

Localidade-tipo: Rio Beni, Bolívia.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Sabaj & Ferraris (2003).

***Wertheimeria maculata* Steindachner, 1877**

Localidade-tipo: Rio Jequitinhonha, Brasil.

Distribuição: Bacia do Jequitinhonha.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Higuchi (1992), Sabaj & Ferraris (2003).

**Família Auchenipteridae**

Alberto Akama & Luisa M. Sarmento-  
Soares



***Ageneiosus atronasus* Eigenmann & Eigenmann, 1888**

Localidade-tipo: América do Sul (localidade desconhecida).  
Distribuição: Bacia do médio e alto Amazonas, incluindo rios Ucayali, Mamoré e Solimões.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus brevis* Steindachner, 1881**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em Coari, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto Amazonas, no Peru, Bolívia e rio Solimões.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus marmoratus* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Riacho abaixo de "Potaro Landing", Guiana.  
Distribuição: Rios Essequibo e Corantijn, Suriname, alto Amazonas no Peru e médio Paraná, Argentina.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus militaris* Valenciennes, 1836**

Localidade-tipo: Desconhecida.  
Distribuição: Bacia do rio da Prata.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Ferraris (2003).

***Ageneiosus piperatus* (Eigenmann, 1912)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Crab falls, Guiana.  
Distribuição: Bacia do rio Essequibo e alto Negro próximo a confluência do rio Branco.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus polysticus* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Boca do rio Negro.  
Distribuição: Bacia do rio Negro e baixo rio Branco.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus ucayalensis* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Lago marginal ao rio Ucayali.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Orinoco; Guianas e drenagens do Atlântico na porção nordeste da América do Sul.  
Também nos sistemas dos rios Tapajós e alto Paraná.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus vittatus* Steindachner, 1908**

Localidade-tipo: Rio Purus.  
Distribuição: Bacias do médio Orinoco e do alto Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referências: Walsh (1990), Ferraris (2003).

***Ageneiosus sp. 1***

Distribuição: Médio e Baixo Amazonas, Brasil.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Walsh (1990).

***Asterophysus batrachus* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Marabitanos, Brasil.

Distribuição: Marabitanos, Estado do Pará, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Burgess (1989).

***Auchenipterichthys coracoideus* (Eigenmann & Allen, 1942)**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.

Distribuição: Bacias do Tocantins, trechos central e superior da bacia do Amazonas, e bacia do Essequibo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ferraris *et al.* (2005).

***Auchenipterichthys longimanus* (Günther, 1864)**

Localidade-tipo: Rio Capim, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Orenoco, na Venezuela, baixo e médios trechos do Amazonas e Tocantins no Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ferraris *et al.* (2005).

***Auchenipterichthys punctatus* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Provavelmente Brasil.

Distribuição: Trecho superior da bacia do Orenoco e rio Negro, na Venezuela, e região central da bacia do Amazônica no Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Soares-Porto (1994), Royero & Hureau (1996), Ferraris *et al.* (2005).

***Auchenipterichthys thoracatus* (Kner, 1857)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Trecho superior da bacia do Madeira, na Bolívia e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ferraris *et al.* (2005).

***Auchenipterus ambyiacus* Fowler, 1915**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Equador (atualmente Peru).

Distribuição: Porções centrais e orientais da bacia do Amazonas e rio Orinoco e rios costeiros do norte da Guiana.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ferraris & Vari (1999).

***Auchenipterus brachyurus* (Cope, 1878)**

Localidade-tipo: Amazônia Peruana.

Distribuição: Porção Oriental da Amazônia, incluindo os rios Ucayali, Napo e alto Madeira.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ferraris & Vari (1999).

***Auchenipterus britskii* Ferraris & Vari, 1999**

Localidade-tipo: Lago Janauacá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Médio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Auchenipterus dentatus* Valenciennes, 1840**

Localidade-tipo: Cayenne [=Paramaribo, Suriname].

Distribuição: Suriname (rio Corantijn) e Guiana Francesa (rios Arataye, Sinnamary e Oiapoque).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Ferraris & Vari (1999), Ferraris (2003).

Observações: Ferraris & Vari (1999) informam que a localidade tipo é imprecisa e que o exemplar tipo é membro de uma espécie amplamente distribuída do Suriname à Guiana Francesa.

***Auchenipterus fordicei* Eigenmann & Eigenmann, 1888**

Localidade-tipo: Coari, Brasil.

Distribuição: Lago do Coari e rio Quixito, afluente do Javari.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ferraris & Vari (1999).

***Auchenipterus menesezi* Ferraris & Vari, 1999**

Localidade-tipo: Lago do Viana, rio Pindaré Mirim, Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Rios Parnaíba e Pindaré Mirim.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Auchenipterus nigripinnis* (Boulenger, 1895)**

Localidade-tipo: Paraguai.

Distribuição: Bacia dos rios Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ferraris & Vari (1999).

***Auchenipterus nuchalis* (Spix, 1829)**

Localidade-tipo: Rio Capim, Estado do Pará, Brasil [Neótipo].

Distribuição: Baixo Amazonas, baixo Tocantins, rio Capim e rios costeiros do Suriname e Guiana Francesa.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ferraris & Vari (1999).

Observações: Neótipo designado em Ferraris & Vari (1999).

***Auchenipterus osteomystax* (Miranda Ribeiro, 1920)**

Localidade-tipo: Alto Paraguai, rio da Prata, Argentina.

Distribuição: Bacia do Prata, rio Tocantins e afluentes ocidentais do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ferraris & Vari (1999).

***Centromochlus existimatus* Mees, 1974**

Localidade-tipo: Porto de Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e drenagens do Mamoré (Bolívia) e Ucayali (Peru).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Soares-Porto (1998).

***Centromochlus heckelii* (Filippi, 1853)**

Localidade-tipo: Rio Napo, Equador.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 979).

Referências: Mees (1974), Soares-Porto (1998).

***Centromochlus macracanthus* Soares-Porto, 2000**

Localidade-tipo: Rio Negro, São Pedro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Negro, bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Centromochlus perugiae* Steindachner, 1883**

Localidade-tipo: Canelos, Equador.

Distribuição: Alto Amazonas e tributários, bacia do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 31880).

Referência: Soares-Porto (1998).

***Centromochlus punctatus* (Mees, 1974)**

Localidade-tipo: Riachos entre Kabel e Lombé, Suriname.

Distribuição: Bacias do Tapanahoni, Gran rio e bacias de menor porte no Suriname; rio Paru de Oeste (próximo a fronteira com o Suriname), bacia do Amazonas, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (RMNH 26494, parátipos).

Referência: Soares-Porto (1998).

***Centromochlus schultzi* Rössel, 1962**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Tocantins e Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Soares-Porto (1998).

***Entomocorus melaphareus* Akama & Ferraris, Jr., 2003**

Localidade-tipo: Costa do Curá, margem esquerda do Rio Amazonas, 2°13'46,2"S 54°01'27,6"W, Monte Alegre, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Amazonas a jusante de Manaus.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Epapterus dispilurus* Cope, 1878**

Localidade-tipo: Amazônia peruana.

Distribuição: Porções centrais e orientais da da bacia do Amazonas e rio Paraguai no nordeste da Argentina e sul do Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Vari & Ferraris (1998).

***Gelanoglanis nanonotilocus* Soares-Porto, Walsh, Nico & Netto, 1999**

Localidade-tipo: Rio Asisa, drenagem do rio Orinoco, Venezuela.

Distribuição: Bacia do rio Orinoco, na Venezuela e bacia do Amazonas, no Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 28308, parátipos).

***Glanidium albescens* Lütken, 1874**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Hollanda Carvalho & Weber (2004).

***Glanidium bockmanni* Sarmiento-Soares & Buckup, 2005**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, a jusante de Três Marias, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glanidium catharinensis* Miranda Ribeiro, 1962**

Localidade-tipo: Rio do Braço do Norte, São Ludgero, Tubarão, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glanidium cesarpintoi* von Ihering, 1928**

Localidade-tipo: Cachoeira das Emas, rio Mogi-Guassu, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná e bacias litorâneas do Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Glanidium melanopterum* Miranda Ribeiro, 1918**

Localidade-tipo: Piquete, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná e bacias litorâneas do Estado do Rio de Janeiro ao Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Deficiente de dados no Estado do Paraná.

***Glanidium ribeiroi* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Porto União da Vitória, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná, nos Estados do Paraná e de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Liosomadoras oncinus* (Schomburgk, 1841)**

Localidade-tipo: Rio Padauri, Suriname.

Distribuição: Brasil, Peru, Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Mees (1978), Burgess (1989).

***Pseudauchenipterus affinis* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rios Mucuri e São Mateus, Brasil.

Distribuição: Rio Doce (Estado do Espírito Santo) ao rio Jucuruçú (sul do Estado da Bahia).

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Akama (1999).

***Pseudauchenipterus flavescens* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Akama (1999).

***Pseudauchenipterus jequitinhonhae* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Rio Jequitinhonha e rio Canavieiras, Brasil.

Distribuição: Rio Jequitinhonha e rio Canavieiras.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Akama (1999).

***Pseudauchenipterus nodosus* (Bloch, 1794)**

Localidade-tipo: "Tranquebar" [localidade na América do Sul].

Distribuição: Rios costeiros da Venezuela ao Estado do Maranhão, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Akama (1999).

***Pseudepapterus cucuhyensis* Böhlke, 1951**

Localidade-tipo: Banco de areia em Cucuhy, lado colombiano do rio Negro, Colômbia.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ferraris (1988b).

***Pseudepapterus hasemani* Steindachner, 1915**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Pseudotatia parva* Mees, 1974**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, em Juazeiro, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Tatia aulopygia* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado de Rondônia, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Mees (1974), Soares-Porto (1998).

***Tatia boemia* Koch & Reis, 1996**

Localidade-tipo: Rio Pelotas na estrada Anita Garibaldi a Pinhal da Serra, Esmeralda, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Soares-Porto (1998).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Tatia brunnea* Mees, 1974**

Localidade-tipo: Riacho Compagnie, Suriname.  
Distribuição: Suriname e Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 81139).  
Referência: Soares-Porto (1998).

***Tatia creutzbergi* (Boeseman, 1953)**

Localidade-tipo: Riacho Djai, Suriname.  
Distribuição: Bacias do rio Nickerie, rio Corantine e bacias de menor porte no Suriname e na bacia do Amazonas, no Brasil e Colômbia.  
Documentação primária: Lote de referência (MCZ 8182).  
Referências: Mees (1974), Soares-Porto (1998).

***Tatia intermedia* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Marabitanos, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacias do Amazonas e bacias menores no leste do Estado do Pará.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 44255).  
Referências: Mees (1974), Soares-Porto (1998).

***Tatia musaica* (Royero, 1992)**

Localidade-tipo: Rio Atabapo, Venezuela.  
Distribuição: Bacia do rio Orinoco, na Venezuela e bacia do Amazonas, no Brasil.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 9347).

***Tatia neivai* (von Ihering, 1930)**

Localidade-tipo: Piquete, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Paraná e Paraguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Mees (1974), Soares-Porto (1998).

***Tatia simplex* (Mees, 1974)**

Localidade-tipo: Rio das Mortes, Xaventina, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia dos rios Tocantins e Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Tatia strigata* Soares-Porto, 1995**

Localidade-tipo: Igarapé Limãozinho, Maués, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e drenagem do rio Cassiquiare, bacia do Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Soares-Porto (1998).

***Tetranematichthys quadrifilis* Kner, 1858**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Bacia do Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Vari & Ferraris Jr. (2006).

***Tetranematichthys wallacei* Vari & Ferraris Jr., 2006**

Localidade-tipo: Desembocadura do rio Ibará, aproximadamente 0°15'S 66°46'W, São Pedro, alto Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Amplamente distribuído pelas bacias Amazonica, sudoeste do Orinoco e baixo Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Tocantinsia piresi* (Miranda Ribeiro, 1920)**

Localidade-tipo: Rio São Manoel, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio São Manoel, Estado do Mato Grosso e rio Tocantins, Estado do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mees (1984).

***Trachelyopterichthys taeniatus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ferraris & Fernandez (1987).

***Trachelyopterus albicrux* (Berg, 1901)**

Localidade-tipo: Rio da Prata, próximo à boca do rio Santiago, Argentina.

Distribuição: Bacia do Paraná e Prata, na Argentina e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus analis* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Lago Arari, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus ceratophysus* (Kner, 1858)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé; rio Branco; rio Negro.

Distribuição: Rio Guaporé, rio Branco e rio Negro, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus cratensis* (Miranda Ribeiro, 1937)**

Localidade-tipo: Rio Grangeiro, Crato, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Rio Grangeiro, Estado do Ceará, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus galeatus* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: America australi.

Distribuição: Norte da América do Sul, incluindo as bacias do Orinoco, Amazonas, do Prata; leste da América do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus lacustris* (Lütken, 1874)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas e lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Lagoa Santa e rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus leopardinus* (Borodin, 1927)**

Localidade-tipo: Rio São Francisco, Pirapora, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio São Francisco, Pirapora, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus lucenai* Bertoletti, da Silva & Pereira, 1995**

Localidade-tipo: Rio Jacuí no Saco do Quilombo, aprox. 29°58'S 51°15'W, Ilha das Flores, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Jacuí no Saco do Quilombo, aprox. 29°58'S, 51°15'W, Ilha das Flores, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trachelyopterus porosus* (Eigenmann & Eigenmann, 1888)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachelyopterus striatulus* (Steindachner, 1876)**

Localidade-tipo: Rio Paraíba; rio Doce; rio Mucuri [Sudeste do Brasil].

Distribuição: Rio Paraíba em Campos, rio Doce em Linhares, e rio Mucuri, Sudeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Mees (1974), Ferraris (1988b).

***Trachycorystes trachycorystes* (Valenciennes, 1840)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Mees (1974).

**Ordem Gymnotiformes**



## Família Gymnotidae

Ricardo Campos-da-Paz &  
Paulo A. Buckup

### ***Electrophorus electricus* (Linnaeus, 1766)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacias do Amazonas, do Orinoco e áreas no norte da América do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 12183.

Referência: Campos-da-Paz (2003).

### ***Gymnotus arapaima* Albert & Crampton, 2001**

Localidade-tipo: Paraná Apara, 10 Km NW da confluência dos rios Juruá e Solimões, Reserva Mamirauá, 3°02'S 64°51'W, Brasil.

Distribuição: Bacia do Solimões, na região de Tefé.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Gymnotus bahianus* Campos-da-Paz & Costa, 1996**

Localidade-tipo: Fazenda Almada, Ilhéus, aproximadamente 14°49'S 39°02'W, bacia do rio Almada, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida da localidade tipo e áreas adjacentes no Estado da Bahia, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

### ***Gymnotus carapo* Linnaeus, 1758**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Norte da América do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 38260.

Referência: Albert & Crampton (2003).

### ***Gymnotus cataniapo* Mago-Leccia, 1994**

Localidade-tipo: San Carlos de Rio Negro, lagoa a NE do aeroporto de San Carlos de Rio Negro, 1°55'N 67°02'W, Território Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Amazonas, do Orinoco e Suriname.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 23063.

### ***Gymnotus coatesi* LaMonte, 1935**

Localidade-tipo: Cercanias da foz do rio Curuá Una no rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Campos-da-Paz (2000).

### ***Gymnotus coropinae* Hoedeman, 1962**

Localidade-tipo: Coropina creek, Suriname.

Distribuição: Bacias hidrográficas no Escudo das Guiana, bacia Amazônica e do rio Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 9809.

Referência: Crampton & Albert (2003).

### ***Gymnotus curupira* Crampton, Thorsen & Albert, 2005**

Localidade-tipo: Local alagado em área de terra firme, 500 m a oeste de Estrada Agrovila, igarapé Curupira, lago Tefé, bacia do rio Tefé, Município de Tefé, Estado do Amazonas (3°26'01"S, 64°43'47"W).

Distribuição: Encontrada em áreas de terra firme e várzeas no rio Tefé, Amazonas, Brasil e no alto Amazonas, Napo e Putumayo no Peru.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Crampton *et al.* (2005).

***Gymnotus diamantinensis* Campos-da-Paz, 2002**

Localidade-tipo: Riacho 1 tributário do rio Preto (alto rio Arinos, bacia do Tapajós), na estrada para São Francisco, Município de Diamantino, aproximadamente 14°20'S 46°30'W, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: cabeceiras do rio Arinos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus inaequilabius* (Valenciennes, 1839)**

Localidade-tipo: Não indicada na descrição original; mencionada posteriormente por vários autores como sendo "rio de La Plata, Buenos Aires, Argentina".

Distribuição: Bacia dos rios Paraguai, Paraná e áreas adjacentes.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 25084.

Referência: Albert & Crampton (2003).

***Gymnotus javari* Albert, Crampton & Hagedorn, 2003**

Localidade-tipo: Quebrada Caraná, próximo a Buen Sucesso, Río Yavari (Río Javari), 4°22'S 70°31'W, Departamento Loreto, Peru.

Distribuição: Amazônia Ocidental, rio Amazonas e porções baixas dos rios Napo, Javari e Ucayali.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCZ 60005.

Referência: Albert & Crampton (2003).

***Gymnotus jonasii* Albert & Crampton, 2001**

Localidade-tipo: Cano do Lago Rato, Reserva Mamirauá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Sistema do Lago Mamirauá, próximo a Tefé, Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus mamiraua* Albert & Crampton, 2001**

Localidade-tipo: Cano do Lago Rato, Reserva Mamirauá, 3°02'36"S 64°51'02"W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Planície de inundação do rio Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus melanopleura* Albert & Crampton, 2001**

Localidade-tipo: Cano do Lago Rato, Reserva Mamirauá, 3°02'36"S 64°51'02"W, Brasil.

Distribuição: Bacia do Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus obscurus* Crampton, Thorsen & Albert, 2005**

Localidade-tipo: Cano do lago Mamirauá, na Comunidade Boca do Mamirauá, 3°06'37"S 64°47'49"W, Reserva Mamirauá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Área da Reserva Mamirauá, próximo a Tefé, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Crampton *et al.* (2005).

***Gymnotus onca* Albert & Crampton, 2001**

Localidade-tipo: Cano do Lago Rato, Reserva Mamirauá, 3°02'36"S 64°51'02"W, Brasil.

Distribuição: Sistema do Lago Mamirauá, próximo a Tefé, Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus pantanal* Fernandes *et al.*, 2005**

Localidade-tipo: Rio Miranda, próximo a Miranda, 20°11'78"S 56°30'13"W, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná-Paraguai, no Brasil, e bacia do Chapare-Mamoré, na Bolívia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus pantherinus* (Steindachner, 1908)**

Localidade-tipo: Santos, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do leste e sudeste do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Campos-da-Paz (1997).

***Gymnotus paraguensis* Albert & Crampton, 2003**

Localidade-tipo: Arroyo Tembey, em Itapua, 7,4 km a sudoeste de San Rafael, drenagem do rio Paraguai, 26°35'S 55°34'W, Paraguai.  
Distribuição: Bacia do rio Paraguai, nas sub-bacias dos rios Itapua (Paraguai) e Nueva (Brasil).  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: FMNH 108546.  
Referência: Albert & Crampton (2003).

***Gymnotus pedanopterus* Mago-Leccia, 1994**

Localidade-tipo: Caño Tremblador, na estrada de San Carlos de Rio Negro a Solano, porção superior do rio, 1°48'N, 67°00'W, Território Amazonas, Venezuela.  
Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 15907.

***Gymnotus sylvius* Albert & Fernandes-Matioli, 1999**

Localidade-tipo: Rio Ribeira de Iguape, próximo a Miracatu, aproximadamente 24°32'50"S 47°26'13"W, Estado de São Paulo, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Ribeira de Iguape, Paraíba do Sul, e Pardo, todos no sudeste do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnotus tigre* Albert & Crampton, 2003**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, próximo a Letícia, Colômbia.  
Distribuição: Bacias hidrográficas dos rios Amazonas, Pastaza (Equador) e Tapajós (Brasil).  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 6814.  
Referência: Albert & Crampton (2003).

***Gymnotus varzea* Crampton, Thorsen & Albert, 2005**

Localidade-tipo: Ressaca da Vila Alencar, Reserva Mamirauá, Município de Alvarães, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Cercanias de Tefé (Estado do Amazonas) e Amazônia Peruviana.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Crampton *et al.* (2005).

**Família Sternopygidae**

Ricardo Campos-da-Paz

***Archolaemus blax* Korringa, 1970**

Localidade-tipo: Porto Nacional, bacia do rio Tocantins, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Distocyclus conirostris* (Eigenmann & Allen, 1942)**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.  
Distribuição: Bacias do Amazonas e do Orinoco.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 26287.

***Eigenmannia limbata* (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903)**

Localidade-tipo: Amazonas, Brasil (possivelmente na bacia do rio Purus).

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo (MNRJ 1186).

***Eigenmannia microstoma* (Reinhardt, 1852)**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, bacia do rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo (MZUSP 39472).

Referência: Campos-da-Paz (1997).

***Eigenmannia trilineata* López & Castello, 1966**

Localidade-tipo: Rio de La Plata, próximo a Nuñez, Argentina.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 38169.

Referência: Campos-da-Paz (1997).

***Eigenmannia vicentespelaea* Triques, 1996**

Localidade-tipo: Gruta São Vicente, sistema do rio São Vicente, bacia do alto rio Tocantins, São Domingos, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Eigenmannia virescens* (Valenciennes, 1836)**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacias dos rios Paraná e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 44386.

Referência: Campos-da-Paz (1997).

***Rhabdolichops caviceps* (Fernández-Yépez, 1968)**

Localidade-tipo: Rio Apure Seco, Estado Apure, Venezuela.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 12187.

Referência: Lundberg & Mago-Leccia (1986).

***Rhabdolichops eastwardi* Lundberg & Mago-Leccia, 1986**

Localidade-tipo: Canal ao sul de Isla Portuguesa, Delta Amacuro, Venezuela.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 4531.

***Rhabdolichops electrogrammus* Lundberg & Mago-Leccia, 1986**

Localidade-tipo: Rio Orinoco (canal principal), ao norte de Isla Tres Caños, Delta Amacuro, Venezuela.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 29949.

***Rhabdolichops lundbergi* Correa et al., 2006**

Localidade-tipo: Rio Japurá, próximo a Boca do Lago Mamirauá, 03°07,67'S 64°46,43'W, Município de Alvarães, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Região da confluência dos rios Japurá e Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhabdolichops navalha* Correa et al., 2006**

Localidade-tipo: Rio Tefé, Toco Preto, Município de Tefé, 03°47,31'S 64°59,91'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Conhecido apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhabdolichops nigrimans* Correa et al., 2006**

Localidade-tipo: Rio Tefé, Município de Tefé, 03°43,41'S 64°59,93'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Drenagens do Tefé e baixo rio Negro, na bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhabdolichops stewarti* Lundberg & Mago-Leccia, 1986**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, 26km a leste de Jacareacanga, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rhabdolichops troscheli* (Kaup, 1856)**

Localidade-tipo: Na descrição original, "British Guiana"; o correto, porém, talvez seja "tributário do alto rio Branco, próximo à fronteira Brasil-Guiana".

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 6981.

Referência: Lundberg & Mago-Leccia (1986).

***Sternopygus astrabes* Mago-Leccia, 1994**

Localidade-tipo: Caño Pozo Azul, Agua Linda, aproximadamente 23 km a nordeste de Puerto Ayacucho, tributário do rio Orinoco, Estado Amazonas, Venezuela, 5°51'N 67°31'W.

Distribuição: Bacias do Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 9981.

Referência: Albert (2003).

***Sternopygus branco* Crampton, Hulen & Albert, 2004**

Localidade-tipo: Confluência dos rios Solimões (Amazonas) e Japurá, Comunidade Caborini, Município de Alvarães, Estado do Amazonas, Brasil, 3°09'08"S, 64°47'04"W.

Distribuição: Rios Amazonas e Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternopygus castroi* Triques, 2000**

Localidade-tipo: Igarapé Jaradá, tributário da margem direita do rio Cuieiras, cerca de 40 km acima de sua foz no rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Cuieiras.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternopygus macrurus* (Bloch & Schneider, 1801)**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Bacias do Orinoco, do Amazônas, do Paraná-Paraguai e do São Francisco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 24476.

Referências: Mago-Leccia (1994), Bertaco & Cardoso (2004).

***Sternopygus obtusirostris* Steindachner, 1881**

Localidade-tipo: Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas, entre Tefé e Óbidos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Crampton *et al.* (2004a).

Observações: Lectótipo designado por Crapton *et al.*, (2004).

***Sternopygus xingu* Albert & Fink, 1996**

Localidade-tipo: Tributário do rio Batovi, na aldeia Waura ("Sta. X"), bacia do rio Xingu, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Rhamphichthyidae**

Ricardo Campos-da-Paz

***Gymnorhamphichthys hypostomus* Ellis, 1912**

Localidade-tipo: Rio Mamoré em San Joaquim, Bolívia.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 27701.

Referência: Campos-da-Paz (1997).

***Gymnorhamphichthys rondoni* (Miranda Ribeiro, 1920)**

Localidade-tipo: Rio Dezessete de Fevereiro, afluente da porção superior do rio Cautário, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Miranda Ribeiro (1920).

***Gymnorhamphichthys rosamariae* Schwassmann, 1989**

Localidade-tipo: Rio Negro em Rosa Maria, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Schwassmann (1989).

***Iracema caiana* Triques, 1996**

Localidade-tipo: Rio Jauaperi, cerca de 40-50 km acima de sua foz no rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Jauaperi, cerca de 40-50 km acima de sua foz no rio Negro (Estado do Amazonas), Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo (MZUSP 8952).

Referência: Triques (1996).

***Rhamphichthys atlanticus* Triques, 1999**

Localidade-tipo: Lago Viana, sistema dos rios Pindaré-Mearim, Estado do Maranhão, Brasil.

Distribuição: Lago Viana, sistema dos rios Pindaré-Mearim (Estado do Maranhão), Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Triques (1999).

***Rhamphichthys drepanium* Triques, 1999**

Localidade-tipo: Lago Janauari, na confluência dos rios Negro e Solimões, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: No Brasil, confluência dos rios Negro e Solimões, foz do rio Japurá; na Venezuela, Rio Apure, caño Paloma e sua desembocadura no Río Orinoco e El Amacen; na Colômbia, rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Triques (1999).

***Rhamphichthys hahni* (Meinken, 1937)**

Localidade-tipo: Rio Paraná, próximo a Corrientes, Argentina.

Distribuição: Porção inferior do sistema do rio Paraná e bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 44062.

Referência: Campos-da-Paz (1997).

***Rhamphichthys longior* Triques, 1999**

Localidade-tipo: Lago Paru, formado na confluência dos rios Trombetas e Paru do Oeste, em Oriximiná, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Lago Paru, formado na confluência dos rios Trombetas e Paru do Oeste, em Oriximiná, (Estado do Pará), Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Triques (1999).

***Rhamphichthys marmoratus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: Araguaia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Castelnau (1855).

**Família Hypopomidae**

Ricardo Campos-da-Paz

***Brachyhypopomus beebei* (Schultz, 1944)**

Localidade-tipo: Caripito, Estado Monagas, Venezuela.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 21982.

Referência: Sullivan (1997).

***Brachyhypopomus brevirostris* (Steindachner, 1868)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Sullivan (1997).

***Brachyhypopomus janeiroensis* (Costa & Campos-da-Paz, 1992)**

Localidade-tipo: Córrego Salto d'Água, afluente do rio São João, Município de Silva Jardim (Estado do Rio de Janeiro), Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do leste do Brasil, entre os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa & Campos-da-Paz (1992).

***Brachyhypopomus jureiae* Triques & Khamis, 2003**

Localidade-tipo: Rio do Descalvado, tributário do rio Una do Prelado, Estação Ecológica da Juréia, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Triques & Khamis (2003).

***Brachyhypopomus pinnicaudatus* (Hopkins, Comfort, Bastian & Bass, 1990)**

Localidade-tipo: Grand Prispris, pântano à cerca de 100 m ao norte da velha Route Nationale #1, velha Kourou, Guiana Francesa.

Distribuição: Norte da América do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 12175.

Referência: Hopkins *et al.* (1990).

***Hypopomus artedi* (Kaup, 1856)**

Localidade-tipo: Rio Mona, Guiana Francesa.  
Distribuição: Norte da América do Sul.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: INPA 9713.  
Referência: Sullivan (1997).

***Hypopygus lepturus* Hoedeman, 1962**

Localidade-tipo: Bacia do rio Maroni, Suriname.  
Distribuição: Norte da América do Sul e bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 23218.  
Referência: Mago-Leccia (1994).

***Microsternarchus bilineatus* Fernández-Yépez, 1968**

Localidade-tipo: Rio San José, afluente do Rio Guariquito, sudoeste de Calabozo, Venezuela.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MZUSP 23239.  
Referência: Sullivan (1997).

***Steatogenys duidae* (LaMonte, 1929)**

Localidade-tipo: Córrego "Burned Mountain", Monte Duida, drenagem do rio Orinoco, Venezuela.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.  
Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MPEG HOS 817.  
Referência: Schwassmann (1984).

***Steatogenys elegans* (Steindachner, 1880)**

Localidade-tipo: Lagos de várzea do rio Solimões, próximo a Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Amazonas e Orinoco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Schwassmann (1984).

***Steatogenys ocellatus* Crampton, Thorsen & Albert, 2004**

Localidade-tipo: Boca do rio Baré, lago Amanã, bacia do Japurá, Município de Maraã, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Lago Amanã (bacia do Amazonas), lago Tefé e rio Itaya (Peru).  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Crampton *et al.* (2004b).

***Stegostenopus cryptogenes* Triques, 1997**

Localidade-tipo: Igarapé Sirinau, margem direita do rio Cuieiras, cerca de 25 km da boca do rio Negro, 2°70'S 60°40' W, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

**Família Apterontidae**

Mauro Luis Triques

***Adontosternarchus balaenops* (Cope, 1878)**

Localidade-tipo: Pebas, abaixo da desembocadura do rio Napo, Peru.  
Distribuição: Bacia do Amazonas, até 200 m de altitude.  
Documentação primária: bibliográfica.  
Referência: Mago-Leccia *et al.* (1985).



***Adontosternarchus clarkae* Mago-Leccia, Lundberg & Baskin, 1985**

Localidade-tipo: Rio Negro, território Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: bibliográfica.

***Adontosternarchus sachsii* (Peters, 1877)**

Localidade-tipo: San Fernando de Apure, Venezuela.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: bibliográfica.

Referência: Ellis (1913).

***Apteronotus albifrons* (Linnaeus, 1766)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Tocantins e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann & Eigenmann (1891).

Observações: Provavelmente constitui um complexo de espécies.

***Apteronotus bonapartii* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Ucayali, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ellis (1913).

Observações: Provável sinônimo sênior de *A. anas* e *A. hasemani*.

***Apteronotus brasiliensis* (Reinhardt, 1852)**

Localidade-tipo: Rio das Velhas, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios São Francisco e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apteronotus caudimaculosus* Santana, 2003**

Localidade-tipo: Brejo de Santa Sofia, 19°26,64S 56°24,87"W, rio Novo, Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Pantanal Matogrossense.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apteronotus macrolepis* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Lago Manacapuru e Barra do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Como sinônimo júnior de *A. bonapartii* em Mago-Leccia (1994).

***Magosternarchus duccis* Lundberg, Cox Fernandes & Albert, 1996**

Localidade-tipo: Rio Branco, 1°17'S 61°51'W, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Magosternarchus raptor* Lundberg, Cox Fernandes & Albert, 1996**

Localidade-tipo: Rio Solimões, 3°36'S 61°21'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Megadontognathus kaitukaensis* Campos-da-Paz, 1999**

Localidade-tipo: Cachoeiras de Caitucá, rio Xingu, 5°15'S, 52°50'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Oedemognathus exodon* Myers, 1936**

Localidade-tipo: Rio Ampiyacu, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Lundberg *et al.* (2000).

Observações: Como sinônimo júnior de *Sternarchogiton nattereri* em Lundberg *et al.* (2000) cujos machos adultos seriam formas aberrantes.

***Orthosternarchus tamandua* (Boulenger, 1898)**

Localidade-tipo: Rio Juruá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Platyurosternarchus macrostomus* (Günther, 1870)**

Localidade-tipo: Xeberos, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: bibliográfica.

Referência: Triques (1998).

***Porotergus gimbeli* Ellis, 1912**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Stenarchorhynchus severii* Santana & Nogueira, 2006**

Localidade-tipo: Rio Mucajá, abaixo da Cachoeira do Paredão 2, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchella curvioperculata* Godoy, 1968**

Localidade-tipo: Riacho afluente do rio Mogi-Guassu, acima da cachoeira de Emas, Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchella schotti* (Steindachner, 1868)**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro (= Manaus?), Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchella sima* Starks, 1913**

Localidade-tipo: Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchella terminalis* Eigenmann & Allen, 1942**

Localidade-tipo: Iquitos, Peru.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: bibliográfica.  
Referência: Triques (1998).

***Sternarchogiton nattereri* (Steindachner, 1868)**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro [Manaus?], Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Observações: Como sinônimo sênior de *Oedemognatus exodon* em Albert (2003).

***Sternarchogiton porcinum* Eigenmann & Allen, 1942**

Localidade-tipo: Rio Huallaga, Yurimaguas, Iquitos, Peru.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 79045).

***Sternarchorhamphus muelleri* (Steindachner, 1881)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Campos-da-Paz (1995).

***Sternarchorhynchus britskii* Campos-da-Paz, 2000**

Localidade-tipo: Rio Paraná na represa de Ilha Solteira, 20°30'S 51°00'W, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Sternarchorhynchus caboblo* Santana & Nogueira, 2006**

Localidade-tipo: Rio Mucajaí, abaixo da Cahoeira do Paredão 2, Estado de Roraima, Brasil.  
Distribuição: Rio Mucacai, no Estado de Roraima.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchorhynchus curumim* Santana & Crampton, 2006**

Localidade-tipo: Rio Tefé, 03°47,31'S 64°59,91'W, Toco Preto, Município de Tefé, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchorhynchus mesensis* Campos-da-Paz, 2000**

Localidade-tipo: Rio Tocantins em Minaçu/Uruaçu, 13°50'S 48°19'W, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchorhynchus mormyrus* (Steindachner, 1868)**

Localidade-tipo: Marabitanos, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Sternarchorhynchus oxyrhynchus* (Müller & Troschel, 1849)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: bibliográfica.  
Referência: Boulenger (1898b).

***Tembeassu marauna* Triques, 1998**

Localidade-tipo: Ilha Solteira, rio Paraná, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Triques (1998).  
Observações: Como *Apteronotus marauna* em Albert (2003).

**Ordem Cyprinodontiformes**

**Família Rivulidae**

Wilson J.E.M. Costa

***Austrolebias adloffii* (Ahl, 1922)**

Localidade-tipo: Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacia da lagoa dos Patos.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias affinis* (Amato, 1986)**

Localidade-tipo: Banhados do arroio Tres Cruces, ruta 5, km 399,5, Tacuarembó, Uruguai.  
Distribuição: Alto e médio rio Negro (bacia do Uruguai) no sul do Brasil, centro e norte do Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2002c).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias alexandri* Castello & Lopez, 1974**

Localidade-tipo: Gualaguaychu, Entre Rios, Argentina.  
Distribuição: Bacia do Uruguai.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Costa (2002c).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias carvalhoi* (Myers, 1947)**

Localidade-tipo: Bacia do rio Iguaçu, perto de Porto União, Estado de Santa Catarina, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Iguaçu.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1998c).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Paraná.

***Austrolebias charrua* Costa & Cheffe, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária junto ao arroio Chuí, estrada para Barra do Chuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias cyaneus* (Amato, 1987)**

Localidade-tipo: Arroio Dom Marcos, Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Jacuí, sistema lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (2002c).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias gymnoventris* (Amato, 1986)**

Localidade-tipo: Arroyo India Muerta, Velázquez, Rocha, Uruguai.

Distribuição: Bacias costeiras do sul do Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Costa & Cheffe (2002).

***Austrolebias ibicuiensis* (Costa, 1999)**

Localidade-tipo: BR-287 entre São Pedro do Sul e Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Ibicuí, bacia do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (2002c).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias jaegari* Costa & Cheffe, 2002**

Localidade-tipo: Banhado do Timba, Corredor das Tropas, Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema da lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Austrolebias luteoflammulatus* (Vaz-Ferreira et al., 1964)**

Localidade-tipo: arroyo Valizas, Rocha, Uruguai.

Distribuição: Bacias costeiras do sul do Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (\*\*\*A ser informado).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias minuano* Costa & Cheffe, 2001**

Localidade-tipo: Lagoa temporária cerca de 4,5 km N de Quinta, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias nigrofasciatus* Costa & Cheffe, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária em Pontal da Barra, praia de Laranjal, Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Sistema lagoa dos Patos.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias periodicus* (Costa, 1999)**

Localidade-tipo: Várzea do rio Santa Maria, Dom Pedrito, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Ibicuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Costa (1999), Costa (2002c).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio Grande do Sul.

***Austrolebias varzea* Costa, Reis & Behr, 2004**

Localidade-tipo: Lagoa temporária junto ao rio da Várzea, bacia do Uruguai, Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Uruguai, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Campellolebias brucei* Vaz-Ferreira & Sierra, 1974**

Localidade-tipo: Poça entre Criciúma e Tubarão, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do sul do Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995c).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

***Campellolebias chrysolineatus* Costa, Lacerda & Brasil, 1989**

Localidade-tipo: Araquari, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do norte do Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995c).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Campellolebias dorsimaculatus* Costa, Lacerda & Brasil, 1989**

Localidade-tipo: Iguape, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do sul do Estado de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995c).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Cynolebias albipunctatus* Costa & Brasil, 1991**

Localidade-tipo: Juazeiro, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa & Brasil (1991).

***Cynolebias altus* Costa, 2001**

Localidade-tipo: 25 km S de Ibotirama, bacia do São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynolebias attenuatus* Costa, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária a 12 km O de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynolebias gibbus* Costa, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária a 9,5 km N de Sítio do Mato, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynolebias gilbertoi* Costa, 1998**

Localidade-tipo: 30 km S de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2001).

***Cynolebias griseus* Costa, Lacerda & Brasil, 1990**

Localidade-tipo: Nova Roma, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Rio Paranã, bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2001).  
Estado de conservação: Em perigo.

***Cynolebias itapicuruensis* Costa, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária em Capim Grosso, bacia do Itapicuru, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Itapicuru, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynolebias leptcephalus* Costa & Brasil, 1993**

Localidade-tipo: Guanambi, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2001).

***Cynolebias microphthalmus* Costa & Brasil, 1995**

Localidade-tipo: Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Jaguaribe e bacias adjacentes.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2001).

***Cynolebias perforatus* Costa & Brasil, 1991**

Localidade-tipo: Januária, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2001).

***Cynolebias porosus* Steindachner, 1876**

Localidade-tipo: Pernambuco, Brasil.  
Distribuição: Nordeste do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynolebias vazabarrisensis* Costa, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária 33 km S de Bendegó, rodovia BR-116, bacia do Vaza-Barris, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Vaza-Barris, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynopoecilus fulgens* Costa, 2002**

Localidade-tipo: Poça temporária 5 km N de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Sistema lagoa dos Patos.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynopoecilus intimus* Costa, 2002**

Localidade-tipo: Alagado temporário junto a um riacho afluente do rio Vacacaí, bacia do Jacuí, 6 km NO de Vila Block, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Sistema lagoa dos Patos, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynopoecilus melanotaenia* (Regan, 1912)**

Localidade-tipo: Quinta, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do sul do Brasil e Uruguai.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (2002a).

***Cynopoecilus multipapillatus* Costa, 2002**

Localidade-tipo: Poça temporária entre a rodovia RS-787 e a lagoa Fortaleza, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Planícies costeiras do sul do Estado de Santa Catarina e norte do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Cynopoecilus nigrovittatus* Costa, 2002**

Localidade-tipo: Banhado do rio Caí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Drenagem do Jacuí, sistema lagoa dos Patos, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Kryptolebias brasiliensis* (Valenciennes, 1821)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Huber (1992).  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo (como "*Rivulus brasiliensis*") no Município do Rio de Janeiro.

***Kryptolebias campelloi* (Costa, 1990)**

Localidade-tipo: Primavera, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Baixo Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.



***Kryptolebias caudomarginatus* (Seegers, 1984)**

Localidade-tipo: Grota Funda, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Ambientes estuarinos do sudeste e sul do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Huber (1992).

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo (como "*Rivulus caudomarginatus*") no Município do Rio de Janeiro.

***Kryptolebias ocellatus* (Hensel, 1868)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Ambientes estuarinos da costa brasileira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Huber (1992).

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo (como "*Rivulus ocellatus*") no Município do Rio de Janeiro.

***Leptolebias aureoguttatus* (Cruz, 1974)**

Localidade-tipo: Estrada Paranaguá-Matinhos, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras dos Estados do Paraná e sul de São Paulo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

***Leptolebias citrinipinnis* (Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988)**

Localidade-tipo: Maricá, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Sistema lagunar de Maricá, leste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio de Janeiro.

***Leptolebias cruzi* (Costa, 1988)**

Localidade-tipo: Barra de São João, Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Baixadas costeiras junto a foz do rio São João, Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Rio de Janeiro.

***Leptolebias fractifasciatus* (Costa, 1988)**

Localidade-tipo: Inoã, Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Sistema lagunar de Maricá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro.

***Leptolebias leitaoi* (Cruz & Peixoto, 1991)**

Localidade-tipo: Rio Mucuri, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Mucuri, sul do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

***Leptolebias marmoratus* (Ladiges, 1934)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Baixadas costeiras ao fundo da baía de Guanabara, Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referências: Costa (1995b), Costa (2002b).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Possivelmente extinta no Estado do Rio de Janeiro.

***Leptolebias minimus* (Myers, 1942)**

Localidade-tipo: Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Baixadas costeiras, oeste do Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1988a).  
Estado de conservação: Vulnerável.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Rio de Janeiro, criticamente em perigo no Município do Rio de Janeiro.

***Leptolebias opalescens* (Myers, 1942)**

Localidade-tipo: Raiz da Serra, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras ao fundo da baía de Guanabara, Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa & Lacerda (1988).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo (como "*Leptolebias fluminensis*") e vulnerável (como "*Leptolebias nanus*") no Estado do Rio de Janeiro.

***Leptolebias splendens* (Myers, 1942)**

Localidade-tipo: Raiz da Serra, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras ao fundo da baía de Guanabara, Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa & Lacerda (1988).  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Possivelmente extinta (como "*Leptolebias sandrii*") no estado do Rio de Janeiro.

***Maratecoara formosa* Costa & Brasil, 1995**

Localidade-tipo: Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Maratecoara lacortei* (Lazara, 1991)**

Localidade-tipo: Aruanã, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Araguaia.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).

***Megalebias wolterstorffii* (Ahl, 1924)**

Localidade-tipo: Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do sul do Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo no Estado do Rio Grande do Sul.

***Moema heterostigma* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Alagado temporário na várzea do rio Cuiabá, bacia do Paraguai, Porto Cercado, Reserva

Particular do Patrimônio Natural SESC-Pantanal, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Brasil

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moema nudifrontata* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Várzea do rio Branco perto da ilha do Carneiro, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Drenagem do rio Branco, bacia do Amazonas, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moema pepotei* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Forte Príncipe da Beira, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Moema piriana* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Primavera, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1992).

***Moema portugali* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Ilha de Maracá, Estado de Roraima, Brasil.

Distribuição: Rio Branco, bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1992).

***Moema staecki* (Seegers, 1987)**

Localidade-tipo: Proximidades do lago Janauacá, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1992).

***Nematolebias papilliferus* Costa, 2002**

Localidade-tipo: Poça temporária junto a um pequeno riacho do sistema lagunar de Maricá, Inoã, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Sistemas lagunares de Maricá e Saquarema, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Nematolebias whitei* (Myers, 1942)**

Localidade-tipo: Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (2002d).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Em perigo (como "*Simpsonichthys whitei*" no Estado do Rio de Janeiro).

***Neofundulus acutirostratus* Costa, 1992**

Localidade-tipo: Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio das Velhas, bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Neofundulus guaporensis* Costa, 1988**

Localidade-tipo: Forte Príncipe da Beira, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Neofundulus paraguayensis* (Eigenmann & Kennedy, 1903)**

Localidade-tipo: Arroio Trementina, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1988c).

***Neofundulus parvipinnis* Costa, 1988**

Localidade-tipo: BR- 364, 36 km L de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pituna compacta* (Myers, 1927)**

Localidade-tipo: Porto Nacional, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Araguaia e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1998b).

***Plesiolebias aruana* (Lazara, 1991)**

Localidade-tipo: Aruanã, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Araguaia e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1998a).

***Plesiolebias glaucopterus* (Costa & Lacerda, 1988)**

Localidade-tipo: Cáceres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1998a).

***Plesiolebias lacerdai* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Rio das Mortes, estrada para Cocalinhos, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1998a).

***Plesiolebias xavantei* (Costa, Lacerda & Tanizaki, 1988)**

Localidade-tipo: Porto Nacional, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1998a).

Estado de conservação: Em perigo.

***Prorivulus auriferus* Costa, Lima & Suzart, 2004**

Localidade-tipo: Riacho costeiro, Valença, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Rios costeiros do Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pterolebias bokermanni* Travassos, 1955**

Localidade-tipo: Rio Guajará-Mirim, Território do Guaporé (atualmente Estado de Rondônia), Brasil.

Distribuição: Bacias do Madeira e do Paraguai, Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pterolebias longipinnis* Garman, 1895**

Localidade-tipo: Santarém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas e do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1988b).

***Pterolebias phasianus* Costa, 1988**

Localidade-tipo: Cáceres, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Riculus scalaris* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Córrego tributário da bacia do alto rio Sucuruí, bacia do Paraná, 18°53'54,7S 52°58'44,2"W, Município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Drenagens do rio Sucuruí, rio Aporé e alto rio Correntes, na bacia do Paraná, e Drenagem do alto rio Tauari, na bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus amanapira* Costa, 2004**

Localidade-tipo: Poças perto do igarapé Palestina, São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Drenagem do alto rio Negro, bacia do Amazonas, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus apiamici* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Bataguaçu, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio Paraná, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus atratus* Garman, 1895**

Localidade-tipo: Jutai, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Huber (1992).

***Rivulus auratus* Schreitmüller, 1928**

Localidade-tipo: Maranhão, Brasil.  
Distribuição: Maranhão, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus bahianus* Huber, 1990**

Localidade-tipo: Itapoã, Salvador, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras dos Estados da Bahia e Sergipe.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Huber (1992).

***Rivulus beniensis* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Ivon, Bolívia.  
Distribuição: Bacia do Madeira.  
Documentação primária: Lote de referência (\*\*A ser informado).

***Rivulus cyanopterus* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Banhado próximo ao rio Tenente Amaral, tributário do alto rio São Lourenço, bacia do Paraguai, 11°58'48,9"S 54°57'20,0"W, Município de Jaciara, Estado de Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus dapazi* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Córrego Confusão, tributário do rio Confusão, bacia do Paraguai, 17°33'56,4S 54°44'23,8W, Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.  
Distribuição: Trecho superior da bacia do rio Correntes, na bacia do Paraguai, Brasil central.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus decoratus* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Ibiraba, perto da foz do rio Icatú, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).

***Rivulus depressus* Costa, 1991**

Localidade-tipo: Porto Seguro, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do sul do Estado da Bahia.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus dibaphus* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Ajamuri, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do baixo Trombetas e baixo Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus egens* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Estrada BR-060, rio São Domingos, drenagem do alto rio Verde, bacia do Paraná, 19°19'26,0S 53°21'6,8"W, Município de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.  
Distribuição: Rio São Domingos, na Drenagem do alto rio Verde, bacia do Paraná, Estado de Mato Grosso do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus geayi* Vaillant, 1899**

Localidade-tipo: Rio Carnot, Brasil.  
Distribuição: Rios do Amapá e Guiana Francesa.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Huber (1992).

***Rivulus haraldsiolii* Berkenkamp, 1984**

Localidade-tipo: Rio Itapocu, Estado de Santa Catarina, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1991b).

***Rivulus igneus* Huber, 1991**

Localidade-tipo: Montagne des Singes, Guiana Francesa.  
Distribuição: Guiana Francesa e Estado do Amapá.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Huber (1992).

***Rivulus janeiroensis* Costa, 1991**

Localidade-tipo: Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do Rio de Janeiro.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Em preigo no Município do Rio de Janeiro.

***Rivulus kirovskyi* Costa, 2004**

Localidade-tipo: Poças temporárias perto do igarapé Acará, drenagem do baixo Negro, bacia do Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Drenagem do baixo Negro, bacia do Amazonas, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus litteratus* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Córrego do Sapo, bacia do alto rio Araguaia, estrada MT-100, 31 Km ao S de Alto Araguaia, 17°33'28,5"S 53°18'33,1"W, Município de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus luelingi* Seegers, 1984**

Localidade-tipo: Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras dos Estados do Paraná e Santa Catarina.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1991c).

***Rivulus micropus* (Steindachner, 1863)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Brasil.  
Distribuição: Amazônia central.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus modestus* Costa, 1991**

Localidade-tipo: Rio Mutum, Comodoro, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995a).

***Rivulus nudiventris* Costa & Brasil, 1991**

Localidade-tipo: Itapemerim, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do leste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Espírito Santo.

***Rivulus ornatus* Garman, 1895**

Localidade-tipo: Silves, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus paracatuensis* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Córrego na várzea do Paracatu, perto de Brasilândia, bacia do São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Drenagem do Paracatu, bacia do São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus parnaibensis* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Lagoa junto à rodovia BR-135, 18 km NE de São Dimas, bacia do Parnaíba, Estado do Piauí, Brasil.

Distribuição: Bacia do Parnaíba, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus pictus* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Córrego Fumal, Formosa, Distrito Federal, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

***Rivulus pinima* Costa, 1989**

Localidade-tipo: Município de Rio Verde, 37 km a leste de Jataí, BR-364, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Alto rio Claro, bacia do Paraná, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus punctatus* Boulenger, 1895**

Localidade-tipo: Colonia Risso, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Costa (1995a).

***Rivulus romeri* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Córrego tributário do igarapé Iauari, drenagem do alto rio Negro, bacia do Amazonas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Drenagem do alto rio Negro, bacia do Amazonas, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus rossoi* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Riacho na BR-060, 21,5 Km a SO de Campo Grande, drenagem do rio Inhaduí, bacia do Paraná, cerca de 20°40'S 54°40'W, Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Rivulus ruticaudus* Costa, 2005**

Localidade-tipo: Várzea do rio Verde, bacia do Paraná, estrada BR-060, 18°22'31,5S 52°0'59,5"W, Município de Serranópolis, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Drenagem do rio Verde, na bacia do rio Paraná, Estado de Goiás.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus santensis* Köhler, 1906**

Localidade-tipo: Santos, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras dos Estados de São Paulo e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1991c).

***Rivulus simplicis* Costa, 2004**

Localidade-tipo: Alagado perto da praia de Jabaquara, Parati, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Leste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus strigatus* Regan, 1912**

Localidade-tipo: Amazônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Amazonas, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus tecminae* Thomerson, Nico & Taphorn, 1992**

Localidade-tipo: rio Guayapo, Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do alto Orinoco e alto Negro.

Documentação primária: Lote de referência (\*\*\*A ser informado).

***Rivulus uakti* Costa, 2004**

Localidade-tipo: Riacho perto do igarapé Iá, drenagem do alto Negro, bacia do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Drenagem do alto Negro, bacia do Amazonas, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus urophthalmus* Günther, 1866**

Localidade-tipo: Belém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Amazônia oriental.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Huber (1992).

***Rivulus violaceus* Costa, 1991**

Localidade-tipo: Rio das Mortes, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio das Mortes.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

***Rivulus vittatus* Costa, 1989**

Localidade-tipo: 192 km ao sul de Jataí, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus xanthonotus* Ahl, 1926**

Localidade-tipo: Bacia do Amazonas.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Rivulus xiphidius* Huber, 1979**

Localidade-tipo: Saint-Georges, Guiana Francesa.  
Distribuição: Guiana Francesa e Estado do Amapá.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Huber (1992).

***Rivulus zygonectes* Myers, 1927**

Localidade-tipo: Canabrava, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacias dos rios Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).

***Simpsonichthys adornatus* Costa, 2000**

Localidade-tipo: Poça temporária perto de Sítio do Mato, bacia do São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys alternatus* (Costa & Brasil, 1994)**

Localidade-tipo: João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Rio Paracatú, bacia do São Francisco.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys antenori* (Tulipano, 1973)**

Localidade-tipo: Estado do Ceará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Jaguaribe e bacias adjacentes.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).

***Simpsonichthys auratus* Costa & Nielsen, 2000**

Localidade-tipo: Poça temporária junto ao rio Taboca, um afluente do Paracatú, bacia do São Francisco, Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Drenagem do Paracatu, bacia do médio São Francisco, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Em perigo.

***Simpsonichthys boitonei* Carvalho, 1959**

Localidade-tipo: Brasília, Distrito Federal, Brasil.  
Distribuição: Rio São Bartolomeu, bacia do alto Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys bokermanni* (Carvalho & Cruz, 1987)**

Localidade-tipo: Itabuna, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Cachoeira, sul do Estado da Bahia.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys brunoi* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Poça temporária perto da cidade de Vila Boa, várzea do ribeirão Canabrava, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Tocantins, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys carlettoi* Costa & Nielsen, 2004**

Localidade-tipo: Poça temporária perto de Guanambi, estrada para Malhada, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys choloptyx* Costa, Moreira & Lima, 2003**

Localidade-tipo: Ribeirão do Sapo, bacia do Araguaia, 31 km ao sul de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Araguaia, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys constanciae* (Myers, 1942)**

Localidade-tipo: Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Rio de Janeiro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Rio de Janeiro.

***Simpsonichthys costai* (Lazara, 1991)**

Localidade-tipo: Aruanã, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Araguaia e Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

***Simpsonichthys delucai* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Poça temporária perto da cidade de Urucuia, várzea do rio Urucuia, bacia do São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Drenagem do Urucuia, bacia do médio São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys flagellatus* Costa, 2003**

Localidade-tipo: Poça temporária a 12 km a oeste de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys flammeus* (Costa, 1989)**

Localidade-tipo: Arraias, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

***Simpsonichthys flavicaudatus* (Costa & Brasil, 1990)**

Localidade-tipo: Lagoa Grande, Estado do Pernambuco, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys fulminantis* (Costa & Brasil, 1993)**

Localidade-tipo: Guanambi, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys ghisolfi* Costa, Cyrino & Nielsen, 1996**

Localidade-tipo: Guanambi, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Rio das Rãs, bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys hellneri* (Berkenkamp, 1993)**

Localidade-tipo: Estrada Itacarambi-Manga, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys igneus* Costa, 2000**

Localidade-tipo: Poça temporária perto de Igarité, bacia do São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio rio São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys izecksohni* (da Cruz, 1983)**

Localidade-tipo: Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio Doce, Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Doce e planícies costeiras adjacentes, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Espírito Santo.

***Simpsonichthys magnificus* (Costa & Brasil, 1991)**

Localidade-tipo: Manga, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys marginatus* Costa & Brasil, 1996**

Localidade-tipo: Barro Alto, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Rio Maranhão, bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

***Simpsonichthys multiradiatus* (Costa & Brasil, 1994)**

Localidade-tipo: Brejinho de Nazaré, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

***Simpsonichthys myersi* (Carvalho, 1971)**

Localidade-tipo: Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, Brasil.  
Distribuição: Bacias costeiras do norte do Estado do Espírito Santo e sul do Estado da Bahia.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Costa (1995b).  
Estado de conservação: Em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Espírito Santo.

***Simpsonichthys notatus* (Costa, Lacerda & Brasil, 1990)**

Localidade-tipo: Alvorada do Norte, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Rio Paraná, bacia do rio Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Em perigo.

***Simpsonichthys ocellatus* Costa, Nielsen & de Luca, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária próxima ao rio Jequitinhonha, perto de Itaobim, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio Jequitinhonha, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys parallelus* Costa, 2000**

Localidade-tipo: Alagado sazonal na várzea do rio Formoso, tributário do rio Correntes, drenagem do Paranaíba, bacia do Paraná, Parque Nacional das Emas, Estado de Goiás, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto Paraná, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys perpendicularis* Costa, Nielsen & de Luca, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária perto do ribeirão do Salto, estrada entre Itarantim e Jordânia, cerca de 6 km de Jordânia, bacia do Jequitinhonha, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio Jequitinhonha, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys picturatus* Costa, 2000**

Localidade-tipo: Poça temporária perto de Volta das Pedras, bacia do São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys reticulatus* Costa & Nielsen, 2003**

Localidade-tipo: Altamira, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Xingu, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys rosaceus* Costa, Nielsen & de Luca, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária perto do rio Pardo, estrada entre Potiguará e Itapetinga, Estado da Bahia, Brasil.  
Distribuição: Bacia do médio Pardo, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys rufus* Costa, Nielsen & de Luca, 2001**

Localidade-tipo: Poça temporária perto do riacho do Barro, Ibiaí, perto do rio São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio São Francisco, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys santanae* (Shibata & Garavello, 1992)**

Localidade-tipo: Margem direita do ribeirão Santana, a 750 m da divisa do Distrito Federal com Goiás, Distrito Federal, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

***Simpsonichthys semiocellatus* (Costa & Nielsen, 1997)**

Localidade-tipo: Poça próxima a rio Formoso, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável (como *Spectrolebias semiocellatus*).

***Simpsonichthys similis* Costa & Hellner, 1999**

Localidade-tipo: Urucuia, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Urucuia, bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys stellatus* (Costa & Brasil, 1994)**

Localidade-tipo: São Francisco, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys suzarti* Costa, 2004**

Localidade-tipo: Poça temporária perto de Canavieiras, várzea do rio Pardo, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Várzeas do rio Pardo, Estado da Bahia, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Simpsonichthys trilineatus* (Costa & Brasil, 1994)**

Localidade-tipo: João Pinheiro, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Paracatú, bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Vulnerável.

***Simpsonichthys zonatus* (Costa & Brasil, 1990)**

Localidade-tipo: Garapuava, Estado de Minas Gerais, Brasil.

Distribuição: Rio Urucuia, bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1995b).

Estado de conservação: Em perigo.

***Stenolebias bellus* Costa, 1995**

Localidade-tipo: Várzea do rio Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

***Stenolebias damascenoi* (Costa, 1991)**

Localidade-tipo: Estrada entre Poconé e Porto Cercado, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Deficiente de dados.

***Trigonectes balzanii* (Perugia, 1891)**

Localidade-tipo: Villa Maria (Cáceres), Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1990b).

***Trigonectes macrophthalmus* Costa, 1990**

Localidade-tipo: Forte Príncipe da Beira, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trigonectes rubromarginatus* Costa, 1990**

Localidade-tipo: Aruana, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Trigonectes strigabundus* Myers, 1925**

Localidade-tipo: Porto Nacional, Estado do Tocantins, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Costa (1990a).

**Família Poeciliidae**

Paulo H.F. Lucinda & Wilson J.E.M. Costa

***Cnesterodon brevirostratus* Rosa & Costa, 1993**

Localidade-tipo: Arroio Camisa, tributário do rio das Antas, Parque Nacional dos Aparados da Serra, Cambará do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Alto rio Pelotas e Canoas, bacia do Uruguai, rio Jacuí e cabeceiras do rio Maquiné (rio Tramandaí) e cabeceiras da bacia do rio Itajaí-Açu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Lucinda & Garavello (2000), Lucinda (2005a).

***Cnesterodon carnegiei* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Serrinha, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rosa & Costa (1993), Lucinda & Garavello (2000), Lucinda (2005a).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

Observações: Veja Lucinda & Garavello (2000) para comentários acerca dos tipos e da localidade tipo.

***Cnesterodon decemmaculatus* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Maldonado, Uruguai.

Distribuição: Baixo Uruguai, sistema da Lagoa dos Patos, rio Negro (rio Uruguai), rio Salado (Argentina), bacias do oeste da Argentina e pequenas drenagens costeiras do Uruguai e da Argentina. Introduzida no Chile.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referências: Rosa & Costa (1993), Lucinda & Garavello (2000), Lucinda (2005a).

***Cnesterodon hypselurus* Lucinda & Garavello, 2000**

Localidade-tipo: Rio Cilada, abaixo da ponte na rodovia BR 151, bacia do Paranapanema, Jaguariaíva, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Trecho alto da bacia do Paranapanema.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Lucinda & Garavello (2000), Lucinda (2005a).

***Cnesterodon iguape* Lucinda, 2005**

Localidade-tipo: Riacho nas cabeceiras do rio Iporanga, na Mineradora Oxical, Município de Apiaí, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cnesterodon omorgmatos* Lucinda & Garavello, 2000**

Localidade-tipo: Rio das Torres, bacia do Iguaçu, Pinhão, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda & Garavello (2000).

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

***Cnesterodon septentrionalis* Rosa & Costa, 1993**

Localidade-tipo: Alagado próximo à nascente do córrego do Rancho, alto Araguaia, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Araguaia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda & Garavello (2000).

***Fluviphylax obscurus* Costa, 1996**

Localidade-tipo: Rio Negro, Barcelos, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Originalmente publicado como *Fluviphylax obscurum*.

***Fluviphylax palikur* Costa & Le Bail, 1999**

Localidade-tipo: Rio Taparabu, afluente da margem direita do rio Oiapoque, 3° 58' 35"N 51°41'0"W, Juminán, Estado do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo rio Oiapoque.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Fluviphylax pygmaeus* (Myers & Carvalho, 1955)**

Localidade-tipo: Médio Amazonas, baixo rio Madeira, aproximadamente 4°24'S 59°35'W, Borba, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Roberts (1970b), Costa (1996).



***Fluviphylax simplex* Costa, 1996**

Localidade-tipo: Igarapé do lago José-Açu, Parintins, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas, entre o lago Miúá (Codajás) e a boca do rio Tapajós, e baixos rios Trombetas e Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Fluviphylax zonatus* Costa, 1996**

Localidade-tipo: Rio Negro, Anavilhanas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Baixo rio Negro, entre o arquipélago das Anavilhanas e Manaus.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Micropoecilia branneri* Eigenmann, 1894**

Localidade-tipo: Santarém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosen & Bailey (1963).

***Micropoecilia minima* Costa & Sarraf, 1997**

Localidade-tipo: Ourém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Guamá, baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Micropoecilia parae* Eigenmann, 1894**

Localidade-tipo: Belém, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Baixo Orinoco, Guianas, baixo Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosen & Bailey (1963).

***Pamphorichthys araguiensis* Costa, 1991**

Localidade-tipo: Lagoa próxima a Aruanã, bacia do Araguaia, Estado de Goiás, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pamphorichthys hasemani* (Henn, 1916)**

Localidade-tipo: Puerto Suarez, bacia do Paraguai, Bolívia.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Costa (1991a).

***Pamphorichthys hollandi* (Henn, 1916)**

Localidade-tipo: Penedo, rio São Francisco, Estado de Alagoas, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco e bacias do nordeste do Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rosen & Bailey (1963), Costa (1991a).

***Pamphorichthys minor* (Garman, 1895)**

Localidade-tipo: Villa Bella [= Parintins], Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas, entre Santarém e Manaus.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rosen & Bailey (1963), Costa (1991a).

***Pamphorichthys scalpridens* (Garman, 1895)**

Localidade-tipo: Santarém, Óbidos, Villa Bella, bacia amazônica, Brasil.

Distribuição: Amazônia oriental.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosen & Bailey (1963).

***Phalloceros caudimaculatus* (Hensel, 1868)**

Localidade-tipo: Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Leste, Sudeste e Sul do Brasil, Uruguai, nordeste da Argentina.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Rosen & Bailey (1963).

***Phalloptychus eigenmanni* Henn, 1916**

Localidade-tipo: Rio Catú, Alagoinhas, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda (2005b).

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

***Phalloptychus iheringii* (Boulenger, 1889)**

Localidade-tipo: Fóz do rio Camaquã, Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Estado de Santa Catarina e do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Boulenger (1889), Lucinda (2003), Lucinda (2005b).

Observações: Veja Lucinda (2003) para comentários acerca da localidade tipo.

***Phalloptychus januarius* (Hensel, 1868)**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referências: Rosen & Bailey (1963), Lucinda (2005b).

***Phallotorynus fasciolatus* Henn, 1916**

Localidade-tipo: Jacareí, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacias do alto Paraíba do Sul e alto rio Tietê, em Parapiacaba.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda *et al.* (2005).

Estado de conservação: Em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado de São Paulo.

***Phallotorynus jucundus* von Ihering, 1930**

Localidade-tipo: Cabeceira do rio Tamanduá, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Trecho superior da drenagem do rio Pardo, na bacia do Rio Grande, sistema do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda *et al.* (2005).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado de São Paulo.

Observações: Neótipo designado por Lucinda *et al.* (2005).

***Phallotorynus pankalos* Lucinda, Rosa & Reis, 2005**

Localidade-tipo: Riacho na Fazenda Sossego, tributário do rio Puitá, afluente do rio Iguatemi, bacia do Paraná, estrada para Paranhos, Tacuru, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda *et al.* (2005).

***Phallotorynus victoriae* Oliveros, 1983**

Localidade-tipo: Isla Los Mellados, Santa Fe, Argentina.

Distribuição: Porção inferior e média da bacia do Paraná nos Departamentos de Caaguazú, Misiones e Alto Paraná (Paraguai), na Província de Santa Fé e Corrientes (Argentina), e no Estado do Mato Grosso do Sul (Brasil).

Documentação primária: Lote de Referência (MZUSP 59257).

Referência: Lucinda *et al.* (2005).

***Poecilia vivipara* Bloch & Schneider, 1801**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacias costeiras entre Venezuela e Argentina.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Rosen & Bailey (1963).

***Tomeurus gracilis* Eigenmann, 1909**

Localidade-tipo: Aruka e Wismar, Guiana.

Distribuição: Baixo Orinoco, Guianas, baixo Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Rosen & Bailey (1963).

**Família Anablepidae**

Paulo H.F. Lucinda & Wilson J.E.M. Costa

***Anableps anableps* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: Índia.

Distribuição: Ilha de Trinidad e bacias costeiras entre a Venezuela e o delta do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ghedotti (1998).

***Anableps microlepis* Müller & Troschel, 1844**

Localidade-tipo: Guiana.

Distribuição: Ilha de Trinidad e bacias costeiras entre a Venezuela e o delta do Amazonas.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ghedotti (1998).

***Jenynsia eigenmanni* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: Próximo a Serrinha, a três milhas do rio Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Iguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Ghedotti & Weitzman (1995).

***Jenynsia eirmostigma* Ghedotti & Weitzman, 1995**

Localidade-tipo: Rio Manoel Leão, Cambará do Sul, perto de São José dos Ausentes, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Uruguai e bacia do rio Jacui.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jenynsia multidentata* (Jenyns, 1842)**

Localidade-tipo: Montevideo, Uruguai.

Distribuição: Norte da Argentina, baixo Paraná; bacias costeiras desde o Estado do Rio de Janeiro, Brasil até o Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Ghedotti *et al.* (2001).

***Jenynsia sanctaecatarinae* Ghedotti & Weitzman, 1996**

Localidade-tipo: Rio Pique, entre Meleiro e Araranguá, Morro Cortado, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Araranguá, Estado de Santa Catarina.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Jenynsia unitaenia* Ghedotti & Weitzman, 1995**

Localidade-tipo: Rio Faxinalzinho, em Mãe dos Homens, próximo a Praia Grande, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras dos Estado de Santa Catarina e Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

## **Ordem Synbranchiformes**

### **Família Synbranchidae**

Sandra Favorito Amorim &

Naércio A. Menezes

***Synbranchus lamprea* Favorito, Zanata, Assumpção**

Localidade-tipo: Rio Goiapi, tributário do rio Arari, Ilha de Marajó, Município de Cachoeira do Arari, aproximadamente 0°58'S 48°57'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Goiapi, Ilha de Marajó, Estado do Pará.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Synbranchus marmoratus* Bloch, 1785**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Amplamente distribuída por todo o Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Favorito-Amorim (1998).

***Synbranchus sp. 1***

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 42533).

Referência: Favorito-Amorim (1998).

***Synbranchus sp. 2***

Distribuição: Rio Solimões, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 43452).

Referência: Favorito-Amorim (1998).

***Synbranchus sp. 3***

Distribuição: Estrada Manaus-Boa Vista.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 2249).

Referência: Favorito-Amorim (1998).

***Synbranchus sp. 4***

Distribuição: Rio Trombetas.

Documentação primária: Lote de referência (INPA 2241).

Referência: Favorito-Amorim (1998).

***Synbranchus sp. 5***

Distribuição: Rio Solimões, Estado do Amazonas.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 43456).

Referência: Favorito-Amorim (1998).

**Ordem Perciformes****Família Nandidae**

Naércio Aquino Menezes

***Monocirrhus polyacanthus* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Marabitanos, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas, bacia do Orinoco (Venezuela) e rios das Guianas.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britz & Kullander (2003).

**Família Cichlidae**

Paulo A. Buckup & João Teixeira

***Acarichthys heckelii* (Müller & Troschel, 1849)**

Localidade-tipo: "Sumpfen der Savanne".

Distribuição: Bacia do Amazonas e do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander (1986).

***Acaronia nassa* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Boca de Juquiá, rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé e afluentes, Brasil e Bolívia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Acaronia vultuosa* Kullander, 1989**

Localidade-tipo: Pequeno poço de água negra fora da estrada entre El Burro e Puerto Ayacucho, aproximadamente 5°47'N 67°29'W, Departamento Ature, Território Federal Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Orinoco e do alto Negro.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (1989).

***Aequidens diadema* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Igarapé em Marabitanos, rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro, Brasil e Venezuela.

Documentação primária: Localidade tipo (BMNH 1979.3.20).

Referência: Kullander (1986).

***Aequidens duopunctatus* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens epae* Kullander, 1995**

Localidade-tipo: Igarapé em Barreirinha, bacia do Tapajós, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens filamentosus* (Lacépède, 1802)**

Localidade-tipo: América do Sul.

Distribuição: Bacia do Amazonas, América do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann & Eigenmann (1891).

***Aequidens gercilliae* Kullander, 1995**

Localidade-tipo: Igarapé do Aeroporto, Núcleo Aripuanã, acima da cachoeira, aproximadamente 10°10'S 59°25'W, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Drenagem do Aripuanã, na bacia do Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens guaporensis* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: São Antonio de Guaporé, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens hercules* Allen, 1942**

Localidade-tipo: Rio Morona, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas, Brasil e Peru.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann & Allen (1942).

***Aequidens hoehnei* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Rio Branco afluente do rio Araguaia, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Araguaia e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens mauesianus* Kullander, 1997**

Localidade-tipo: Igarapé do rio Maraú, bacia do rio Maués, Município de Maués, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Maués e Arapiuns, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens michaeli* Kullander, 1995**

Localidade-tipo: Poço rochoso próximo a Cachoeira, Belo Monte, bacia do Xingu, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens pallidus* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Negro, bacia do Amazonas.

Distribuição: Bacias do médio e baixo Negro, Uatumã, Preto da Eva e Puraquequara, na Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander & Ferreira (1991).

***Aequidens paraguayensis* Eigenmann & Kennedy, 1903**

Localidade-tipo: Assunção, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MUSP 16073.

Referência: Regan (1905).

***Aequidens plagiozonatus* Kullander, 1984**

Localidade-tipo: Lagos internos da bacia do Piquiri-Itiquira, Itiquira, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Piquiri-Itiquira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens rondoni* (Miranda Ribeiro, 1918)**

Localidade-tipo: Rio Sangue, Brasil.

Distribuição: Rio Sangue, rio Tapajós e rio Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens tetramerus* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Branco, Brasil.

Distribuição: Rio Branco e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens tubicen* Kullander & Ferreira, 1991**

Localidade-tipo: Igarapé a 4 Km na estrada para a Perimetral Norte, Reserva Biológica de Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trobetas, próximo a Cachoeira Porteira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Aequidens viridis* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Alto Paraguai, rio Cuiabá e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma acrensis* Staack, 2003**

Localidade-tipo: Lago do rio Acre, cerca de 25 Km da cidade de Rio Branco, Estado do Acre, Brasil.

Distribuição: Bacias do Acre e alto Purus.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma agassizi* (Steindachner, 1875)**

Localidade-tipo: Curupira, Codojas, rio Poti de São João, lago Maximo e lago Manacapuru, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas, ao longo do rio Amazonas-Solimões do Peru à bacia do rio Capim.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma angayuara* Kullander & Ferreira, 2005**

Localidade-tipo: Poço estagna a jusante da cachoeira Vira Mundo, margem direita do rio Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Rio Trobetas na região das cachoeiras Porteira e Vira Mundo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma arua* Römer & Warzel, 1998**

Localidade-tipo: Pequeno afluente do rio Arua, tributário do rio Arapiuns, ca. 2°39'27"S 55°53'24"W, cerca de 2,5 Km a montenate da vila de Aura, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Arapiuns, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma bitaeniata* Pellegrin, 1936**

Localidade-tipo: Rio Madeira, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma borellii* (Regan, 1906)**

Localidade-tipo: Carandásinho, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Apistogramma brevis* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Pequeno canal do lago Penera, 0°01'N 67°21'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uaupés, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma cacatuoides* Hoedeman, 1951**

Localidade-tipo: Bacia do rio Amazonas, entre 69°W e 71°W.

Distribuição: Tributários do Ucayali Amazonas e Solimões do rio Pachitea, Peru, a Tabatinga, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (1980).

Observações: Localidade tipo corrigida por Kullander (1980).

***Apistogramma caetei* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Igarapé em Bragança, 1°45'S 46°47'W, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacias dos rios Apeú e Caeté em Bragança, Estado do Pará, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma commbrae* (Eigenmann, 1906)**

Localidade-tipo: Carandásinho, Estado do Mato Grosso, Brasil, e Colonia Risso, Alto Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Apistogramma diplotaenia* Kullander, 1987**

Localidade-tipo: Rio Negro, a jusante do rio Daraã, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro, entre San Carlos e o rio Arirará.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma elizabethae* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Tributário do rio Uaupés em Trovão, a cerca de 20 Km da desembocadura do Uaupés, 0°02'S 67°25'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uaupés, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma eunotus* Kullander, 1981**

Localidade-tipo: Perto de Pucallpa, Bacia do rio Ucayali, Departamento de Loreto, Peru.

Distribuição: Tributários do Ucayali e Amazonas no Peru e fronteira do Brasil e Peru, incluindo a drenagem do Yavari no Peru e Japurá, no Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCZ 15807.

Referência: Kullander (1986).

***Apistogramma geisleri* Meinken, 1971**

Localidade-tipo: Rio Curuçamba, próximo a Óbidos, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas, na região do baixo Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Apistogramma geophyra* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Igarapé tributário do rio Negro, Arquipélago das Anavilhanas, 3°00'S 60°45'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo rio Negro, na Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma gibbiceps* Meinken, 1969**

Localidade-tipo: Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacias do Rio Negro e Branco, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma gossei* Kullander, 1982**

Localidade-tipo: Martinica, bacia do rio Oiapoque, [Estado] do Amapá, Brasil.

Distribuição: Bacia do Oiapoque, na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa, e do Approuague, na Guiana Francesa.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma hippolytae* Kullander, 1982**

Localidade-tipo: Igarapé do Lago Manacaparu, bacia do Solimões, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do rio Negro e baixo rio Solimões, na Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma inconspicua* Kullander, 1982**

Localidade-tipo: Pequeno poço do rio Candelária, 16°00'S 61°40'W, Departamento de Santa Cruz, Bolívia.

Distribuição: Bacias do rio Guaporé e Paraguai.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Britski *et al.* (1999).

***Apistogramma juruensis* Kullander, 1986**

Localidade-tipo: Cruzeiro do Sul, rio Juruá, Estado do Acre, Brasil.

Distribuição: Rio Moá e rio Juruá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma maciliense* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: São Antônio de Guaporé, Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Lucinda (2005a).

***Apistogramma meinken* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Tributário do rio Uaupés em Trovão, a cerca de 20 Km da desembocadura do Uaupés, 0°02'S 67°26'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uaupés, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma mendezi* Römer, 1994**

Localidade-tipo: Rio próximo a Barcelos do Rio Negro, ca. 0°01'S 63°04'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio Negro, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma moae* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Igarapé São Salvador, 7°38'S 72°36'W, do rio Moá, Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, Brasil.

Distribuição: Rio Moá e rio Juruá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma paucisquamis* Kullander & Staeck, 1988**

Localidade-tipo: Pequena baía na margem direita do rio Negro, Arquipélago de Anavilhanas, Brasil.

Distribuição: Bacia do médio e baixo Negro, entre o rio Daraá e Anavilhanas, na Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma personata* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Rio Auapés, Assaí, 0°02'N 67°27'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uaupés, na Amazônia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma pertense* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas, ao longo da calha do Amazonas-Solimões.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma piauiensis* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Lagoa Seca, 3°08'S 41°54'W, no rio Parnaíba, em Barra Longa, próximo a Buriti dos Lopes, Brasil.

Distribuição: Bacia do Parnaíba.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma pulchra* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Rio Preto, tributário do rio Candeias, 8°46'S 63°45'W, 25 Km de Porto Velho, [Estado] de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma regani* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Igarapé tributário do rio Negro, Arquipélago das Anavilhanas, 3°00'S 60°45'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Negro, na Amazônia Central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma resticulosa* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Igarapé Xicanga, cerca de 5 Km a oeste de Humaitá, 7°31'S 63°04'W, bacia do rio Madeira, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Madeira próximo a Humaitá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma salpincthon* Kullander & Ferreira, 2005**

Localidade-tipo: Banhado no Km 70 da BR-163, bacia do Trobetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma taeniata* (Günther, 1862)**

Localidade-tipo: Rio Cupai, a 800 milhas do mar, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma trifasciata* (Eigenmann & Kennedy, 1903)**

Localidade-tipo: Arroyo Chagalalina, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 15555.

Referências: Haseman (1911), Britski *et al.* (1999).

***Apistogramma tucurui* Staeck, 2003**

Localidade-tipo: Riacho, bacia do Tocantins, rodovia 150, cerca de 10 Km ao sul de Jacundá, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Apistogramma uaupesi* Kullander, 1980**

Localidade-tipo: Tributário do rio Uaupés em Trovão, a cerca de 20 Km da desembocadura do Uaupés, 0°02'S 67°26'W, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uaupés e Negro, na Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astronotus crassipinnis* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Villa Maria e Caiçara, rio Guaporé, rio Negro, rio Branco, Brasil.

Distribuição: Alto Paraguai, rio Negro, rio Guaporé e rio Branco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Astronotus ocellatus* (Agassiz, 1831)**

Localidade-tipo: Peru.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Brasil e Peru; Paraguai, Guianas e Venezuela.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 13674.

Referência: Pellegrin (1903).

***Australoheros scitulus* (Rican & Kullander, 2003)**

Localidade-tipo: Arroyo Colla, 34°19'07"S 59°20'13"W, 500 m a montante de da desembocadura no rio Rosário, a montante de Paso Arballo, bacia do Prata, Departamento de Colônia, Uruguai.

Distribuição: Bacia do baixo rio Uruguai, no Uruguai, Argentina e Brasil, e bacias adjacentes no sudoeste do Uruguai.

Documentação primária: Lote de referência (MCP 13589).

Referência: Rican & Kullander (2006).

Observações: Existem várias populações de *Australoheros* no Brasil, cuja identificação taxonômica exige a revisão do gênero.

***Biotodoma cupido* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Negro, e rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro e rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Biotodoma wavrini* (Gosse, 1963)**

Localidade-tipo: Alto rio Orinoco entre San Fernando de Atabapo e o canal Casiquiare, Venezuela.

Distribuição: Bacias do alto Orinoco, Negro e Preto da Eva.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Gosse (1975).

***Biotocus opercularis* (Steindachner, 1891)**

Localidade-tipo: Lago Saraca e Amazonas em Villa Bella, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Lago Saraca.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bujurquina mariae* Eigenmann, 1822**

Localidade-tipo: Barrigon, rio Meta, Bacia rio Orinoco, Colômbia.

Distribuição: Rio Negro, Brasil; bacia do Orinoco, Colômbia.

Documentação primária: Lote de referência (NRM 16646).

***Bujurquina peregrinabunda* Kullander, 1986**

Localidade-tipo: Quebrada tributária do rio Yaguasyacu, logo a jusante da vila de Esperamza, bacia do Ambiyacu, Departamento de Loreto, Peru.

Distribuição: Bacia do Solimões, entre Codajás (Brasil) e a região do rio Ambyiacu (Peru).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (1986).

***Bujurquina syspilus* (Cope, 1872)**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu e tributários, Peru.

Distribuição: Rio Ambyacu e tributários, Peru; bacia do rio Madeira, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (NRM 16652).

***Bujurquina vittata* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Cuiabá, e Alto Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Bujurquina zamorensis* (Regan, 1905)**

Localidade-tipo: Rio Zamora, bacia do Amazonas, Equador.

Distribuição: Bacia do Amazonas, Equador e Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1910).

***Caquetaia myersi* Schultz, 1944**

Localidade-tipo: Rio Dedo tributário do rio Ortegua, perto de Florencia, bacia Amazonica, Colômbia.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Colômbia e Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (FMNH 101827).

***Caquetaia spectabilis* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Gurupa e Obidos, rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Chaetobranchopsis australis* Eigenmann & Ward, 1907**

Localidade-tipo: Bahia Negra, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Eigenmann (1910).

***Chaetobranchopsis orbicularis* (Steindachner, 1875)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas em [Belém] do Pará, Santarém, Gurupa, rio Xingu em Porto do Noz, rio Negro e rio Hyuvári, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas e bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Chaetobranchus flavescens* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé e afluentes, Brasil e Bolívia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Chaetobranchus semifasciatus* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Rio Amazonas, em Obidos, Codajás, Tefé, rio Içá, lago Januari, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichla intermedia* Machado-Allison, 1971**

Localidade-tipo: Rio Casiquiare, Território do Amazonas, Venezuela.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Venezuela e Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 15479).

***Cichla monoculus* Spix in Spix & Agassiz, 1831**

Localidade-tipo: Brasil.

Distribuição: Rio Negro, rio Amazonas e rio Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichla ocellaris* Schneider, 1801**

Localidade-tipo: "Índia Oriental", América do Sul.

Distribuição: Bacia do Orinoco, Colômbia; bacia do rio Negro Paraíba do Sul, Brasil.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 17476.

Referência: Pellegrin (1902).

***Cichla temensis* Humboldt, 1833**

Localidade-tipo: América do Sul.

Distribuição: Bacia do Leste, Brasil; bacia do rio Orinoco, Colômbia.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 21809.

Referência: Eigenmann & Bray (1894).

***Cichlasoma amazonarum* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: Leito tributário e a direita do rio Ampiyacu, Loreto, Peru.

Distribuição: Rio Ampiyacu, Peru; rio Araguaia, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14537).

***Cichlasoma araguaense* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: Rio Araguaia, pequeno igarapé tributário do igarapé Sangadina a 1 km de Xavantina, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Araguaia e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichlasoma bimaculatum* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: M. Mediterraneo [errônea].

Distribuição: Bacias do Caroni (Venezuela) e do Branco (Brasil) e bacias guianenses entre o Essequibo e o Sinnamary.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (1983).

***Cichlasoma boliviensis* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: R. Uruguayta, R. Guaporé, trib. do R. Quizer, 13 km ao sul de São Xavier, Dept. Santa Cruz, Bolívia.

Distribuição: Rio Guaporé e afluentes, Brasil e Bolívia.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14524).

***Cichlasoma dimerus* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Cuiabá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichlasoma orientale* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: Rio Curua, Estado do Ceará, Brasil.

Distribuição: Rio Curuá e tributários.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichlasoma paranaense* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: Bacia do rio Paraná, Três Lagoa, a esquerda do leito do rio Sucuriú, na Fazenda Santa Luzia, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichlasoma portalegrense* (Hensel, 1870)**

Localidade-tipo: Porto Alegre, Brasil.

Distribuição: Bacia da lagoa do Patos e de Tramandaí.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Cichlasoma sanctifranciscense* Kullander, 1983**

Localidade-tipo: Lagoa Viana, bacia do rio São Francisco, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do São Francisco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicara latruncularium* Kullander & Staeck, 1990**

Localidade-tipo: Igarapé do 13, na estrada Palheta - Guajará Mirim, drenagem do Mamoré, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacias do Guaporé e Mamoré.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicara punctulatum* (Guenther, 1863)**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Guiana.

Distribuição: Rio Essequibo, Guiana; rio Jatapu, rio Urarucuera e rio Anauá, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (BMNH 1864, 1. 21. 26).

***Crenicichla acustirostris* Günther, 1862**

Localidade-tipo: Rio Cupai, à 800 milhas do mar, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Rio Cupai, rio Capim.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla alta* Eigenmann, 1912**

Localidade-tipo: Ilha Gluck, Guiana.

Distribuição: Bacias do Essequibo (Guiana) e do Branco (Brasil).

Documentação primária: Lote de referência (INPA 291, holótipo de *C. alta*).

***Crenicichla anthurus* Cope, 1872**

Localidade-tipo: Rio Ambyacu, Peru.

Distribuição: Rio Ambyacu, Peru; bacia do rio Madeira, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14520).

***Crenicichla brasiliensis* (Bloch, 1792)**

Localidade-tipo: Rios do Brasil.

Distribuição: Desconhecida.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla cametana* Steindachner, 1911**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla celidochilus* Casciotta, 1987**

Localidade-tipo: Arroyo de la Invernada, Departamento Artigas, Uruguai.  
Distribuição: Bacia do Uruguai, Uruguai e Brasil.  
Documentação primária: Lote de referência (MCP 12256.1).

***Crenicichla cincta* Regan, 1905**

Localidade-tipo: Ilha de Marajó, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Ilha de Marajó.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla compressiceps* Ploeg, 1986**

Localidade-tipo: Cachoeira abaixo de Jatobal, Brasil.  
Distribuição: Bacia do baixo Tocantins.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla cyanonotus* Cope, 1870**

Localidade-tipo: Rio Marañon, perto de Pebas, Peru.  
Distribuição: Bacias do Amazonas, Brasil e Peru.  
Documentação primária: Lote de referência (ANSP 9078).

***Crenicichla cyclostoma* Ploeg, 1986**

Localidade-tipo: Tucuruí, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Tucuruí.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Pará.

***Crenicichla gaucho* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Arroio Passo do Alto, próximo a Mineral, Município de São Nicolau, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Rio Comandã, rio Ijuí, rio Piratinim e rio Canoas, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla geayi* Pellegrin, 1903**

Localidade-tipo: Venezuela.  
Distribuição: Amazônia, Peru, Venezuela.  
Documentação primária: Lote de referência (MNHN 1898-47).

***Crenicichla haroldoi* Luengo & Britski, 1974**

Localidade-tipo: Rio Paraná, em frente a Jupiá, Estado de Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do alto Paraná.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla heckeli* Ploeg, 1989**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, Cachoeira Porteira, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Trombetas.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla hemera* Kullander, 1990**

Localidade-tipo: Riacho de cabeceira tributário do rio Cinta Larga, BR-174, a 41 km de Juína, bacia do Aripuanã, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias do Tapajós e Madeira.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander (2003).

***Crenicichla hummelincki* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Igarapé Jaramacuru, tributário do rio Cuminá, bacia do Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla igara* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Rio Canoas em Passo do Canoas ( estrada SC-458), Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Rio Canoas, bacia do Uruguai, Uruguai e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla iguapina* Kullander & Lucena, 2006**

Localidade-tipo: Rio Betari, Iporanga, drenagem do Ribeira de Iguape, Estado de São paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Ribeira de Iguape.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla iguassuensis* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Rio Iguazu, no Porto União da Victória, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Rio Iguazú e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla inpa* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Ilha do Careiro, bacia do Amazonas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla isbrueckeri* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Rio Aripuanã, Humboldt, 10°10'S 59°27'W, a 3 km da cachoeira de Dardanelos, bacia do Madeira, Estado de Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Aripuanã.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla jaguarensis* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Rio Grande, do Paraná à Jaguará (Estado de Minas Gerais), Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Grande.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla jegui* Ploeg, 1986**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, Itupiranga, Brasil.

Distribuição: Bacia do baixo Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Criticamente em perigo.

Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Pará.

***Crenicichla johanna* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé, Brasil e Bolívia.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Crenicichla jupiaensis* Britski & Luengo, 1968**

Localidade-tipo: Salto de Urubupungá, rio Paraná, entre os estados de Mato Grosso e São Paulo, Brasil.

Distribuição: Região da calha do alto rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

Estado de conservação: Em perigo.

***Crenicichla jurubi* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Rio Marombas abaixo da ponte Irineu Bornhausen, Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai, Uruguai e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla labrina* (Spix & Agassiz, 1831)**

Localidade-tipo: Águas brasileiras.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Alto Paraguai, bacia do rio Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla lacustris* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Dique próximo à Bahia [de Todos os Santos], Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia costeiras do rio João, Estado do Rio de Janeiro, ao rio Buranhem, Estado da Bahia.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander & Lucena (2006).

***Crenicichla lenticulata* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Negro, Marabitanas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro; Guianas e Venezuela.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla lepidota* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé, Brasil e Bolívia, bacia do Uruguai no Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla lucius* Cope, 1871**

Localidade-tipo: Cayapoza, rio Marañon, departamento de Loreto, Peru.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Brasil e Peru.

Documentação primária: Lote de referência (NRM 30916).

***Crenicichla lugubris* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Negro, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla macrophthalma* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla maculata* Kullander & Lucena, 2006**

Localidade-tipo: Rio Pinheiro, Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do Estado de Santa Catarina e bacias das lagoas costeiras do nordeste do Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla marmorata* Pellegrin, 1903**

Localidade-tipo: Brasil.  
Distribuição: Rio Marmoré e rio Guaporé.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla menezesi* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Caieira, Estado do Maranhão, Brasil.  
Distribuição: Rios do Estado do Maranhão.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla minuano* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Rio Comandá, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Rio Comandá, rio Ijuí, rio Piratinim e rio Canoas, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla missioneira* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Rio Comandá, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.  
Distribuição: Rio Comandá, rio Ijuí, rio Piratinim e rio Canoas, Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla mucuryna* Ihering, 1914**

Localidade-tipo: Rio Todos os Santos, afluente do rio Mucuri, Estado de Minas Gerais, Brasil.  
Distribuição: Bacia do rio Mucuri.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Referência: Kullander & Lucena (2006).

***Crenicichla niderleinii* (Holmberg, 1891)**

Localidade-tipo: Rio Pequiri, Misiones e outros próximos, Paraguai.  
Distribuição: Bacia do alto Paraná.  
Documentação primária: Bibliográfica.  
Referência: Kullander (1981a).

***Crenicichla notophthalmus* Regan, 1913**

Localidade-tipo: Amazoans, em Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do baixo rio Negro, próximo a Manaus.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Observações: Lestótipo designado por Ploeg (1989).

***Crenicichla pellegrini* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Igarapé do Porto, rio Aripuanã, bacia do Madeira, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Aripuanã.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla percna* Kullander, 1991**

Localidade-tipo: Cachoeira do Espelho, bacia do Xingu, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Xingu.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla phaiospilus* Kullander, 1991**

Localidade-tipo: Rio Fresco, Aldeia Gorotire, Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Xingu.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla prenda* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Rio Jacutinga (na estrada BR 283), Estado de Santa Catarina, Brasil.

Distribuição: Rio Jacutinga, bacia do Uruguai, Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla proteus* Cope, 1872**

Localidade-tipo: Rio Ambyiacu, Peru.

Distribuição: Rio Ambyacu, Peru; bacia do rio Madeira, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (ANSP 9050).

***Crenicichla punctata* Hensel, 1870**

Localidade-tipo: Rio Guaíba, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia da laguna dos Patos, Brasil e Paraguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander & Lucena (2006).

***Crenicichla pydanielae* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Igarapé no km 10 da BR-163, bacia do Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla regani* Ploeg, 1989**

Localidade-tipo: Bacia do rio Trombetas, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla reticulata* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla rosemariae* Kullander, 1997**

Localidade-tipo: Bacia do rio Xingu, Córrego do Gato, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Xingu, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla saxatilis* (Linnaeus, 1758)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Suriname; rio Guaíba, bacia de Patos (sul do Brasil).

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 19968.

Referência: Haseman (1911).

***Crenicichla scotti* Eigenmann, 1907**

Localidade-tipo: Buenos Aires, Argentina.

Distribuição: Bacia do Prata, Argentina e Uruguai; bacia do Uruguai e bacia do rio Paraná, Argentina, Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MCP 9359.

Referência: Eigenmann (1910).

***Crenicichla semifasciata* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, em São Luiz de Cáceres, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla stocki* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Capuarana, bacia do Tocantins, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tocantins.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla strigata* Guenther, 1862**

Localidade-tipo: Rio Capim, rio Cupai à 800 milhas do mar, Brasil.

Distribuição: Rio Cupai, rio Capim.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla tendybaguassu* Lucena & Kullander, 1992**

Localidade-tipo: Rio Piratinim, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Piratinim, Brasil; bacia do Uruguai, Brasil e Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla tigrina* Ploeg et al., 1991**

Localidade-tipo: Rio Trombetas, na desembocadura do Igarapé Caxipacoré, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Trombetas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla tinguí* Kullander & Lucena, 2006**

Localidade-tipo: Rio Jacaré, km 18 da rodovia BR-277, 25°35'S 48°43'W, limite dos Municípios de Paranaguá e Morretes, Estado do Paraná, Brasil.

Distribuição: Bacias da baía de Paranaguá, da baía de babitonga e do rio Itapocu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla urosema* Kullander, 1990**

Localidade-tipo: Poço rochoso em São Luiz, a montante de Itaituba, rio Tapajós, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Tapajós, na região de São Luiz.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla virgatula* Ploeg, 1991**

Localidade-tipo: Rio Uraricorea, Ilha de Maracá, drenagem do rio Branco, bacia do Negro, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto rio Branco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla vittata* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Cuiabá, bacia do rio Paraguai, Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai, baixo Paraná e Uruguai.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 1233.

Referências: Miranda Ribeiro (1918b), Lucena & Kullander (1992).

***Crenicichla adspersa* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Crenicichla britski* Kullander, 1982**

Localidade-tipo: Riacho acima da BR-153, km 143, bacia do Tietê, Município de Promissão, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Bacia do alto Paraná.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Dicrossus filamentosus* (Ladiges, 1958)**

Localidade-tipo: Provavelmente do Amazonas.

Distribuição: Bacias do Orinoco (Colômbia e Venezuela) e Negro (Brasil).

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (2003).

***Dicrossus maculatus* Steindachner, 1875**

Localidade-tipo: Rio Amazonas drenagem do lago Maximo, lago José Assu, rio Tocantins, rio Tajapuru, rio Hyavary, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas, rio Tocantins e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus altifrons* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Manaus, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro e Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus argyrostictus* Kullander, 1991**

Localidade-tipo: Poço rochoso junto a cachoeira em Belo Monte, Bacia do Xingu, Estado do Pará, Brasil.

Distribuição: Bacia do Xingu da cachoeira von Martius até Belo Monte, e bacia do Curuá.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus brasiliensis* Kner, 1865**

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.

Distribuição: Bacias costeiras do leste e sudeste do Brasil e do Uruguai.

Documentação primária: Localidade tipo.

Observações: Pode tratar-se de um complexo de espécies.

***Geophagus camopiensis* Pellegrin, 1903**

Localidade-tipo: Rio Camopi, bacia do Oiapoque, Guiana Francesa.

Distribuição: Bacias do Araguari, Oiapoque e Approuague.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14586).

***Geophagus iporangensis* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Riacho em Iporanga, bacia do Ribeira de Iguape, Estado de São Paulo, Brasil.

Distribuição: Conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus itapicuruensis* Haseman, 1911**

Localidade-tipo: Queimadas, rio Itapicuru, Brasil.

Distribuição: Conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus megasema* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Grande lago em Juquiá, bacia do Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Conhecida apenas da localidade tipo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus obscurus* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Rio Paraguaçu, Estado da Bahia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguaçu.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Geophagus proximus* Castelnau, 1855**

Localidade-tipo: lago próximo ao Ucaiale, na Missão de Saraiacu, Peru.

Distribuição: Bacia do Amazonas, Brasil e Peru.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (1986).

***Geophagus surinamensis* (Bloch, 1791)**

Localidade-tipo: Suriname.

Distribuição: Bacia do Tocantins, Brasil; Bacias do Saramacca, Suriname, e Marowijne

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: MNRJ 21295.

Referência: Haseman (1911).

***Guianacara geayi* (Pellegrin, 1902)**

Localidade-tipo: Riviéri Camopi, Guiana Francesa.

Distribuição: Riviéra Camopi, Suriname; rio Amazonas, rio Trombetas e rio Branco, Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 37010).

***Gymnogeophagus balzanii* Perugia, 1891**

Localidade-tipo: Rio Paraguai, Vila Maria, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Malabarba (1988).

***Gymnogeophagus gymnogenys* Hensel, 1870**

Localidade-tipo: Rio Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacia do Uruguai, Uruguai e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Malabarba (1988).

***Gymnogeophagus labiatus* (Hensel, 1870)**

Localidade-tipo: Rio Santa Maria, Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Santa Maria e afluentes, Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Malabarba (1988).

***Gymnogeophagus lacustris* Reis & Malabarba, 1988**

Localidade-tipo: Lagoa da Cerquinha, Pinhal, Município de Tramandaí, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Bacias Tramandaí, no Estado do Rio Grande do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnogeophagus meridionalis* Reis & Malabarba, 1988**

Localidade-tipo: Rio Negro (na rodovia BR-153), bacia do Uruguai, Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Negro (em Bagé), bacia do Uruguai, na Argentina, Uruguai e Brasil.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Gymnogeophagus rhabdotus* Hensel, 1870**

Localidade-tipo: Rio Cadeia, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Distribuição: Rio Cadeia e afluentes.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Reis & Malabarba (1988).

***Gymnogeophagus setequeadas* Reis & Malabarba, 1988**

Localidade-tipo: Rio Paraná, Alto Paraná, Paraguai.

Distribuição: Rio Paraná e afluentes, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MZUSP 42715).

Estado de conservação: Vulnerável.

Categoria de ameaça em listas regionais: Vulnerável no Estado do Paraná.

***Heros efasciatus* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Bacia do Amazonas, América do Sul.

Distribuição: Bacia do Amazonas, América do Sul.

Documentação primária: Bibliográfica / Lote de referência: NRM THO/1971373.3405.

Referência: Kullander (1986).

Observações: Treated as *Heros appendiculatus* (Castelnau, 1855) in Kullander (1986).

***Heros severus* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Negro, Marabitanas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro, Brasil e Venezuela.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Miranda Ribeiro (1918b).

***Heros spurius* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Guaporé.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hoplarchus psittacus* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Negro ao norte de Marabitanas, ao "pé" das montanhas Cocui, Venezuela.

Distribuição: Bacias do alto Orinoco, Negro, Preto da Eva, Urubu e Jamari.

Documentação primária: Bibliográfica.

Referência: Kullander (2003).

***Hypselecara coryphaenoides* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Maribitana, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Hypselecara temporalis* Guenther, 1862**

Localidade-tipo: Desconhecida.

Distribuição: Bacias do Amazonas e do Araguari.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14568).

***Laetacara curviceps* (Ahl, 1923)**

Localidade-tipo: Rio Amazonas.

Distribuição: Bacia do Amazonas, América do Sul.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Laetacara dorsigera* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Villa Maria, rio Paraguai.

Distribuição: Bacia do Paraguai, Paraguai e Brasil.

Documentação primária: Lote de referência (MNRJ 14868).

***Laetacara flavilabris* (Cope, 1870)**

Localidade-tipo: Proximidades de Pebas, Peru.

Distribuição: Bacias do Solimões, no Brasil, Peru, Equador.

Documentação primária: Lote de referência (ZUEC 735-737).

***Laetacara thayeri* (Steindachner, 1875)**

Localidade-tipo: Codajás, lago Hyuanuary em Manaus, lago Maximo em Alencar, Brasil.

Distribuição: Lago Hyuanuary e lago Maximo.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Mesonauta acora* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Lagos do Araguaia, Brasil.

Distribuição: Bacias do Tocantins e Xingu.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander & Silfvergrip (1991).

***Mesonauta festivus* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias do Paraguai, Guaporé, Mamoré, Jamari e Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Mesonauta guyanae* Schindler, 1998**

Localidade-tipo: Rio Essequibo, Rockstone, Guiana.

Distribuição: Bacias do Essequibo (Guiana) e Negro (Brasil).

Documentação primária: Localidade tipo.

***Mesonauta insignis* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Lago em floresta em Marabitanas, rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Negro e Orinoco.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Mikrogeophagus altispinosus* (Haseman, 1911)**

Localidade-tipo: Banco de areia no rio Mamoré, a jusante da confluência com o Guapore, Estado de Rondônia, Brasil.

Distribuição: Bacia do Mamoré.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander (1981b).

***Nannacara adoketa* Kullander & Prada-Pedrerros, 1993**

Localidade-tipo: Igarapé do Cumaru, tributário do paraná Atauaí, médio rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Região do médio rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Nannacara taenia* Regan, 1912**

Localidade-tipo: Amazoans em Manaus, Estado do Amazaonas, Brasil.

Distribuição: Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Pterophyllum leopoldi* (Gosse, 1963)**

Localidade-tipo: Furo da vila de Cuia, margem esquerda do Solimões, aproximadamente 90 km de Manacaparu, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.



***Pterophyllum scalare* (Valenciennes, 1823)**

Localidade-tipo: Baixo rio Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacias do Amazonas, Essequibo, Oiapoque e bacias costeiras do Estado do Amapá.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander (1986).

Observações: Lectótipo designado por Paepke & Schindler (2002).

***Retroculus lapidifer* (Castelnau, 1855)**

Localidade-tipo: Quedas do rio Araguaia, Brasil.

Distribuição: Bacias do Tocantins e Capim.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Gosse (1971).

Observações: Neótipo designado por Gosse (1971)

***Retroculus septemtrionalis* Gosse, 1971**

Localidade-tipo: Rio Oiapoque, salto Alikoto, a montante da vila da Camopi, fronteira Guiana / Brasil.

Distribuição: Bacia do Oiapoque e bacais costeira do Estado do Amapá até a bacia do Araguari.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Retroculus xinguensis* Gosse, 1971**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Cachoeira von Martius, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Bacias do Xingu e Tapajós.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Satanoperca acuticeps* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Satanoperca daemon* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Negro, Maribitanos, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do rio Negro.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Satanoperca jurupari* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Desembocadura do rio Negro no rio Amazonas, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas e bacias costeiras do Estado do Amapá e Guiana Francesa.

Documentação primária: Localidade tipo.

Referência: Kullander (1986).

***Satanoperca lilith* Kullander & Ferreira, 1988**

Localidade-tipo: Praia de Urumari, 0°03'S 63°30'W, bacia do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil.

Distribuição: Amazônia central.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Satanoperca pappaterra* (Heckel, 1840)**

Localidade-tipo: Rio Guaporé, Estado do Mato Grosso, Brasil.

Distribuição: Rio Guaporé, Brasil e Bolívia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Symphysodon aequifasciata* Pellegrin, 1903**

Localidade-tipo: Tefé e Santarém, Brasil.

Distribuição: Bacia do Amazonas, na planície amazônica, no Brasil, Peru e Colômbia.

Documentação primária: Localidade tipo.

***Symphysodon discus* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Barra do rio Negro, Manaus, Estado do Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Bacia do Amazonas, na planície amazônica, do Brasil.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Taeniacara candidi* Myers, 1935**

Localidade-tipo: Médio Amazonas, Brasil.  
Distribuição: Amazônia central.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Teleocichla centisquama* Zuanon & Sazima, 2002**

Localidade-tipo: Rio Xingu, Furo do Zé Pinheiro, 3°27'26"S 51°55'03"W, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Cachoeiras do rio Xingu na região de Altamira.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Teleocichla centrarchus* Kullander, 1988**

Localidade-tipo: Cachoeira von Martius, alto rio Xingu, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Teleocichla cinderella* Kullander, 1988**

Localidade-tipo: Rio Tocantins, a jusante da represa de Tucuruí, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Tocantins a jusante da represa de Tucuruí.  
Documentação primária: Localidade tipo.  
Estado de conservação: Criticamente em perigo.  
Categoria de ameaça em listas regionais: Criticamente em perigo no Estado do Pará.

***Teleocichla gephyrogramma* Kullander, 1988**

Localidade-tipo: Cachoeira von Martius, alto rio Xingu, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Teleocichla monogramma* Kullander, 1988**

Localidade-tipo: Cachoeira von Martius, alto rio Xingu, Estado do Mato Grosso, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Teleocichla prionogenys* Kullander, 1988**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, São Luis, acima de Itaituba, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Espécie conhecida apenas da localidade-tipo.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Teleocichla proselytus* Kullander, 1988**

Localidade-tipo: Rio Tapajós, São Luis, acima de Itaituba, Estado do Pará, Brasil.  
Distribuição: Rio Tapajós.  
Documentação primária: Localidade tipo.

***Uaru amphiacanthoides* Heckel, 1840**

Localidade-tipo: Rio Negro e rio Amazonas.  
Distribuição: Bacia do Amazonas.  
Documentação primária: Localidade tipo.