

DISTRIBUCIÓN REPRODUCTIVA DE LAS AVES DE ARGENTINA Y SUS TERRITORIOS

Sergio A. Salvador



**RECOPILACIÓN INÉDITA
CÓRDOBA- ARGENTINA
2016**

INTRODUCCIÓN

Existen numerosos artículos sobre la distribución geográfica de las aves de Argentina, así como obras de distribución específicas (Olrog 1979, de la Peña 2013). Por el contrario, es escasa la información concreta sobre la distribución reproductiva de las aves en Argentina, el hecho de que una especie se encuentre en una región determinada, no es sinónimo de que reproduzca en ella.

La información sobre reproducción y la distribución de las aves que habitan nuestro país no siempre son claras, por lo que se creyó de interés y utilidad la elaboración de un compendio con datos de la crianza de las diferentes especies, por provincias.

Para la confección del “Distribución Reproductiva de las Aves de Argentina y sus Territorios” se tuvieron en cuenta todas las especies y subespecies para las que existen datos o evidencia de que crían o podrían criar en Argentina. Se brinda información por provincias, Islas Malvinas y para aquellas especies que lo hacen en Islas del Atlántico Sur y Península Antártica.

La información presente fue obtenida a través de una prolífica revisión bibliográfica, tanto de libros como de artículos de revistas de ornitología e historia natural. También se consiguió un importante número de datos obtenidos de museos de historia natural, de sus colecciones de huevos y pieles de pichones, tanto de entes nacionales como extranjeros. Se agregó además información de nidos y adultos con pichones de fotografías de EcoRegistros – Registros Ecológicos de la Comunidad (<http://www.ecoregistros.org/>), y de lista consultadas de eBirds Argentina (<http://ebird.org/content/argentina/>). Además se suman datos inéditos obtenidos por ornitólogos argentinos, y por el autor, en viajes realizados por toda la Argentina entre 1978 y 2016.

En “Distribución temporal” se mencionan los meses en los que se ha detectado cualquier tipo de actividad reproductiva, comenzando por el primer mes del año.

Las provincias y territorios, aparecen ordenadas de norte a sur: Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Península Antártica.

Para el ordenamiento sistemático se siguió a Rensen et al. (2016).

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento a todos los que colaboraron con este trabajo, en tareas de campo o suministrando información inédita desinteresadamente.

A Lucio Salvador, Nahuel Salvador, Alejandro Bodrati, Luis G. Pagano, Manuel Nores, Martín de la Peña, Rosendo Fraga, Pablo Eroles, Mariano Moroni, Tito Narosky, Javier Heredia, Carlos Ferrari, Silvia Vitale, Mauricio Rumboll, Darío Yzurieta†, David Wilson†, Francisco Contino†, Mauricio Earnshaw†, Ada Azategui, Enrique Sierra, Pablo Canevari†, Mauro Bianchini, Carlos Pérez.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AMNH= American Museum of Natural History

ANWC= Australian National Wildlife Collection

DMNH= Delaware Museum of Natural History

FMNH= Field Museum of Natural History, Illinois, Chicago

IML= Instituto Miguel Lillo

MACN= Museo Argentino de Ciencias Naturales

MLP= Museo de La Plata

MVZ= Museum of Vertebrate Zoology, UC Berkeley

MZFC= Museo Zoología Facultad de Córdoba

UF= Florida Museum of Natural History

UWBM= University of Washington Burke Museum

WFVZ= Western Foundation of Vertebrate Zoology

S/I= Sin ninguna información para el país

S/D= Sin datos concretos, para aquellos trabajos en donde se menciona a la especie solo como “nidificador” o “nidifica”

S/C= Sin datos de colector

CO= Individuos copulando

HF= Hembras con huevos formados, listos para poner

N= Nidos en construcción, con postura o pichones

A/P= Adulto/s con pichón/es dependientes

J= Juveniles

NP= Nidos parasitados

PP= Adultos con pichones parásitos

LISTA SISTEMÁTICA DE ESPECIES

Orden RHEIFORMES

Familia Rheidae

Ñandú

(*Rhea americana albescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fiora 1939)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: P. Girard en IML), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa:** (A/P: Giai 1977), (N: Mercolli 1993), (J: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Mercolli y Yanosky 2001), (N: Di Giacomo 2005), (J: Chatellenaz 2008), (S/D: Contreras et al. 2014), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N y A/P: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 1998)- **Misiones:** (N: Bodrati 2007)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Wilson in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 1999)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N y A/P: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso en Pautasso 2000), (N y A/P: Pautasso 2011), (A/P: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Martella et al. 1994), (N: Navarro et al. 1998), (N: Bazzano et al. 2002), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en y Montalti 2014)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Smyth 1927), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Zelich en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 1999)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: J. Goodall en DMNH)- **Buenos Aires:** (N: Grant 1911), (N: Bruning 1973, 1974), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N y A/P: Fernández y Reboreda 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2007), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Coconier 2006), (N y A/P: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y A/P: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N y A/P: Martínez en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (A/P: Bellotti 2014), (N: S/C, WFVZ), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (A/P: Maceda 2007a), (A/P: Dolsan 2015), (N: S/C, WFVZ), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (A/P: Giai 1977), (A/P: De la Peña 2005b, 2013)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Gelain 2012b), (A/P: Torres 2015), (N: S/C, WFVZ), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Choique

(a) (*Rhea pennata pennata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: W. Hugh en DMNH), (A/P: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Hudson 1872a), (A/P: Peters 1923), (N: Barri et al. 2009), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Tocce 2012), (N= J. Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (N:

Hartert y Venturi 1909), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N y AP: De la Peña 1987, 2013), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Villamil 2012), (N: Camezzana en De la Peña y Montalti 2014), (A/P: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: S. Venturi en WFVZ), (N: W. Rosenberg en WFVZ), (N y A/P: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N y A/P: De Luca y Saggese 1992), (A/P: De Lucca 1996c), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N y A/P: Imberti 2005), (A/P: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Coconier 2006), (A/P: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: B. Hunzicker en WFVZ), (N: I. Macpherson en WFVZ), (N: S/C, DMNH), (A/P: L. Pagano obs. pers.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986), (N: S/C, WFVZ).

(b) (*Rhea pennata garleppi*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (A/P: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador 2015a)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001), (N: A. Bodrati in litt. 1999).

Orden TINAMIFORMES

Familia Tinamidae

Macuco

(*Tinamus solitarius solitarius*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: W. Partridge en MACN), (N: A. Bodrati in litt. 2013).

Tataupá Rojizo

(*Crypturellus obsoletus obsoletus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Chebez 1990b), (A/P y N: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Tataupá Listado

(*Crypturellus undulatus undulatus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (A/P: Bodrati y Del Castillo 2004), (S/D: Chatellenaz 2005).

Tataupá Chico

(*Crypturellus parvirostris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1980a)- **Misiones:** (A/P y N: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Tataupá Común

(*Crypturellus tataupa tataupa*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Abr., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fiora 1939), (S/D: Contino 1980)- **Salta:** (S/D: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1998 in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: C. Olrog en WFVZ), (N: S/C, FML)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.).

Colorada

(a) (*Rhynchosciurus rufescens rufescens*)

Distribución temporal: (Ago., Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N Y A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

(b) (*Rhynchosciurus rufescens pallescens*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1998)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 1994)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Pautasso 2000), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Smyth 1927), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Zelich en De la Peña y Montalti 2014), (Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: A. Bodrati in litt. 1995)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en De la Peña y Montalti 2014), (N: D. Garret en WFVZ)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007).

Guaiipo

(*Rhynchosciurus maculicollis*)

Distribución temporal: (Ene., Abr., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Salvador et al. en prensa), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929), (N: L. Dinelli en WFVZ).

Inambú Serrano

(*Nothoprocta ornata rostrata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1929), (N y A/P: Handford 1983), (J: Capllonch et al. 2011), (N: S/C, FML), (A/P: Salvador 2015a).

Inambú Montaraz

(a) (*Nothoprocta cinerascens cinerascens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- (S/D: Contreras et al. 2014)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (N: A. Bodrati in litt. 2001)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. per.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1929), (N: Lancaster 1964), (N: Capllonch 2007), (N: Capllonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (A/P: S. Pierotti en IML), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard, WFVZ), (N: C. Olrog en WFVZ), (N: S/C, IML)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1931), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Azategui en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: Salvador et al. en prep.), (N: A. Azategui in litt.)- **San Luis:** (N: Partridge 1953), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014)- **Mendoza:** (N: Reed 1921), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (A/P: Mayor 2015)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

(b) (*Nothoprocta cinerascens parvimaculata*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)

Inambú Silbón

(a) (*Nothoprocta pentlandii pentlandii*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: F. Contino en IML)- **Salta:** (N: Salvador y Narosky 1984), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1929), (N: Capllonch et al. 2011), (A/P: S. Pierotti en IML), (N: S/C, IML).

(b) (*Nothoprocta pentlandii doeringi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Cabanis 1878), (A/P: Castellanos 1931), (A/P: Banks y Bohl 1968), (N: Salvador y Narosky 1984), (N: Azategui en Salvador y Narosky 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Azategui en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (A/P: Nellar Romanella 1993).

(c) (*Nothoprocta pentlandii mendozae*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Reed 1919, 1921).

(d) (*Nothoprocta pentlandii patriciae*)

Nota: S/I

Inambú Pálido

(a) (*Nothura darwinii darwinii*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: S. Salvador obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: Bump y Bump 1969), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Uranga en De la Peña 2016a)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N y A/P: Daciuk 1978).

(b) (*Nothura darwinii salvadorii*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: C. Olrog en WVFZ)- **Tucumán:** (N: S/C, FML)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Córdoba:** (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014).

Inambú Común

(a) (*Nothura maculosa maculosa*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: R. Crossin en WVFZ), (N: D. Wilson in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: Zapata 1977), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Nothura maculosa paludivaga*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1997, 1998), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.).

(c) (*Nothura maculosa pallida*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: Col. Baer en WVFZ)- **Santiago del Estero:** (HF: S. Salvador obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Ramonella 1993)- **Mendoza:** (N: Reed 1921).

(d) (*Nothura maculosa annectens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Bump y Bump 1969), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000), (N: Bassi en Pautasso 2000), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (A/P: Castellanos

1931), (S/D: Ordano 1996), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Schefski 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Reed 1921)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1820), (N: Withington 1888), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Barrows 1884), (N: Holland 1892), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Gavio 1944), (N: Bump y Bump 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Gagliardi y Pereyra en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (N: Tolosa 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Torres 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: D. Garrett en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 1996), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007).

(e) (*Nothura maculosa nigroguttata*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

(f) (*Nothura maculosa submontana*)

Nota: S/I

Inambú Enano

(*Taoniscus nanus*)

Nota: S/I

Martineta Común

(a) (*Eudromia elegans elegans*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Casares 1944), (N: Partridge 1953), (N: Bolh 1970), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1935, 1937a), (N: Rumboll en Bohl 1970), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: De Volder 2015), (A/P: L. Pagano obs. pers.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Hudson 1872a), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (N: W. Dernelt en WFVZ), (N: C. Mercer en WFVZ).

(b) (*Eudromia elegans intermedia*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Grassini 2013), (N y A/P: S. Salvador obs. per.)- **Tucumán:** (J: Caplonch et al. 2011), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: M. Díaz en WFVZ), (N: D. Bull en WFVZ), (N: S/C, MVZ)- **Santiago del Estero:** (N: Navarro 2013), (N: A. Bodrati 2000 in litt.).

(c) (*Eudromia elegans albida*)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (N: Chimento 2014)- **San Juan:** (N: Bohl 1970), (S/D: Ortiz et al. 2003).

(d) (*Eudromia elegans multiguttata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1927), (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky, Krapovickas y Pastorino en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: S. Adams en WFVZ), (N: A. Ripley en WFVZ), (N: W. Russell en WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.).

(e) (*Eudromia elegans wetmorei*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Bolh 1970), (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (S/D: Sosa 2005), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

(f) (*Eudromia elegans patagonica*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: S. Herald y A. Beakley en WFVZ)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a, 1878b), (N: Zapata 1969), (N: Daciuk 1978), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Sainz Trápaga 2014), (N: S/C, FMNH), (N: M. Rumboll y J. Jehl en WFVZ), (N: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: De Luca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Straneck en De la Peña y Montalti 2014), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Martineta Chaqueña

(*Eudromia formosa formosa*)

Distribución temporal: (Ene., Abr., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Caplonch y Lobo Allende 2013)- **Santiago del Estero:** (N: Dinelli 1929), (A/P: Caplonch y Lobo Allende 2013), (A/P: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Lobo Allende y Caplonch 2016), (N: S/C, FML)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929).

Quiula Puneña

(*Tinamotis pentlandii*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N y A/P: Budin 1918), (A/P: F. Burgos en Gomes 2014), (A/P: F. Contino in litt.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador 2015a)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001).

Quiula Patagónico

(*Tinamotis ingoufi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011)- **Santa Cruz:** (N: Müller en Dabbene 1920), (A/P: Pozzi 1923), (A/P: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De Luca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Imberti 2003), (S/D: Coconier

2006), (A/P: Conway y Harris en Harris 2008), (A/P: Roesler et al. 2014), (N: G. Thomsen en WFVZ), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.), (A/P: S. Salvador obs. per.).

Orden ANSERIFORMES

Familia Anhimidae

Chajá

(*Chauna torquata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: F. Contino en IML)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: E. Depino et al. en eBird 2015d), (A/P: S. Pierotti en IML)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Corrientes:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: Pérez 2014) - **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (Salvador y Salvador en De la Peña 2016a), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Lamela 2012a, 2012b), (N: A. Bodrati in litt. 1996)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Durnford (1876a), (N: Gibson (1880, 1920), (N: Holland 1890, 1892), (N: Grant 1911), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Gavio 1944), (N: Weller 1967, 1968b), (N: Zuberbühler 1971), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Moreyra en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y Bosso en Babarskas et al. 2003), (N: Haene en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: Bodrati in litt. 1996), (N: Tager et al. 2007), (S/D: Josens et al. 2009), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Torres 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Familia Anatidae

Sirirí Colorado

(*Dendrocygna bicolor*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Höhn 1975), (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016a), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1937b, 1938), (N: Weller 1967, 1968b), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Angulián

2013), (A/P: Oscar 2014), (A/P: Gusano 2014), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Tagtachian 2015), (N: P. Canevari in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 1997), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (A/P: Sosa 2015), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Sirirí Pampa

(*Dendrocygna viduata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (S/D: Bodrati y Pietrek 2000, N: A. Bodrati in litt. 1999)- **Santiago del Estero**: (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes**: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000)- **Córdoba**: (N: Salvador 2012a), (A/P: Bustamante 2014) (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **Buenos Aires**: (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Maugeri 2003), (A/P: Gusano 2014), (A/P: Torres 2014), (N: P. Canevari in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Sirirí de Vientre Negro

(*Dendrocygna autumnalis discolor*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N y A/P: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1999, 2001, 2010) (A/P: Salvador en De la Peña 2016a)- **Corrientes**: (A/P: Olejnik 2011)- **Córdoba**: (N: Uranga en De la Peña 2013, 2016a).

Ganso Común

(*Anser anser*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz***: (N: Moroni y Salvador en prensa).

* Individuos asilvestrados

Cisne Cuello Negro

(*Cygnus melancoryphus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Jun., Jul., Ago., Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santiago del Estero**: (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba**: (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **San Luis**: (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (N: Darrieu et al. 1989), (N: Sosa 1995), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires**: (N: Gibson 1880, 1920), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (A/P: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (N y A/P: Tajer et al. 2007), (N: Josens et al. 2009), (N:

Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: A. Bodrati 1996 in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (N: Santos Gollan 1951), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Peters 1923), (A/P: Tocce 2015), (A/P: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c)- **Chubut:** (A/P: Durnford 1878b)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (A/P: Imberti 2005), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (N: M. Moroni in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (A/P: Weller 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (S/D: Clark 1986), (A/P: Eguia 2014), (N y A/P: M. Rumboll in litt.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Coscoroba

(*Coscoroba coscoroba*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N y AP: Rodríguez 2014), (AP: Mosquione en Rodríguez 2014)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Caplonch 2007), (N: Echevarría et al. 2013), (N: Echevarria 2014)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (A/P: Rumboll 1967), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (A/P: Fandiño y Pautasso 2011), (N y A/P: Merlino en De la Peña 2016a)- **La Rioja:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: Salvador 2012a), (N: De la Peña 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador en De la Peña 2016a)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (N: Sosa 1995), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1920), (N: Holland 1892), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1938), (N: Gavio 1944), (N: Weller 1967), (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Josens et al. 2009), (N: Olejnik 2011), (S/D: Furman y Bastías 2012), (A/P: Danti 2012), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Gusano 2014), (A/P: Ruggeri 2014), (N: H. Krohn en WFVZ), (N y A/P: M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari in litt.). (A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Dieser 2014)- **Neuquén:** (A/P: Bellotti 2015)- **Río Negro:** (A/P: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (N y A/P: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Mrs. Huntley en WFVZ)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008).

Ganso del Monte

(*Oressochen jubata*)

Nota: S/I

Guayata

(*Oressochen melanoptera*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (A/P: Fiora 1939), (N y A/P: Contino 1980 y com. pers.), (A/P: Carrillo 2014), (A/P: Bianchini y Arenas en De la Peña 2016a)- **Salta:** (N y A/P: Contino 1980 y com. pers.), (S/D: Moschione et al. 2013), (A/P: A. Bodrati 2007 in litt.)- **Catamarca:** (A/P: Andina 2015), (A/P: Salvador 2015a)- **Tucumán:** (A/P: Castillón 1918), (N y A/P: Budin en Casares 1934).

Cauquén Común

(a) (*Chloephaga picta picta*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (A/P: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005), (A/P: Muñiz 2015)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Tolosa 2011), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador en De la Peña 2016a), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: C. Mercer en WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (A/P: Inchaurraga 2013), (A/P: Schefski 2015), (N: P. Domínguez en M. Rumboll in litt.), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Casal en Casares 1935), (N: Zapata 1967), (N y A/P: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N y A/P: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (N: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: Fioramonti en Pautasso 2000), (S/D: Lancelotti et al. 2009), (N: Mc Cracken et al. 2012), (N: Agulián 2012), (N: Cossa et al. 2013), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: Bianchini en De la Peña 2016a), (N: M. Moroni in litt.), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N y A/P: Reynolds 1934, 1935), (N: Casal en Casares 1935), (A/P: Castellanos 1935), (N: Olrog 1948, 1950), (N: Ripley 1950), (N y A/P: Humphrey et al. 1970), (N y A/P: Weller 1975), (N: Parmelee et al. 1994), (N y A/P: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Eguia 2014), (A/P: Arena en De la Peña 2016a), (N: A. Johnson y J. Goodall en WFVZ), (N: A. Johnson en WFVZ), (N: M. Rumboll en WFVZ), (A/P: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

(b) (*Chloephaga picta leucoptera*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (A/P: Weller 1972), (A/P: Daciuk 1975), (A/P: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: C. E. S. en WFVZ), (A/P: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

Caranca

(a) (*Chloephaga hybrida hybrida*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (Reynolds en Casares 1934), (N y A/P: Castellanos 1935), (A/P: Olrog 1950), (N: Casal 1950), (A/P: Reynolds 1935), (N: Casal en Casares 1935), (N: Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (N: Liljesthröm et al. 2013), (A/P: Bahntje 2014).

(b) (*Chloephaga hybrida malvinarum*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N y A/P: Weller 1972), (A/P: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: S/C, MVZ), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

Cauquén Real

(*Chloephaga poliocephala*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (A/P: Vañeczek 2014), (N: Morgenstern en M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Salvador y S. Salvador en prep.), (A/P: Bianchini y Arenas en De la Peña 2016a)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Tocce 2013), (A/P: Militello 2015), (A/P: Diez Peña en De la Peña en prep.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (A/P: J. De Leonardis en eBird 2015g), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti 2005), (N: Harris 2008), (A/P: Fernández Guaraz 2011), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds en Casares 1934), (N: Olrog 1950), (A/P: Weller 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: Parmelee et al. 1994), (N: M. Rumboll y J. Jehl en WFVZ), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008).

Cauquén Colorado

(*Chloephaga rubidiceps*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (A/P: Imberti 2003), (A/P: Imberti et al. 2007)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (A/P: Olrog 1948), (N: Ripley 1950)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (A/P: Weller 1972), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: M. Stone en WFVZ).

Pato Real

(*Cairina moschata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (A/P: Fiora 1939)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (A/P: S. Pierotti en IML)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014), (A/P: A. Bodrati in litt. 2007)- **Misiones:** (A/P: Partridge 1954), (A/P: Partridge en Chebez 1992), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Anfuso y Elesegoood 2012), (N y A/P: A. Bodrati 2008 in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (A/P: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Grassini 2013).

Pato Crestudo

(*Sarkidiornis melanotos*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fiora 1939)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996)- **Formosa:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: S. Shipton en IML)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2006).

Pato de Collar

(*Callonetta leucophrys*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jul., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1971), (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016a)- **Santiago del Estero:** (A/P: Navarro 2016)- **Tucumán:** (N: S. Shipton en IML)- **Santa Fe:** (A/P: Rumboll 1967), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Uranga 2016)- **Entre Ríos:** (A/P: Cruz 2014), (A/P: Puente 2014)- **Buenos Aires:** (N: Blanco 1984), (N: Morici 1992, 2012b), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Dassatti 2012), (N: Pietraroja 2014), (A/P: Torres 2014), (N: R. Fraga in litt.), (N: A. Bodrati 2001 in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Pato Cutirí

(*Amazonetta brasiliensis ipecutiri*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Salvador en Cejas 2003), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016a)- **Chaco:** (HF: Weller 1968a), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1998)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (A/P: Salvador en Cejas 2003), (A/P: Merlino en De la Peña 2016a)- **Córdoba:** (N: Cejas 2003), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Méndez 2011)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (S/D: Haene en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Haene en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (A/P: Olejnik 2011), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (A/P: Varales 2015), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Pato de Torrente

(a) (*Merganetta armata armata*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005), (A/P: Serur 2012), (A/P: Álvarez et al. 2014), (A/P: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016a)- **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: Cerón en De la Peña 2016a)-

Río Negro: (N: Moffett 1969), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: Ojeda en Chebez 2009), (A/P: Costa 2011), (N: Cerón en De la Peña 2016a)-
Santa Cruz: (S/D: Imberti 2005), (N: Cerón en De la Peña 2016a)- **Tierra del Fuego:** (N: Bridges en Humphrey et al. 1970).

(b) (*Merganetta armata berlepschi*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N y A/P: Colina 2010), (A/P: Sardina Aragón et al. 2011), (A/P: A. Bodrati 2003 in litt.) (A/P: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Antoniazzi y Acosta en De la Peña 2016a), (A/P: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Caplonch 2007), (A/P: C. Olrog en IML), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (A/P: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1998).

Quetro Volador

(*Tachyeres patachonicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (A/P: Sosa 2003)- **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Segura 2014), (N: Motta et al. 2015), (A/P: Bianchini y Arenas en De la Peña 2016a) (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Petracchi y Pérez 1999), (N y A/P: Christie et al. 2004), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: Bertellotti et al. 1995), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (A/P: Juliano 2014), (N: Straneck en De la Peña 2016a), (N: M. Moroni in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Lancelotti et al. 2009), (A/P: Costa 2014), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds 1934), (N: Olrog 1950), (A/P: Humphrey et al. 1970), (A/P: Weller 1975, 1976), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: Parmelee et al. 1994), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Eguia 2014), (N: Liljesthröm et al. 2014)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (A/P: Weller 1972, 1976), (A/P: Daciuk 1975), (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008).

Quetro Austral

(*Tachyeres pteneres*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934, 1935), (N: Lowe 1934), (N y A/P: Castellanos 1935), (N: Olrog 1948, 1950), (N: Humphrey et al. 1970), (A/P: Weller 1975, 1976), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Coconier 2006), (N: Liljesthröm et al. 2013), (A/P: Grasso 2012), (N: Liljesthröm et al. 2014), (A/P: Arenas en De la Peña 2016a), (A/P: Bianchini y Arenas en De la Peña 2016a), (N: M. Rumboll in litt.).

Quetro Malvinero

(*Tachyeres brachypterus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N y A/P: Weller 1972, 1976), (S/D: Daciuk 1975), (A/P: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (N: S/C, WFVZ).

Quetro de Cabeza Blanca

(*Tachyeres leucocephalus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Daciuk 1976b), (N: Boswall y Maclever 1980), (N: Humphrey y Livezey 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Harris 2008), (N: Agüero et al. 2010, 2012), (Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Svagelj et al. 2012), (N: Agüero y García Borboroglu 2013), (A/P: Costa 2014), (N: Uranga en De la Peña 2016a), (N: Punta en De la Peña 2016a), - **Santa Cruz:** (A/P: Mazar Barnett en Imberti 2003).

Pato Crestón

(a) (*Lophonetta specularioides specularioides*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2013), (N: Uranga y Uranga en De la Peña 2016a)- **Río Negro:** (N: Hartert y Venturi 1909), (A/P: Bettinelli y Chebez 1986), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Gelain 2012b)- **Chubut:** (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N y A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: M. Rumboll in litt.), (N: H. Zamora en M. Rumboll in litt.), (N: M. Moroni in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (A/P: De Lucca y Saggese 1992), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Lancelotti et al. 2009), (A/P: Chimento 2013), (N: M. Rumboll in litt.), (N: M. Moroni in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Weller 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (S/D: Clark 1986), (A/P: Parmelee et al. 1994), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (N: M. Rumboll y J. Jehl en WFVZ)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N y A/P: Weller 1972), (A/P: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a).

(b) (*Lophonetta specularioides alticola*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Marcaida 2014), (N: Straneck en De la Peña 2016a), (N: T. Narosky in litt.), (N: Salvador 2015a), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (S/D: Coconier 2006)- **Tucumán:** (N: Budin en Hartert y Venturi 1909), (A/P: Esteban y Budin en Salvador 2015a), (N: L. Dinelli en WFVZ)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001)- **Mendoza:** (N: Navas y Bó 1998), (S/D: Sosa 2005), (A/P: Oscar 2012).

Pato de Anteojos

(*Speculanas specularis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: Budin en Casares 1935), (A/P: Christie et al.

2004), (A/P: Diez Peña en De la Peña 2016a), (A/P: A. Bodrati 1994 in litt.)- **Río**

Negro: (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Diez Peña en De la Peña 2016a)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

Pato Overo

(*Anas sibilatrix*)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Abr., May., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Wilson 1926)- **Córdoba:** (S/D: Torres y

Michelutti 2006), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N:

Nores e Yzurieta in litt.)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Entre Ríos:** (A/P: De la Peña

2013) (A/P: A. Bodrati 1991 in litt.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (A/P: Brewer 1997), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Jossens et al. 2009), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Segura 2014), (A/P: Torres 2014), (A/P: Gómez Umpierrez 2015), (A/P: Salvador y Narosky en De la Peña 2016a), (A/P: M. Rumboll in litt.)-

Neuquén: (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Brewer 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Gelain 2012b), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016a)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (N y A/P: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (A/P: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Imberti 2005), (A/P: Juliano 2014), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (A/P: Salvador y Narosky en De la Peña en prep.), (N: S. Shipton en IML), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (A/P: Keith en Humphrey et al. 1970), (A/P: Weller 1975), (A/P: Chebez y Gómez 1988), (A/P: Parmelee et al. 1994), (N: A. Johnson y J. Goodall en WFVZ)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (A/P: Weller 1972), (N: Woods 1982, 2006).

Pato Barcino

(a) (*Anas flavirostris flavirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Abr., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santiago del Estero:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:**

(N: De la Peña 2013), (N: Merlino en De la Peña 2016a)- **Córdoba:** (N y A/P: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (A/P: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N y A/P: Salvador 2012a, 2012e), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016a)- **San**

Luis: (S/D: Nellar Romanella 1993), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (N y A/P: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Grant 1911), (N: Dabbene 1918c), (N: Gibson 1920), (N: Smyth 1927), (N: Runnacles 1933), (N:

Pereyra 1938), (N: Runnacles en Casares 1940), (N: Zapata y Cabrera 1969), (A/P: McKinney y Brewer 1989), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (N: Aramburú 1990), (N: Morici 1992), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Port 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Port y Brewer 2004), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt.), (N: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014). (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén**: (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Río Negro**: (A/P: McKinney y Brewer 1989), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: De la Peña 2005b), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Tocce 2013), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut**: (S/D: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: J. De Leonardi en eBird 2015g)- **Santa Cruz**: (A/P: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (A/P: Militello 2015), (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego**: (J: Crawshay 1907), (S/D: Olrog 1950), (A/P: Humphrey et al. 1970), (A/P: Weller 1975)- **Islas Malvinas**: (S/D: Wace 1921), (A/P: Weller 1972), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008)- **Islas Georgias del Sur**: (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

(b) (*Anas flavirostris oxyptera*)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Set., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (A/P: Weller 1968a), (A/P: La Grotteria 2012), (N: Salvador 2015a)- **Salta**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (A/P: Andina 2012), (A/P: Salvador 2015a)- **Tucumán**: (N: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011).

Pato Maicero

(a) (*Anas georgica georgica*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur**: (N: Murphy 1916), (A/P: Weller 1972), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

(b) (*Anas georgica spinicauda*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Weller 1968a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Salta**: (A/P: Höy 1969)- **Tucumán**: (N: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000)- **Córdoba**: (S/D: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis**: (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (A/P: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires**: (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Gibson 1920), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (A/P: McKinney y Brewer 1989), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, A/P: A. Bodrati in litt.), (A/P: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici

2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Oscar 2014), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004), (N: Arenas y Bianchini en De la Peña 2016a), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (Wetmore 1926), (A/P: Bettinelli y Chebez 1986), (A/P: McKinney y Brewer 1989), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (NP: Mc Cracken et al. 2012), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (A/P: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (A/P: Bianchini y Arenas en De la Peña 2016a), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: M. Moroni in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Olrog 1950), (A/P: Humphrey et al. 1970), (A/P: Weller 1975), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a)- **Islas Malvinas:** (A/P: Weller 1972), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006).

Pato Gargantilla

(*Anas bahamensis rubrirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Jun., Jul., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: Höy 1969)- **Santiago del Estero:** (A/P: Olrog 1965)-

Santa Fe: (A/P: Rumboll 1967), (A/P: Fandiño y Pautasso 2011), (A/P:

Yngelmo 2012)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016a)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (A/P: Oscar 2011)-

Mendoza: (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1896), (S/D: Daguerre 1922), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Morici 2012b), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Gómez 2014), (A/P: Torres 2014)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Clark 1984, 1986).

Pato Punaño

(*Anas puna*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Abr.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Eguia 2014), (A/P:

Uranga en De la Peña 2016a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador 2015a).

Pato Capuchino

(a) (*Anas versicolor versicolor*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: Höy 1969), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (A/P: Di Giacomo 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (A/P: Salvador y Nores en de la Peña 2016a)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)-

Santa Fe: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Wilson 1926), (N: Rumboll 1967), (N: De la

Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a), (N: Salvador en De la Peña 2016a), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1938), (A/P: McKinney y Brewer 1989), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (A/P: Tajaer et al. 2007), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (A/P: Tolosa 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 1999), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Anas versicolor fretensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (A/P: Salvador y Narosky en De la Peña 2016a), (J: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (A/P: Weller 1972), (N: Woods 2006).

Pato Colorado

(a) (*Anas cyanoptera cyanoptera*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: S. Pierotti en IML)- **Santiago del Estero:** (A/P: Salvador y Nores en De la Peña 2016a)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Wilson 1926)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en de la Peña 2016a)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Gómez 2014)- **La Pampa:** (A/P: De la Peña 2005b), (A/P: Straneck en De la Peña 2016a)- **Río Negro:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006).

(b) (*Anas cyanoptera orinomus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Laredo 1987), (N y A/P: Caplonch 2007).

Pato Cuchara

(*Anas platalea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Rodríguez en De la Peña 2016a)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (A/P: Perez 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016a), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **San Luis:** (A/P: Oscar 2011)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (A/P: McKinney y Brewer 1989), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry

1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Torres 2014), (N: M. Canevari in litt.)- **La Pampa:** (S/D: Macea et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (A/P: Del Blanco 2014)- **Neuquén:** (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (A/P: McKinney y Brewer 1989), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Gelain 2012b), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (S/D: Clark 1986).

Pato Castaño

(*Netta erythrophthalma erythrophthalma*)

Nota: S/I

Pato Picazo

(*Netta peposaca*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Wilson 1926), (N: Rumboll 1967), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (HF: Marteleur et al. 1995), (N: Pautasso 2000), (A/P: Merlino en De la Peña 2016a)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Durnford 1878a), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1920, 1922, 1923), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967, 1968b), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N y A/P: A. Bodrati in litt.), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Lyon y Eadie 2013), (A/P: Américo 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Tolosa 2015), (N: M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (A/P: Dolsan 2015).

Pato Serrucho

(*Mergus octosetaceus*)

Distribución temporal: (Ago.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Giai 1950), (N y A/P: Partridge 1956a), (A/P: Partridge en Chebez 1990a).

Pato Cabeza Negra

(*Heteronetta atricapilla*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., May., Jun., Jul., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santiago del Estero:** (P: Olrog 1965)- **Tucumán:** (NP: Caplonch 2007)- **Santa Fe:** (NP: Wilson 1923b, 1924), (NP: Rumboll 1967), (NP: Höhn 1975), (NP: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (NP: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (NP: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (NP: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **Buenos Aires:** (NP: Holland 1890,

1892), (NP: Grant 1911), (NP: Rodríguez 1918b), (NP: Gibson 1920), (NP: Daguerre 1920, 1922, 1923), (NP: Dabbene 1921), (NP: Wilson (1923a, 1923b), (NP: Pereyra 1937b, 1938), (NP: Weller 1967, 1968b), (NP: Zuberbühler 1971), (NP: Morici 1992, 2012b) (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Josens et al. 2009), (NP: Lyon y Eadie 2004, 2013), (NP: Runnacles en Segura et al. 2014), (NP: P. Canevari in litt.), (PP: A. Bodrati in litt.), (PP y J: L. Pagano obs. pers.).

Pato Fierro

(*Nomonyx dominicus*)

Distribución temporal: (Ene., May., Set., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (J: L. Pagano obs. pers.)-

Misiones: (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al.

1998), (A/P: A. Bodrati in litt. 2012)- **Santiago del Estero:** (A/P: Olrog 1965)- **Santa**

Fe: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Merlino en De la

Peña 2016a)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (S/D: Rodríguez Mata en Narosky y Di

Giacomo 1993), (A/P: Marcaida 2015), (A/P: Tagtachian 2015).

Pato Zambullidor Grande

(*Oxyura jamaicensis ferruginea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: G. Höy en MZFC)-

Mendoza: (S/D: Sosa 2005)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al.

1998), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: Segura 2014), (A/P: Bellotti 2015)- **Río Negro:**

(N: Casas 1992a), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: Casa en De la Peña 2013)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Imberti 2005), (N:

Moroni y Salvador 2014), (J: L. Pagano obs. pers.).

Pato Zambullidor Chico

(*Oxyura vittata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., May., Jun., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Höy 1969)- **Salta:** (S/D: Höy 1969)- **Santiago**

del Estero: (A/P: Olrog 1965)- **Santa Fe:** (N: Rumboll 1967), (N: De la Peña 1987,

2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000)- **Córdoba:** (N y A/P: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N y A/P: Salvador 2012a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N:

Salvador en De la Peña 2016a)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:**

(N y A/P: Darrieu et al. (1989), (N: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N:

Holland 1892), (N: Gibson 1920), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967), (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (A/P: La Grotteria 2011), (S/D: Furman y Bastías 2012), (A/P: Agulián 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Cabrera 2015), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (A/P: Straneck en De la Peña 2016a)- **Neuquén:** (A/P: Bellotti 2014)- **Río Negro:** (N: Casas 1992a), (S/D:

Chebez et al. 1998), (N: Casas en De la Peña 2005b)- **Chubut:** (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (N: M. Moroni in litt.).

Orden GALLIFORMES
Familia Cracidae

Pava de Monte Andina

(*Penelope montagnii sclateri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Yacupoí

(*Penelope superciliaris major*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Partridge en Chebez 1990a), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012).

Pava de Monte Alisera

(*Penelope dabbenei*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)-
Jujuy: (N: Veiga et al. 2014).

Pava de Monte Común

(a) (*Penelope obscura bridgesi*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Olrog y Contino en Salvador 1991)- **Salta:** (N: Olrog y Budin en Salvador 1991), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (S/D: Dinelli 1929), (N: Pierotti en Salvador 1991), (N: Olrog y Budin en Salvador 1991), (N: Salvador 1991).

(b) (*Penelope obscura obscura*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Buenos Aires:** (N: Césari y Alonso 1975), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Yacutinga

(*Pipile jacutinga*)

Distribución temporal: (Ago., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (HF y A/P: Partridge en Chebez 1990a), (J: A. Bodrati 2005 in litt., A/P: M. J. Lammertink com. pers. a Bodrati in litt. 2013).

Charata

(*Ortalis canicollis canicollis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: F. Contino en IML)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-**Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: A. Bodrati in litt. 1999, 2002)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Girard en Dinelli 1929), (A/P: Caziani y Protomastro 1994), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: Guanuco en IML)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Schaaf et al. 2014), (A/P: Salvador et al. en prep.)- **La Rioja:** (N: Lucero 2012).

Muitú

(*Crax fasciolata fasciolata*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (A/P: Ramírez Llorens et al. 2003), (S/D: Contreras et al. 2014).

Familia Odontophoridae

Codorniz de California

(*Callipepla californica brunnescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Neuquén: (A/P: Navas 1971b), (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: De la Peña 2005b), (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013), (N: P. Sympton en M. Rumboll in litt.), (A/P: Bianchini y Arenas 2013)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Urú

(*Odontophorus capueira capueira*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Partridge en Chebez 1991), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: W. Partridge en MACN), (N: A. Bodrati y S. Salvador obs. per. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.).

Familia Phasianidae

Faisán Plateado

(*Lophura nycthemera*)

Nota: S/I

Orden PODICIPEDIFORMES
Familia Podicipedidae

Macá Común

(a) (*Rollandia rolland rolland*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N y J.: Woods 1975, 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N y A/P: Konter 2012), (N: S/C, WFVZ), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

(b) (*Rollandia rolland chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (J: Contreras et al. 2014)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (A/P: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N y A/P: Rumboll 1967), (N: Burger 1974a, 1974b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (J: Fandiño y Pautasso 2011), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2011a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (N: Reed 1921), (N: Darrieu et al. 1989), (A/P: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (A/P: Koehler 2014)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1920), (N y A/P: Dabbene 1916), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Petracchi y Basanta 2002), (A/P: Moreyra en Babarskas et al. 2003), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Danti 2013) (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: T. Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Rodríguez Moulín en De la Peña y Montalti 2014), (N: Tagtachian 2014), (A/P: Juliano 2014), (A/P: Carus 2014), (A/P: A. Bodrati in litt. 1993), (J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007), (A/P: L. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Casas en De la Peña y Montalti 2014), (A/P: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c)- **Santa Cruz:** (A/P: Imberti 2005), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Olrog 1948), (S/D: Olrog 1950), (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986), (N: Clark en De la Peña y Montalti 2014), (J: L. Pagano obs. pers.).

Macá Gris

(*Tachybaptus dominicus speciosus*)

Distribución temporal: (Feb., Abr., May., Ago., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (A/P: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (A/P: S. Salvador en De la Peña y Montalti 2014)- **Chaco:** (A/P: A. Bodrati in litt.)- **Misiones:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Heredia 2016)- **Tucumán:** (N: S. Shipton en IML)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Entre Ríos:** (A/P: Parera 1988)- **Buenos Aires:** (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Macá Pico Grueso

(*Podilymbus podiceps antarcticus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: R. Ramírez en eBird 2015f)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Catamarca:** (A/P: S. Pierotti en IML)- **Santiago del Estero:** (A/P: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Tucumán:** (A/P: Caplonch 2007), (N: Echevarria 2014), (N: S. Shipton en IML)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: S. Pierotti en IML), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (A/P: Rumboll 1967), (N: Burger 1974a, 1974b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **La Rioja:** (A/P: Bodrati y Ferrari 2014), (A/P: De Biagi 2015)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Nores y Cerana 2010), (N: Salvador 2011a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: S/C, MZFC), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (J: Zapata 1977)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (S/D: Sosa 2005)- **San Luis:** (S/D: Nellar Ramonella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Tager et al. 2007), (A/P: Preiz, 2013), (A/P: Danti 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: T. Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Martínez en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Torres 2014), (A/P: Gómez Umpierrez 2015), (J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Miller 2015).

Macá Grande

(a) (*Podiceps major major*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santiago del Estero:** (A/P: Gómez 2011), (N: Andina 2014), (A/P: Bustamante 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: T. Narosky in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Ruggeri 2014)- **La Rioja:** (A/P: Bodrati y Ferrari 2014)- **San Juan:** (A/P: Lucero y Izasa 2015)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N: Salvador 2011a), (N: De la Peña 2013), (N: Braidoti 2014), (A/P: Prancetti 2014), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)

Entre Ríos: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (A/P: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005), (A/P: Lucero y Izasa 2015)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1920), (N: Holland 1892), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N y A/P: Tajer et al. 2007), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Olejnik 2012, 2014), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: T. Narosky in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (A/P: Dolsan 2015), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Gelain 2012b), (N: J. Pemberton en MVZ).

(b) (*Podiceps major navasi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: C. Nilson en WFVZ), (A/P: A. Bodrati in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y AP: Christie et al. 2004), (A/P: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c), (N: C. Nilson en WFVZ)- **Chubut:** (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934), (S/D: Olrog 1950), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Clark en De la Peña y Montalti 2014).

Macá Plateado

(a) (*Podiceps occipitalis occipitalis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: Höy 1969), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santa Fe:** (N: Burger 1974b)- **Córdoba:** (N: Nores y Yzurieta 1977), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N: Salvador 2011a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (A/P: Sosa 1993), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Runnacles en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Darrieu et al. 2001), (N: Danti 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Casas en De la Peña y Montalti 2014)- **Santa Cruz:** (N: Lange 1981), (N: Nuechterlein y Johnson 1981), (S/D: Imberti 2005), (S/D: Lancelotti et al. 2009), (N: Chimento 2013), (N: Wessels 2013), (N: Militello 2015), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1975, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Podiceps occipitalis juninensis*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Catamarca:** (S/D: Coconier 2006), (N: Polverini 2013)- **Tucumán:** (A/P: Esteban y Budin en Olrog 1949), (A/P: S/D, FML).

Macá Tobiano

(*Podiceps gallardoi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (N: Lange 1981), (N: Storer 1981, 1982), (A/P: Nuechterlein y Johnson 1981), (N: Erize 1983), (N: Fjeldsa 1986), (N: Beltrán et al. 1992), (N: Bremer y Bremer en Beltrán et al. 1992), (N: Johnson en Beltrán et al. 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Lancelotti et al. 2009), (N: Roesler et al. 2012), (N: Militello 2014, 2015), (N: Roesler et al. 2014), (N: Johnson en De la Peña y Montalti 2014), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.).

Orden PHOENICOPTERIFORMES

Familia Phoenicopteridae

Flamenco Austral

(*Phoenicopterus chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Mascitti y Nicolossi 1992), (N: A. Bodrati in litt. 1996)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (S/D: Coconier 2006)- **Santa Fe:** (N: Harper y Drable 1936), (N: Maugeri et al. 2009), (N: Pautasso 2011), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), - **Córdoba:** (N: Ward 1941), (N: Salvetti 1975), (N: Bucher 1992, 2006), (N: Cobos et al. 1999), (N: Bucher et al. 2000), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (S/D: Coconier 2006), (N: Bucher y Curto 2012)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Sosa 1995, 1999, 2005), (N: Sosa y Martín 2010, 2011)- **Buenos Aires:** (N: Harper en Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Pagano y Mérida 2009), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 1993), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (J: Christie et al. 2004)- **Santa Cruz:** (N: Müller en Dabbene 1920), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Parina Grande

(*Phoenicoparrus andinus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Coconier 2006), (N: Caziani et al. 2007)- **Catamarca:** (N: Marconi y Clark 2011)- **La Rioja:** (N: Bucher et al. 2000)- **Córdoba:** (N: Cobos et al. 1999)- **Mendoza:** (N: Sosa y Martín 2010).

Parina Chica

(*Phoenicoparrus jamesi*)

Distribución temporal: (Feb.)

Jujuy: (S/D: Coconier 2006), (N: Derlindati et al. 2010)- **Salta:** (N: Derlindati et al. 2010), (S/D: Moschione et al. 2013)- **La Rioja:** (S/D: Coconier 2006).

Orden SPHENISCIFORMES

Familia Spheniscidae

Pingüino Rey

(*Aptenodytes patagonicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (A/P: Daciuk 1975) (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009). **Islas Atlántico Sur:** (N: Woehler 1993), (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.).

Pingüino Emperador

(*Aptenodytes forsteri*)

Distribución temporal: (Jul.)

Distribución territorial: **Península Antártica:** (N: Woehler 1993), (N: Coria y Montalti 2000).

Pingüino de Vincha

(a) (*Pygoscelis papua papua*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1998), (N: Ghys et al. 2008)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Woods 1975, 2006), (N: Otley et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009).

(b) (*Pygoscelis papua ellsworthi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Carcelles 1931), (N: Olrog 1958), (N: Aguirre 1995), (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Quintana y Cirelli 2000), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Quintana 2001), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Coria et al. 2011).

Pingüino de Ojo Blanco

(*Pygoscelis adeliae*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Atlántico Sur:** (N: Aguirre 1995), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Península Antártica:** (A/P: Olrog 1958), (N: Woehler 1993), (N: Quintana et al. 2000), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Coria et al. 2011).

Pingüino de Barbijó

(*Pygoscelis antarcticus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Carcelles 1931), (N: Olrog 1958), (S/D: Price y Croxall 1990), (N: Aguirre 1995), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Coria et al. 2011).

Pingüino Patagónico

(*Spheniscus magellanicus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Río Negro:** (S/D: Coconier 2006), (N: Pozzi et al. 2015)-

Chubut: (N: Korschenewski 1969a, 1969b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Boswall y Maclever 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: Scolaro 1979, 1984, 1990), (N: Scolaro et al. 1980, 1984), (N: Gochfeld 1980), (N: Badano et al. 1982), (N: Daciuk 1983), (N: Rodríguez 1983), (N: Scolaro y Arias de Reyna 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Capurro et al. 1988), (N: Boesma et al. 1990), (N: Frere et al. 1992, 1996), (N: Yorio y Dee Boesma 1994a, 1994b), (N: Carribero et al. 1995), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Yorio et al. 2001), (N: García Borboroglu et al. 2002), (S/D: Coconier 2006), (N: M. Rumboll in litt.), (N: H. Zamora en M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Doello Jurado 1917), (N: Zapata 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Frere et al. 1996), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (N: Gandini et al. 1997, 1999), (N: Schiavini et al. 1998), (N: Fioramonti en Pautasso 2000), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (N: Barrionuevo y Frere 2014)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Castellanos 1935), (N: Olrog 1950), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (S/D: Clark 1986), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1999), (S/D: Coconier 2006), (N: Sciosa et al. 2010)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Woods 1975, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Pingüino de Penacho Amarillo

(*Eudyptes chrysocome chrysocome*)

Distribución temporal: (Ene. Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (N: Frere et al. 1993), (N: Gandini y Frere 1998), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Falabella et al. 2009), (A/P: Bianchini y Arenas en De la Peña 2016a), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986), (N: Schiavini et al. 1998), (N: Schiavini et al. 1999), (S/D: Falabella et al. 2009)- **Islas**

Malvinas: (S/D: Wace 1921), (N: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Straneck en De la Peña 2016a).

Pingüino Frente Dorada

(*Eudyptes chrysolophus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986)- **Islas Malvinas:** (S/D:

Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008)- **Islas**

Atlántico Sur: (N: Bennett 1920), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012)-

Península Antártica: (N: Coria et al. 2011).

Orden PROCELLARIFORMES

Familia Diomedeidae

Albatros Errante

(*Diomedea exulans*)

Distribución temporal: (Oct., Dic., Ene.)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur:** (N: Carcelles 1931), (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012).

Albatros de Manto Claro

(*Phoebetria palpebrata*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur:** (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012).

Albatros Ceja Negra

(*Thalassarche melanophris melanophris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Clark 1986)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009)- **Islas Georgias del Sur:** (N: Tickell y Pinder 1975), (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012).

Albatros de Cabeza Gris

(*Thalassarche chrysostoma*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (N: Daciuk 1975)- **Islas Georgias del Sur:** (N: Tickell y Pinder 1975), (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012).

Familia Procellariidae

Petrel Gigante Común

(*Macronectes giganteus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Punta y Saravia 1991), (N: Yorio et al. 1998c), (S/D: Coconier 2006), (N: Patterson et al. 2008), (N: Copello y Quintana 2009), (S/D: Falabella et al. 2009)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986), (N: Schiavini et al. 1998), (N: Schiavini et al. 1999), (S/D: Coconier 2006), (N: Patterson et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: Patterson et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009)- **Islas del Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Aguirre 1995), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Soave et al. 2000), (N: Patterson et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Patterson et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Coria et al. 2011).

Petrel Gigante Oscuro

(*Macronectes halli*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (N: Woods 1982, 2006)- **Islas Georgias del Sur:** (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Patterson et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012).

Petrel Plateado

(*Fulmarus glacialisoides*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Creuwels et al. 2007)- **Península Antártica:** (N: Creuwels et al. 2007).

Petrel Damero

(*Daption capense capense*)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Olrog 1958), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Paz Barreto 1997), (N: García Espónida et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: Straneck en De la Peña 2016a)-

Península Antártica: (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Coria et al. 2011).

Petrel Blanco

(*Pagodroma nivea nivea*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012)- **Península Antártica:** (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana et al. 2000), (N: Coria et al. 2011).

Petrel Azulado

(*Halobaena caerulea*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur:** (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Prión Pico Corto

(*Pachyptila turtur*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (N: Strange 1968), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008)- **Islas Georgia del Sur:** (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Prión de Pico Grande

(*Pachyptila desolata banksi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur:** (N: Liddle 1994), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Prión Pico Fino

(*Pachyptila belcheri*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Quillfeldt et al. 2003), (N: Catry et al. 2007), (N: Otley et al. 2008).

Petrel Barba Blanca

(*Procellaria aequinoctialis*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 2006), (N: Reid et al. 2007), (N: Otley et al. 2008), (S/D: Falabella et al. 2009)- **Islas Georgias del Sur:** (S/D: Price y Croxall 1996), (S/D: Falabella et al. 2009), (N: Clarke et al. 2012).

Pardela Oscura

(*Ardenna griseus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Olrog 1950), (S/D: Clark 1986)- **Islas Malvinas:** (N: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1988, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: C. Olrog in litt.).

Pardela de Capucho Negro

(*Ardenna gravis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1975, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Familia Hydrobatidae

Paiño de Vientre Negro

(*Fregetta tropica tropica*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Olrog 1958), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: Olrog en De la Peña y Montalti 2014)- **Península Antártica:** (N: Coria et al. 2011).

Paiño Común

(a) (*Oceanites oceanicus oceanicus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Tierra del Fuego: (N: Reynolds 1935), (S/D: Clark 1986)-
Islas Malvinas: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1988, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Oceanites oceanicus exasperatus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: Islas del Atlántico Sur: (N: Bennett 1920) (N: Olrog 1950), (N: Aguirre 1995), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: Olrog en De la Peña y Montalti 2014), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.)-

Península Antártica: (N: Olrog 1958), (N: Coria y Montalti 1993), (N: Coria et al. 1996), (N: Orgeira 1997), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Coria et al. 2011).

Paíño Gris

(*Garrodia nereis*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Islas Malvinas: (N: Olrog 1958), (N: Woods 1982, 1975, 1988, 2006), (N: Otley et al. 2008)- **Islas Georgias del Sur:** (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Familia Pelecanoididae

Yunco Común

(a) (*Pelecanoides urinatrix berard*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Islas Malvinas: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1975, 1988, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Pelecanoides urinatrix exul*)

Distribución temporal: (Dic., Ene.)

Islas Georgias del Sur: (N: Payne y Prince 1979), (N: Roby y Ricklefs 1983), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Yunco Geórgico

(*Pelecanoides georgicus*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: Islas Georgias del Sur: (N: Payne y Prince 1979), (N: Roby y Ricklefs 1983), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Yunco de Cejas Blancas

(*Pelecanoides magellani*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: Tierra del Fuego: (N: Reynolds 1935), (S/D: Clark 1986), (N: Olrog en De la Peña y Montalti 2014).

Orden CICONIFORMES
Familia Ciconidae

Cigüeña Americana

(*Ciconia maguari*)

Distribución temporal: (Ene., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt.)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Corrientes:** (N: Kahl 1971), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: M. Rumboll in litt.), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: Prancetti 2011), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927)- **Mendoza:** (N: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Holland 1892), (N: Fernández 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967), (N: Narosky 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Zanelo y Juber en Babarskas et al. 2003), (N: de la Peña 2005b, 2013), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Martínez en De la Peña y Montalti 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.).

Yabirú

(*Jabiru mycteria*)

Distribución temporal: (May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Juszczuk 2014), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N y J: A. Bodrati in litt. 1997, 1999), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: S. Shipton en IML)- **Corrientes:** (N: Kahl 1971), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: La Grotteria 2014), (N: Oscar 2014), (N: K. Cockle y A. Bodrati in litt. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2004a, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2011), (N: Merlino en De la Peña y Montalti 2014), (N: Merlino 2014).

Tuyuyú

(*Mycteria americana*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N y J: A. Bodrati in litt. 1998, 2000)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres et al. 2010)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001,

2006)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927)- **Buenos Aires:** (S/D: Daguerre 1922), (S/D: Fraga en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Fraga en De la Peña y Montalti 2014).

Familia Phalacrocoracidae

Cormorán Gris

(*Phalacrocorax gaimardi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (N: Doello Jurado 1917), (N: Zapata 1965b, 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: Devillers y Terschuren 1978), (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Gandini y Frere 1995, 1998), (N: Albrieu y Navarro 1997), (N: Frere y Gandini 1998, 2001), (S/D: Coconier 2006), (N: Millones et al. 2008, 2010), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Biguá

(*Phalacrocorax brasiliensis brasiliensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Mosqueira et al. 1987), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santiago del Estero:** (N: Olrog 1965), (N: Torres et al. 2010)- **Tucumán:** (N: Echevarria 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: Torres y Michelutti 2006), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Bó 1956a), (N: Aramburu y Bó 1961)- **San Luis:** (N: Nellar Ramonella 1993)- **Buenos Aires:** (S/D: Roda y López Lanús en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Furman y Bastías 2012)- Neuquén: (N: De Volder 2015)- **Río Negro:** (N: González et al. 1998), (S/D: Coconier 2006)- **Chubut:** (N: Aramburu y Bó 1961), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1994), (N: Yorio y Quintana 1996), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Quintana et al. 2002), (S/D: Coconier 2006)- **Santa Cruz:** (N: Doello Jurado 1917), (N: Daneri 1959), (N: Zapata 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Albrieu y Navarro 1997), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Rumboll in litt.), (N: H. Zamora en M. Rumboll in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986), (N: Clark en De la Peña y Montalti 2014).

Cormorán de Cuello Negro

(*Phalacrocorax magellanicus*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: Devillers y Terschuren 1978), (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Sielgel Causey 1986), (N: Abril 1994), (N: Yorio et al. 1994), (N: Malacalza 1995), (N: Libenson 1997), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Sapoznikow y Quintana 2002, 2009), (N: Punta et al. 2003), (N: Punta et al. 2003), (S/D: Coconier 2006), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: Devillers y Terschuren 1978), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Punta y Saravia 1993), (N: Albrieu y Navarro 1997), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Coconier 2006), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Olrog 1948, 1950), (N: Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (S/D: Clark 1986), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Guanay

(*Phalacrocorax bougainvillii*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Rodríguez Mata y Erize en Navas 1970a), (N: Erize 1972), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Daciuk 1977a), (N: Devillers y Terschuren 1978), (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1994), (N: Yorio et al. 1998b), (S/D: Coconier 2006), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Rumboll in litt.).

Cormorán Imperial

(a y b) (*Phalacrocorax a. atriceps-P. a. albiventer*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Giai en Pereyra 1950), (N: Navas 1970b, 1971b), (N: Rasmussen et al. 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: Frixione 2010)- **Chubut:** (N: Korschenewski 1969b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: Devillers y Terschuren 1978), (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Malacalza 1984), (N: Rasmussen et al. 1992), (N: Abril 1994), (N: Yorio et al. 1994), (N: Malacalza y Navas 1996), (N: Libenson 1997), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (S/D: Coconier 2006), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Doello Jurado 1917), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: Daciuk 1977b), (N: Devillers y Terschuren 1978), (N: de la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013), (N: Arrighi y Navarro 1998), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (N: Punta et al. 2003), (N: Punta et al. 2003), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Reynolds 1934), (N: Olrog 1948, 1950), (N: Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: Clark 1984, 1986), (N: Chebez y Gómez 1988), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1998), (N:

Schiavini et al. 1999), (S/D: Coconier 2006)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Cormorán Antártico

(*Phalacrocorax bransfieldensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Olrog 1958), (N: Casaux y Barrera Oro 1993), (N: García Esporda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Casaux et al. 2002), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Straneck en De la Peña y Montalti 2014), (N: Montalti en De la Peña y Montalti 2014).

Cormorán de Georgia

(*Phalacrocorax georgianus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur:** (N: Olrog 1958), (N: Carcelles 1931), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012)- **Península Antártica:** (N: Coria et al. 2011).

Familia Anhingidae

Aninga

(*Anhinga anhinga anhinga*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Abr., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1998)- **Corriente:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Parera y Bosso 1996), (N: Zelich en De la Peña y Montalti 2014), (N: A. Bodrati in litt. 1997)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1980a, 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Salvador et al. 1985)- **Buenos Aires:** (N: López Lanús y Roda 1987).

Familia Ardeidae

Hocó Colorado

(a) (*Tigrisoma lineatum lineatum*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (J: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (J: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1998, 1999)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Puente 2014), (N: Rovira 2015)- **Buenos Aires:** (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Rodríguez Mata en Narosky y Di

Giacomo 1993), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt.), (N: Polverini 2011), (S/D: DECB 2011), (N: Aparicio 2013), (N: Valpredra 2013).

(b) (*Tigrisoma lineatum marmoratum*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: García 2011).

Hocó Oscuro

(a) (*Tigrisoma fasciatum fasciatum*)

Nota: S/I

(b) (*Tigrisoma fasciatum pallescens*)

Distribución temporal: (Jun., Ago.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (J: Caplonch 1997).

Garza Cucharona

(*Cochlearius cochlearius cochlearius*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: White 2001)- **Chaco:** (N: Chebez 2009).

Mirasol Grande

(*Botaurus pinnatus pinnatus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 1997, 2005)- **Chaco:** (A/P: A. Bodrati 1999 in litt.)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: E. Sierra 1999, 2003 in litt.)- **Buenos Aires:** (S/D: Rodríguez Mata en Narosky y Di Giacomo 1993).

Mirasol Chico

(*Ixobrychus exilis erythromelas*)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (J: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)-

Chaco: (A/P: A. Bodrati in litt. 2000)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001).

Mirasol Común

(*Ixobrychus involucris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (J: A. Bodrati in litt. 2001)-

Tucumán: (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1980b, 1987,

2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **San Juan:** (N: S/C, WFVZ)- **Córdoba:** (S/D:

Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Rmanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al.

1984), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Withington 1888), (N:

Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Klimaitis en De la Peña y Montalti 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: M. Rumboll in litt.).

Garza Bruja

(a) (*Nycticorax nycticorax hoactli*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (De la Peña 2005b)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996)- **Santiago del Estero:** (N: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres et al. 2010)- **Tucumán:** (N: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (N: Parera y Bosso 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Olrog 1965), (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (J: Fandiño y Pautasso 2011), (N: A. Bodrati in litt. 1996)- **La Rioja:** (N: A. Bodrati obs, pers 2013)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres y Michelutti 2006), (N: De la Peña 2005b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **San Juan :** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: Bó 1956b), (N: Aramburú y Bó 1961), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Beltzer et al. 1997)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1984), (N: Sosa 1993)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Gavio 1944), (N: Weller 1967, 1968b), (N: López Lanús y Roda 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Fraga en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 2015).

(b) (*Nycticorax nycticorax obscurus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (J: Christie et al. 2004), (N: M. Rumboll in litt.), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (N: González et al. 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (J: Christie et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Gelain 2012b)- **Chubut:** (N: Daciuk 1973b, 1977a, 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Bertellotti et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014)- **Santa Cruz:** (N: Doello Jurado 1917), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (S/D: Coconier 2006)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934, 1935), (N: Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986).

(c) Garza Bruja (*Nycticorax nycticorax falklandicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

Garcita Azulada

(*Butorides striata striata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Jul., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (N: Di Giacomo 2005), (J: Chatellenaz 2008), (S/D: Contreras et al. 2014)-

Chaco: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti

2014), (N: A. Bodrati in litt. 1998, 1999)- **Misiones:** (N: A. Bodrati in litt. 2009, 2011)-

Santiago del Estero: (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: Agulian 2012), (N: Muñiz 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: C. Ferrari y S.

Vitale in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: Beltzer 1991), (N: Mossó y Beltzer 1992), (N: Beltzer et al. 2005), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2002), (Olguín et al. 2015)- **Córdoba:** (N: Torres y Gutiérrez 1998), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: Torres et al. 2010), (S/D: Salvador y Salvador

2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador, Nores e

Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Zapata 1977), (N: Salvador et al. 1985), (N: A. Bodrati in litt. 1995)-

San Luis: (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Grant 1911), (N: Pereyra 1938), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 1996, 1998), (N: Tájer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Klimaitis en De la Peña y Montalti 2014), (N: Rodríguez Moulín en De la Peña y Montalti 2014), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Garcita Bueyera

(*Bubulcus ibis ibis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (J: Bodrati et al. 2010), (N: La Grotteria 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1997, 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres et al. 2010)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Bollero y Ramírez 2012), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Nores y Yzurieta 1979c), (N: Torres y Gutiérrez 1999), (N: Torres y Mangeau 2006), (N: Torres y Michelutti 2006) (N: Narosky en De la Peña en pren.), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Salvador et al. 1985), (N: A. Bodrati in litt. 1995)-

Mendoza: (N: Darrieu et al. 1984), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Narosky 1973b), (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: López Lanús y Roda 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Padín y Iriart 1996), (N: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **La Pampa:** (N: S. Salvador obs. pers.).

Garza Mora

(*Ardea cocoi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Misiones: (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (J: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres et al. 2010)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Olrog 1965), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en MVZ), (N: S/C, IML)- **Corrientes:** (N: Parera y Bosso 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Olrog 1965), (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: Yngelmo 2013)- **Córdoba:** (N: Torres y Michelutti 2006) (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Bó 1956a), (N: Aramburú y Bó 1961), (N: Salvador et al. 1985), (N: De la Peña 1987)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1984), (S/D: Sosa 2005)-

Buenos Aires: (N: Gibson 1880), (N: Pereyra 1937b, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati y E. Mérida in litt. 1998), (N: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (N: Pretelli et al. 2012), (N: Godoy et al. 2012), (N: Di Fiore 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador y Narosky en De la Peña y Montalti 2014) (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Ferrada 2012).

Garza Blanca

(*Ardea alba egretta*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (J: Bodrati y Pietrek 2000 y N: A. Bodrati in litt.), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres et al. 2010)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (N: Parera y Bosso 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: Olrog 1965), (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres y Michelutti 2006), (N: Torres y Mangeau 2006), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Salvador et al. 1985), (N: Di

Giácomo, Döke, Hales y Henschke en De la Peña 2016b)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu *et al.* 1984), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Daguerre 1935), (N: Pereyra 1937b ,1938), (N: Gavio (1944), (N: Weller 1967, 1968b), (N: Burger 1974a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: López Lanús y Roda 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Josens *et al.* 2009), (S/D: DECB 2011), (N: Pretelli *et al.* 2012), (N: Alcantara 2013), (N: Runnacles en Segura *et al.* 2014), (N: Martínez en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Fraga en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Earnshaw in litt.)- **Río Negro:** (González *et al.* 1998), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos *et al.* 2011)- **Chubut:** (N: Korschewski 1969b), (N: Daciuk 1976, 1977a, 1977b), (N: Upton y Beloso 1984), (N: Bertellotti *et al.* 1995), (N: Yorio *et al.* 1998c), (N: Harris 2008), (N: Carpi en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Rumboll in litt.).

Chiflón

(*Syrigma sibilatrix sibilatrix*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fernández Campos 2015)- **Salta:** (S/D: Moschione *et al.* 2013)- **Formosa:** (N: Salvador y Narosky en Di Giácomo 1988), (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras *et al.* 2014), (N: A. Bodrati in litt 2015)- **Misiones:** (N: Bodrati *et al.* 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Corrientes:** (N: Zapata 1965), (N: Wilson 1975), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz *et al.* 2010), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: M. Christie en M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador *et al.* 2015), (N: S. Salvador y L. Salvador en pren.)- **Entre Ríos:** (N: Zelich en De la Peña y Montalti 2014), (N: Galigniana 2014), (N: A. Bodrati in litt 2015)- **Buenos Aires:** (N: Di Giácomo 1988), (N: Narosky y Carman en Di Giácomo 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez *et al.* 1998), (N: Moreyra en Babarskas *et al.* 2003), (N: Zanello y Juber en Babarskas *et al.* 2003), (S/D: Bodrati *et al.* 2006, N: A. Bodrati in litt 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano *et al.* 2012), (N: Danti 2013), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Larramendy 2014), (N: R. Fraga in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Bruno *et al.* 2007), (N: Salvador *et al.* 2015), (N: Cervio 2015).

Garza Real

(*Pilherodius pileatus*)

Nota: S/I

Garcita Blanca

(*Egretta thula thula*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santiago del Estero:** (N: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres et al. 2010)- **Tucumán:** (N: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (N: Parera y Bosso 1996), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: Olrog 1965), (N: De la Peña 1980b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Bollero y Ramírez 2012), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Torres y Michelutti 2006) (N: Torres y Mangeau 2006), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Salvador et al. 1985), (N: Di Giacomo, Dokes, Hales y Hensche en De la Peña en pren.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1984), (N: Sosa 1995), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: White 1882), (N: Daguerre 1922, 1935), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967, 1968b), (N: Narosky 1969), (N: Narosky et al. 1973), (N: Burger 1974a), (N: De la Peña 1980b), (N: López Lanús y Roda 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (N: Martínez en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Garza Azul

(*Egretta caerulea*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (A/J: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Familia Threskiornitidae

Cuervillo de Cañada

(*Plegadis chihi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 2001 in litt.)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Burger y Miller 1977), (N: Bollero y Ramírez 2012), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Molli en De la Peña y Montalti 2014), (N: W. Cejas in litt.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1896), (N: Daguerre 1922, 1934), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1937b, 1938), (N: Gavio 1944), (N: Mac Donagh 1944), (N: Weller 1967, 1968b), (N: Narosky 1969), (N: Burger 1974a), (N: López Lanús y Roda 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky, Saibene y Luciano en De la Peña y Montalti 2014), (N: Martínez en De la Peña y Montalti 2014).

Cuervillo Puneño

(*Plegadis ridgwayi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 2005b, 2013).

Tapicurú

(*Mesembrinibis cayennensis*)

Distribución temporal: (Ene., Set.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Ramírez Llorens et al. 2003)- **Misiones:** (N: Heredia 2012).

Cuervillo Cara Pelada

(*Phimosus infuscatus infuscatus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: A. Bodrati 1998 in litt.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006)- **Entre Ríos:** (N: A. Bodrati 1998 in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Daguerre 1934), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Josens et al. 2009), (N: Narosky en De la Peña y Montalti 2014), (N: A. Bodrati 1997 in litt.).

Bandurria Mora

(*Theristicus caerulescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980 e in litt.)- **Salta:** (N: Contino 1980 e in litt.); (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005, 2011)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880).

Bandurria Boreal

(*Theristicus caudatus hyperorius*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Córdoba:** (Castellanos 1931), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999).

Bandurria Austral

(*Theristicus melanopis melanopis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Sosa 1995), (S/D: Sosa 2005)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Donázar et. al. 1994, 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: Dupuy en De la Peña 2016a), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Sainz Trápaga 2014)- **Santa Cruz:** (N: Frere et al. 1992), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: Imberti 2005), (S/D: Coconier 2006), (N: Harris 2008), (N: M. Rumboll in litt.), (N: M. Moroni in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (S/D: Clark 1986), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Clark en de la Peña y Montalti 2014), (N: M. Rumboll in litt.).

Espátula Rosada

(*Platalea ajaja*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Santiago del Estero:** (N: Torres et al. 2010)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: Olrog 1965)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Pereyra 1937b, 1938), (N: Gavio 1944), (N: Weller 1967, 1968b), (N: Narosky 1969), (N: Burger 1974a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: López Lanús y Roda 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Martínez en De la Peña y Montalti 2014), (N: Narosky e Yzurieta en De la Peña y Montalti 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.).

Orden CATHARTIFORMES

Familia Cathartidae

Jote de Cabeza Colorada

(a) (*Cathartes aura ruficollis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo en Moroni y Salvador 2014), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt 2015), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 2003 y 2010 in litt.).

(b) (*Cathartes aura iota*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Lillo en Salvador 1990)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Harper en Pereyra 1950), (N: Mezquida 2000), (S/D:

Sosa 2005)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Sarasola et al. 2000)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Luca et al. 2012b)- **Chubut:** (N: Moroni y Salvador 2014)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Johansen en Humphrey et al. 1970), (S/D: Clark 1986).

(c) (*Cathartes aura falklandicus*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Jote de Cabeza Amarilla

(*Cathartes burrovianus urubitinga*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Yanosky 1987), (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Uranga en De la Peña 2013) (N: A. Bodrati 2000 in litt.)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: A. Bodrati 1999 in litt.)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Jote de Cola Larga

(*Cathartes melambrotus*)

Nota: S/I

Jote Cabeza Negra

(*Coragyps atratus foetens*)

Distribución temporal: (Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Bodrati 2004 in litt.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1997 in litt.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Shipton en Salvador 1990), (N: Girard en Salvador 1990), (N: Lillo en Salvador 1990), (N: Pierotti en Salvador 1990), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Merlino en De la Peña 2013)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: A. Azategui in litt.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005), (N: Zanotti 2014), (N: Isola 2015)- **Buenos Aires:** (N: Belenguer y Zalba 1997), (N: Zapata 2002)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1927c, 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (N: Petracci et al. 2004)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: García 2012), (N: De Lucca 2016b).

Jote Real

(*Sarcoramphus papa*)

Distribución temporal: (Ene., May.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Olrog 1985)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (J: Bodrati et al. 2010), (J: Earnshaw 2014)- **Chaco** (A/P: Bodrati 2005a)- **Tucumán:** (N: Ortiz y Caplonch 2007).

Cóndor

(*Vultur gryphus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N y J: Caplonch 2007), (N: Ortiz y Caplonch 2007)- **La Rioja:** (A/P: L. Pagano in litt.)- **Córdoba:** (S/D: Castellanos 1931), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Heredia y Piedrabuena 2010)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Neuquén:** (N: Jakus en Veiga y Dupuy 2009)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Lambertucci y Mastrantuoni 2008), (N: Gelain en De la Peña 2016b)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Imberti 2005), (N: M. Rumboll in litt.)- **Tierra del Fuego:** (S/D: Clark 1986).

Orden ACCIPITRIFORMES

Familia Accipitridae

Milano Blanco

(*Elanus leucurus leucurus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Girard en Salvador 1990), (N: Caplonch 2007), (N: Ortiz y Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Withington 1888), (N: Pereyra 1933b, 1937a, 1938), (N: Fraga 1984b), (N: De Lucca 1986), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: La Grotteria 2010), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (J: Segura 2014), (N: T. Narosky y D. Yzurieta in litt.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Milano Chico

(*Gampsonyx swainsoni swainsoni*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005).

Milano Pico de Garfio

(*Chondrohierax uncinatus uncinatus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Olrog 1985), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (N: Di Giacomo 2000, 2005).

Milano Cabeza Gris

(*Leptodon cayanensis monachus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (J: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt.).

Milano Tijereta

(*Elanoides forficatus yetapa*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1969), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:**

(S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: S.

Salvador obs. pers.).

Águila Monera

(*Morphnus guianensis*)

Nota: S/I

Harpía

(*Harpia harpyja*)

Distribución temporal: (Ago., Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Forcelli et al. 1988), (N: Chebez et al. 1990), (N:

De Lucca 1996b), (N: Anfuso et al. 2008).

Águila Crestuda Negra

(*Spizaetus tyrannus tyrannus*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Martínez 2016)

Águila Viuda

(*Spizaetus melanoleucus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010).

Águila Crestuda Real

(*Spizaetus ornatus ornatus*)

Distribución temporal: (Jul.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: Partridge en Navas y Bó (1991a), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Águila Poma

(*Spizaetus isidori*)

Distribución temporal: (Jul., Ago.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Höy en Olrog 1956)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Aguilucho Pampa

(*Busarellus nigricollis leucocephalus*)

Distribución temporal: (Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2000, 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (N y J: Bodrati y Pietrek 2000 e in litt. 2015), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927)-

Corrientes: (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013).

Caracolero

(*Rostrhamus sociabilis sociabilis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Tucumán:** (N: Girard 1933), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Höhn 1975), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Straneck en De la Peña 2016b)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña en 2016b), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1879), (N: Holland 1892), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Petracci y Basanta 2002), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Milano de Corbata

(*Harpagus diodon*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: Jordán et al. 2013), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Milano Plomizo

(*Ictinia plumbea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Cononier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: E. Depino et al. en eBird 2015d), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Partridge en Chebez 1990b), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: W. Partridge en MACN)- **Chaco:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000 y A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Chatellenaz 2005), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: Chatellenaz 2015), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2004a, 2005b, 2013).

Gavilán Ceniciente

(*Circus cinereus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Caplonch et al. 2011)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (N: Narosky e Yzurieta 1973a), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Martínez y Bó 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Sarria et al. 2009), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Donázar et. al. 1996)- **Río Negro:** (N: Piacentini 1999), (N: Casas en De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Gelain 2012b), (N: De Lucca et al. 2012b)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a, 1878b), (N: Harris 2008)- **Santa Cruz:** (N: De Lucca y Saggese 1992), (N: Saggese y De Lucca 1995), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (J: Clark 1984).

Gavilán Planeador

(*Circus buffoni*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Antoniazzi en De la Peña 2016b)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (N: Narosky e Yzurieta 1973a), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Martínez y Bó 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Sarria et al. 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Lucca y Bustamante 2014).

Esparvero Grande

(*Accipiter poliogaster*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Rey 2007), (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Esparvero Chico

(*Accipiter superciliosus superciliosus*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Esparvero Común

(*Accipiter striatus erythronemius*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Seipke y Cabanne 2008), (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Girard 1933), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Córdoba:** (N: Luciano 1988), (N: Salvador en De la Peña 2016b), (A/P: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Seipke y Cabanne 2008).

Esparvero Variado

(a) (*Accipiter bicolor pileatus*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Entre Ríos:** (N: La Grotteria 2010), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Accipiter bicolor guttifer*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Nores en Olrog 1985), (N: S. Salvador obs. per.).

Esparvero Austral

(*Accipiter chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Mar.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (J: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Ojeda et al. 2004), (J: Christie et al. 2004)- **Santa Cruz:** (J: L. Pagano obs. pers)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

Gavilán Patas Largas

(*Geranospiza caerulescens flexipes*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: E. Depino et al. en eBird 2015d), (N: F. Contino in litt.)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Aguilucho Colorado

(*Buteogallus meridionalis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fernández Campos 2015)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Narosky y Martelli 1995), (N: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005), (J: Chatellenaz 2008), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)-**Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Shipton en Salvador 1990), (N: Girard en Salvador 1990), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: Oscar 2011)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Michelutti en Nores 1996)- **Entre Ríos:** (A/P: Cruz 2014)- **Buenos Aires:** (S/D: Pagano et al. 2012), (J: L. Pagano obs. pers).

Águila Negra

(*Buteogallus urubitinga urubitinga*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2000, 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Misiones:** (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Girard 1933), (N: Shipton en Salvador 1990), (N: Girard en Salvador 1990), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013).

Águila Solitaria

(*Buteogallus solitarius solitarius*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: Olrog 1985), (S/D: Moschione et al. 2013).

Águila Coronada

(*Buteogallus coronatus*)

Distribución temporal: (Abr., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (A/P: Pereyra 1942)- **Catamarca:** (A/P y J: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Aparicio et al. 2008), (N: Coria et al. 2013)- **Corrientes:** (J: L. Pagano obs. pers)- **Santa Fe:** (A/P: Muñoz del Campo en Pereyra 1942), (N: Giai 1952-1953), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2011), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **La Rioja:** (N y J: Rozadilla et al. 2015)- **Córdoba:** (S/D: Miatello 2007), (N: Capdevielle et al. 2015)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Maceda 2007b), (N: Pereyra Lobos et al. 2008), (N: Capdevielle et al. 2011), (N: Montalvo et al. 2015)- **La Pampa:** (N: Belloqc et al. 1998), (N: Macea 2007b), (N: Tittarelli y Villareal 2009), (N: Santillán et al. 2009), (N: Galmes y Sarasola 2011), (N: Montalvo et al. 2015)- **Neuquén:** (N: Mattarazo en De la Peña 2016b).

Taguató Común

(a) (*Rupornis magnirostris magniplumis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012).

(b) (*Rupornis magnirostris pucherani*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Entre Ríos:** (N: P. Girard en WFVZ)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y J: L. Pagano obs. pers.).

(c) (*Rupornis magnirostris saturatus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino en Salvador 1990)- **Salta:** (J: Babarskas et al. 1995), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (J: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Shipton en Salvador 1990), (N: Girard en Salvador 1990), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000, 2002), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016b), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007), (N: S. Salvador obs. pers.).

Gavilán Mixto

(*Parabuteo unicinctus unicinctus*)

Distribución temporal: (Ene, Jun., Jul., Ago., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (N: L. Pagano obs. pers)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013)- **San Juan:** (N: Gelain y Pereyra Lobos 2011), (N: Gelain 2012d)- **Córdoba:** (N: Salvador 2012g), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (N: Harper en Pereyra 1950)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (N: Dabbene 1918a), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Aguilar y Kowalinski 1996a), (N: Moreyra en Babarskas et al. 2003), (N: Doiny Cabré 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Borsellino 2014), (N: Soriano 2014), (A/P y J: L. Pagano obs. pers)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001)- **Neuquén:** (N: Babarskas et al. 1996)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Taguató Negro

(*Parabuteo leucorrhous*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (J: S. Salvador obs. pers.), (J: L. Pagano obs. pers)-
Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Aguilucho Alas Largas

(*Geranoaetus albicaudatus albicaudatus*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (Pereyra 1942), (N: Di Giacomo 2005)- **Tucumán:** (N: Girard en Salvador 1990), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Córdoba:** (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999)- **Entre Ríos:** (A/P: Marateo et al. 2008)- **Buenos Aires:** (N: Durnford 1876), (J: L. Pagano obs. pers.).

Aguilucho Común

(*Geranoaetus polyosoma polyosoma*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (S/D: Ortiz y Caplonch 2007)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Salvador 2012)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky e Yzurieta en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: De Lucca 2014a)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: De Lucca 2011)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Travaini et al. 1994), (N: Donázar et. al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Lucca et al. 2012a), (N: De Lucca et al. 2013), (N: De Lucca et al. 2013), (N: De Lucca y Bertini 2015), (N: Uranga en De la Peña 2016b), (N: J. Pemberton en WVFZ), (N: C. Mercer en WVFZ)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a, 1878b), (N: Daciuk 1977a), (N: Harris 2008), (N: Straneck en De la Peña 2016b), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Straneck en De la Peña 2016b), (N y A/P: L. Pagano obs. pers)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1935), (S/D: Olrog 1950)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Aguilucho Puna

(*Geranoaetus poecilochrous*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Águila Mora

(a) (*Geranoaetus melanoleucus melanoleucus*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Narosky y Martelli 1995)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1977, 1987, 2005b, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Merlino en De la Peña 2016b)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1879), (S/D: Runnacles en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

(b) (*Geranoaetus melanoleucus australis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Shipton en Salvador 1990), (N: Pierotti en Salvador 1990), (S/D: Caplonch 2007)- **San Juan:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: S/C, WFVZ), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Casares 1944), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Sosa 2005)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Travaini et al. 1994), (N: Hiraldo et al. 1995), (N: Donázar et al. 1996), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Oscar 2012), (N: De Lucca et al. 2012a), (N: La Grotteria 2013), (N: Ignazi 2015), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a, 1878b)- **Santa Cruz:** (N: De Lucca y Saggese 1992, 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Saggese y De Lucca 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: De Lucca et al. 2012b), (N: Straneck en De la Peña 2016b)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Olrog 1948, 1950), (S/D: Clark 1986).

Aguilucho Gris

(*Buteo nitidus pallida*)

Nota: S/I

Aguilucho andino

(*Buteo albogula*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Río Negro:** (N: Trejo et al. 2001), (N: Gelain et al. 2001), (N: Ojeda et al. 2003), (N: Trejo et al. 2004).

Aguilucho Cola Corta

(*Buteo brachyurus brachyurus*)

Distribución temporal: (Ago.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (A/P: A. Bodrati in litt. 2015)- **Formosa:** (J: L. Pagano y A. Bodrati obs. pers)- **Chaco:** (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Aguilucho Negro

(*Buteo albonotatus*)

Nota: S/I

Aguilucho de Cola Rojiza

(*Buteo ventralis*)

Nota: S/I

Orden GRUIFORMES
Familia Aramidae

Carau

(*Aramus guarauna guarauna*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Jun., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (A/P: Partridge 1954), (A/P: Partridge en Chebez 1995b), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016b)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Friedmann 1927), (N: Rumboll 1967), (N: Höhn 1975), (N: De la Peña 1983b, 1987, 200b, 2013), (N: Pautasso 2000), (A/P: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Izurieta in litt), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1876), (N: Gibson 1880, 1920), (N: Holland (1892), (N: Grant 1911), (N: Daguerre 1922, 1923), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1932c, 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Macaida 2015), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers).

Familia Rallidae

Burrito Enano

(*Coturnicops notatus*)

Nota: S/I

Gallineta Chica

(*Rallus antarcticus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (N: Moroni y Salvador en prensa).

Ipacaá

(*Aramides ypecaha*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014), (A/P: Salvador en De la Peña 2016a)-

Chaco: (S/D: Chatellenaz 2005), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: Salvador en De la Peña 2016b)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1923, 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers).

Chiricote

(*Aramides cajaneus cajaneus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fiora 1939)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Chatellenaz 2005), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015)- **Tucumán:** (A/P: Caplonch 1997), (A/P: S. Pierotti en IML)- **Santiago del Estero:** (N: Quiroga 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: A. Boloqui en eBird 2015a), (N: M. Zelich in litt.)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (N y A/P: Chiula 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (A/P: García 2013), (A/P: Gómez Umpierrez 2014), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Saracura

(*Aramides saracura*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N y A/P: Partridge en Chebez 1992b), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: Di Sallo y Bodrati 2015).

Burrito Común

(*Laterallus melanophaius melanophaius*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988b), (S/D: Fraga 2001)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Aguilar y Kowalinski 1996b), (A/P: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: DECB 2011), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Burrito de Pecho Gris

(*Laterallus exilis*)

Nota: S/I

Burrito Cuyano

(*Laterallus jamaicensis salinasi*)

Nota: S/I

Burrito colorado

(*Laterallus leucopyrrhus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Entre Ríos:** (N: Torrano en De la Peña 2016b)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1931b, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús y Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

Burrito Amarillo

(*Porzana flavigaster flavigaster*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (A/P: Fraga 2001).

Burrito negruzco

(*Porzana spiloptera*)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **San Juan:** (A/P: Lucero 2013)- **San Luis:** (A/P: Pagano en López Lanús et al. 2012), (N y A/P: L. Pagano obs. pers)- **Buenos Aires:** (A/P: López Lanús et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (J: L. Pagano obs. pers).

Pollana Pintada

(a) (*Porphyriops melanops melanops*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt)-

Santiago del Estero: (A/P: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Miatello et al. 1999), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Ramírez 2014), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016b), (N: Salvador en De la Peña 2016b), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Braidotti 2012), (A/P: Pietraroja 2014)-

Mendoza: (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1876), (N: Gibson 1920), (N: Dabbene 1920), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Morici 2012b), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: Gómez 2014), (N: M. Rumboll in litt.).

(b) (*Porphyriops melanops crassirostris*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Tocce 2015).

Burrito Grande

(*Mustelirallus albicollis albicollis*)

Distribución temporal: (Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: L. Salvador obs. pers.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Boloqui en eBird 2015a).

Burrito de Pico Rojo

(*Mustelirallus erythrops olivascens*)

Distribución temporal: (Mar.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: C. Olrog en WFVZ).

Gallineta Overa

(*Pardirallus maculatus maculatus*)

Distribución temporal: (Ene, Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (A/P y J: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (A/P: Lucero 2009)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1932c, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Maugeri 2006a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

Gallineta negruzca

(*Pardirallus nigricans nigricans*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Partridge en Chebez 1991), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Gallineta Común

(a) (*Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Höy 1969), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: M. Lillo en IML)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (J: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Salvador y Salvador 2012), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016b)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (A/P: García 2011)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Durnford 1878a), (N: Hartert y

Venturi 1909), (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1933b, 1938), (N: Weller 1967), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Danti 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: López 2014), (A/P: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Pardirallus sanguinolentus landbecki*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004)-

Río Negro: (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al.

2011)- **Chubut:** (A/P: Schefski 2015), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Polla Negra

(*Gallinula galeata galeata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M.

Rumboll in litt)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D:

Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D:

Torres y Michelutti 2001)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Alabarce y Antelo 1998),

(N: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Shipton en IML), (N: P.

Girard en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa**

Fe: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D:

Torres y Michelutti 2006), (A/P: Eguia 2014), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N:

Salvador y Salvador en De la Peña 2016b)- **Entre Ríos:** (De la Peña 2005b)- **San Luis:**

(S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1922),

(N: Pereyra 1933b, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y

Montalti 1997), (S/D: Bodrati et al. 2006), S/D: (Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB

2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012),

(N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: De Maio 2014), (A/P: Gusano 2015), (A/P

y J: L. Pagano obs. pers.).

Pollana Azul

(*Porphyrio martinicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: F. Contino en IML)- **Salta:** (S/D: Moschione et al.

2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D:

Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (A/P: S. Salvador obs. pers.)-

Santa Fe: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Uranga en De la Peña 2016b)-

Córdoba: (A/P: Nores e Yzurieta 1979c)- **Buenos Aires:** (S/D: Roda y López Lanús en Narosky y Di Giacomo 1993), (A/P: Bodrati et al. 2001 y Bodrati et al. 2006).

Pollana Celeste

(*Porphyrio flavirostris*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Gallareta Ligas Rojas

(*Fulica armillata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: S.

Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Tucumán:** (A/P: Caplonch 2007), (N: Echevarría et al. 2005), (N: Echevarria 2014)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1924, 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N y A/P: Salvador 2012c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Durnford 1878a), (N: Holland 1890, 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Weller (1967, 1968b), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: T. Narosky in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (A/P: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Imberti 2005), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ), (N: M. Moroni in litt.), (N: L. Pagano obs. pers).

Gallareta Escudete Rojo

(*Fulica rufifrons*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: G. Höy en MZFC)-

Santiago del Estero: (S/D: Torres y Michelutti 2001), (A/P: J. L. Navarro en eBird 2016a)- **Tucumán:** (N: Echevarria 2014)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000)- **San Juan:** (A/P: Lucero y Izasa 2015)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Zapata 1977)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Reed 1921), (N: Darrieu et al. 1989), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967, 1968b), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: S. Salvador obs.

pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: J. Pemberton en WFVZ), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921).

Gallareta Gigante

(*Fulica gigantea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Abr., Set., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1965, 1980), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: La Grotteria 2012), (N: Eguia 2014), (A/P: L. Fernández en eBird 2015e), (N: Uranga en De la Peña 2016b), (N: S. Salvador obs. pers.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (S/D: Coconier 2006), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.).

Gallareta Cornuda

(*Fulica cornuta*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1965), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Coconier 2006)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (S/D: Coconier 2006), (A/P: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N y A/P: Vides Almonacid 1988), (N: Lillo en Salvador 1991), (N: Shipton en Salvador 1991), (A/P: Esteban y Budin en Salvador 1991).

Gallareta Andina

(*Fulica ardesiaca ardesiaca*)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Segura 2014), (N y A/P: L. Fernández en eBird 2015e), (N: T. Narosky in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (S/D: Dabbene 1922), (N: Andina 2012), (A/P: Polverini 2013), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (Echevarría et al. 2005), (N: Echevarría et al. 2008), (N: Echevarría et al. 2013), (N: Echevarría 2014).

Gallareta Chica

(*Fulica leucoptera*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: G. Höy en MZFC)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: Girard en Segura et al. 2014), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Echevarría et al. 2005), (N: Echevarria 2014)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Nores y Cerana 2010), (N: Salvador 2012c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: Zapata 1977)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1890, 1892), (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth

1927), (N: Pereyra 1938), (N: Weller (1967, 1968b), (N: Zuberbühler 1971), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (N: De la Peña 2005b), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (A/P y J: L. Pagano obs. pers)- **La Pampa:** (N: De la Peña 2005b), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: De la Peña 2005b)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Santa Cruz:** (S/D: Lancelotti et al. 2009)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934), (N: Keith en Humphrey et al. 1970)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 2006).

Familia Heliornithidae

Ipequé

(*Heliornis fulica*)

Distribución temporal: (Set., Nov.)

Distribución territorial: **Formosa:** (A/P: Ramírez Llorens et al. 2003), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (A/P: Braslavsky et al. 2005).

Orden CHARADRIIFORMES

Familia Charadriidae

Chorlo Cabezón

(*Oreopholus ruficollis ruficollis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N y A/P: Laredo 1996), (A/P: Eguia 2016)- **Salta:** (A/P: Colina 2011), (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001)- **Córdoba:** (S/D: Ordano 1996), (S/D: Miatello et al. 1999)- **Mendoza:** (N: Sosa 1995, 2005), (A/P: Petracci et al. 2004), (A/P: Perez 2015)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Peters 1923), (A/P: Belcher 1936) (A/P: Contreras 1978a), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (A/P: Boswall y Prytherch 1972), (A/P: Salvador en De la Peña 2016c)- **Santa Cruz:** (A/P: Zapata 1969), (A/P: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Albrieu et al. 2004), (A/P: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Agulián 2012), (A/P: L. Pagano obs. pers)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds en Pereyra 1951), (J: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: M. Rumboll in litt.).

Chorlo de Espolón

(*Vanellus cayanus*)

Nota: S/I

Tero Común

(a) (*Vanellus chilensis chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Mendoza:** (N: Reed 1921), (N: Sosa 1995, 2005), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

(b) Tero Común (*Vanellus chilensis lampronotus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abril, Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Jujuy: (N: Contino 1980), (N: F. Contino en IML)- **Formosa:** (N: Narosky y Lozzia 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Partridge en Chebez 1992b), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016c)- **Santiago del Estero:** (A/P: Olrog 1965), (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Tucumán:** (N: Budin 1931), (N: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: Shipton IML), (N: Lillo IML)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Jenny 1997), (N: Ríos en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Salvador y De la Peña 2014)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1931), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Smyth 1927), (N: Zapata 1977), (N: De la Peña 1987, 2005b), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1880, 1920), (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Pozzi 1934), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Zuberbühler 1971), (N: Myers y Myers 1979), (N: Gallegos Luque 1984), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Morici en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Maugeri 2007), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Salvador y De la Peña 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007).

(c) (*Vanellus chilensis fretensis*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (N y A/P: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (A/P: Humphrey et al. 1970), (N: Jehl y Rumboll 1976).

Tero Serrano

(*Vanellus resplendens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Budin 1931), (N: Contino 1980), (N y A/P: Laredo 1996), (N y A/P: Caplonch y Quiroga 2013), (N: Uranga en De la Peña 2016c)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Salvador 2015a)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Handford 1983), (N: Salvador 1992), (N: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011), (N y A/P: Caplonch y Quiroga 2013), (N: P. Girard en WFVZ).

Chorlito de Collar

(*Charadrius collaris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (HF: Fiora 1939), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: T. Narosky y D. Yzurieta in litt.), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Klimaitis y Moschione 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador, Salvador y Fraga en De la Peña 2016c)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1920), (N: Maugeri 2005) (N: Klimaitis y Borba 2016).

Chorlito Puneño

(*Charadrius alticola*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Höy 1967), (A/P: Laredo 1996)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador 2015a)- **La Rioja:** (N y A/P: Salvador et al. en prensa).

Chorlito Doble Collar

(*Charadrius falklandicus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta 1975), (S/D: Torres y Michelutti 2006)- **Mendoza:** (N: Sosa 1995), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1918, 1920), (N: Wetmore 1926), (N: Myers y Myers 1979), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (Maugeri 2007), (N: M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (N y A/P: Durnford 1878b), (A/P: Boswall y Prytherch 1972), (A/P: Boswall 1973), (N: Yorio et al. 1998b), (N: García Peña et al. 2008), (A/P: Lago 2012), (A/P: Hevia 2013), (N y A/P: Sainz Trápaga 2014a, 2014b), (N: Uranga en De la Peña 2016c), (N: Sainz Trápaga en De la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: M. Rumboll

in litt.)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Jehl y Rumboll 1976), (S/D: Coconier 2006), (N: M. Rumboll in litt.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: J. Halliday en MVZ).

Chorlito Pecho Colorado

(*Charadrius modestus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004)- **Tierra del Fuego:** (J: Hartert y Venturi 1909), (N: Anónimo 1933), (N: Olrog 1950), (J: Humphrey et al. 1970), (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Jehl y Rumboll 1976), (S/D: Clark 1986), (S/D: Coconier 2006), (N: A. Spooner en WFVZ), (N: T. Peddar en WFVZ)- **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: J. Halliday en MVZ), (N: T. Narosky in litt.).

Chorlito de Vincha

(*Phegornis mitchellii*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (J: Laredo 1996)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador 2015a)- **La Rioja:** (A/P: Vitale y Cockle 2012)- **Mendoza:** (N: Fernandes D'Olivera y Rodríguez Moulín 1997), (N: Ferrer et al. 2013).

Familia **Haematopodidae**

Ostrero Común

(*Haematopus palliatus palliatus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Wetmore 1926), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Bachmann y Martínez 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Simonetti y Fiori 2009), (N: Bachmann y Darrieu 2010), (A/P: Prado 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (A/P: L. Pagano obs. pers)- **Río Negro:** (N: González et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N y A/P: S. Salvador obs. pers)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: Nol 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Bertellotti et al. 1995), (N: Dans et al. en Yorio et al. 1998b), (N: Sainz Trápaga 2014), (N: Salvador en de la Peña 2016c), (N y A/P: M. Moroni in litt.)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: García 2012a).

Ostrero Negro

(*Haematopus ater*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Río Negro:** (S/D: Coconier 2006)- **Chubut:** (N: Korschewski 1969b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: De la Peña 1987, 2005b,

2013), (N: Punta et al. 1995), (N: Bertellotti et al. 1995), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Dans et al. en Yorio et al. 1998b), (N: Harris 2008), (N: Salvador y Narosky en de la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (N: Agulián 2012a, 2012b)- **Tierra del Fuego:** (N: Olrog 1950), (N: Reynolds 1935), (A/P: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: Jehl 1978), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Coconier 2006)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Ostrero Austral

(*Haematopus leucopodus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: M. Rumboll y J. Jehl en WFVZ), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (N: Olrog 1950), (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: Jehl 1978), (S/D: Clark 1986), (A/P: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (N: M. Rumboll y J. Jehl en WFVZ), (N: D. Parmelee en UWBM)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: S/C, WFVZ).

Familia Recurvirostridae

Tero Real

(*Himantopus mexicanus melanurus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: S. Shipton en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1924), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993), (A/P: Altamirano 2015)- **Mendoza:** (N: Sosa 1995), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1920), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1929, 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (A/P: Torres 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Avoceta Andina

(*Recurvirostra andina*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: Contino en Salvador 1992), (N: Contino y Narosky en Salvador 1992), (N: Laredo 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Uranga en De la Peña 2016c)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (S/D: Coconier 2006).

Familia Chionidae

Paloma Antártica

(*Chionis albus*)

Distribución temporal: (Ene., May., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (S/D: Beck en Humphrey et al. 1970)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921)- **Islas del Atlántico Sur:** (N: Aguirre 1995), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: Montalti en De la Peña 2016c), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Coria y Montalti 1993), (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Coria et al. 2011).

Familia Pluvianellidae

Chorlito Ceniciente

(*Pluvianellus socius*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (A/P: Ferrari et al. 2008), (N: Lishman y Nol 2012)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds 1953), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Jehl 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (J: Clark 1984, 1986), (S/D: Coconier 2006).

Familia Scolopacidae

Becasina Grande

(*Gallinago stricklandii*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds 1935).

Becasina Gigante

(*Gallinago undulata gigantea*)

Nota: S/I

Becasina Común

(a) (*Gallinago paraguaiae paraguaiae*)

Distribución temporal: (Ene., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)
Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **Córdoba:** (S/D: Ordano 1996), (S/D: Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Drabble 1953), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Grassini 2015)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1934a, 1938), (N: Zapata y Zazarino de Bustingorry 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Gallinago paraguaiae magellanica*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)
Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 2001), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Mendoza:** (S/D: Contreras 1980a)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004), (P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004)- **Santa Cruz:** (N: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Imberti 2005), (A/P: L. Pagano obs. pers), (N: M. Moroni in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (J: Reynolds en Humphrey et al. 1970)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Becasina Andina

(*Gallinago andina*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Laredo 1996)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Familia Thinocoridae

Agachona Grande

(*Attagis gayi gayi*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (HF: Navas y Bó 2001)- **Mendoza:** (A/P: Barros 1930), (S/D: Sosa 2005), (A/P: A. Bodrati 2008 in litt.), (N: S. Huntsmann y C. Moreno en WFVZ)- **Neuquén:** (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Christie et al. 2004)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005).

Agachona Patagonica

(*Attagis malouinus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti 2005)-

Tierra del Fuego: (N: Blaauw en Humphrey et al. 1970).

Agachona de Collar

(a) (*Thinocorus orbignyianus orbignyianus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (N: J.

Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (A/P: Vuilleumier 1993)- **Santa Cruz:** (N: Maclean 1969b), (N: J. Pemberton en WFVZ), (A/P: L. Pagano obs. pers)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Maclean 1969b), (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

(b) (*Thinocorus orbignyianus ingae*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (A/P: Contino 1980), (N: Laredo 1996), (A/P: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (A/P: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (Budín en Hartert y Venturi 1909), (J: Caplonch 2007)- **Mendoza:** (A/P: Barros 1930), (N: Pereyra Lobos 2002), (A/P: Mora 2013), (N: Isola 2016).

Agachona Chica

(a) (*Thinocorus rumicivorus rumicivorus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004), (N: Uranga en De la Peña 2016c)- **Río Negro:** (N y A/P: Peters 1923), (N: Belcher 1936), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (A/P: Gelain 2012b), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (A/P: Boswall 1973), (A/P: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Harris 2008), (N: J. Pemberton en WFVZ), (A/P: M. Rumboll in litt.), (A/P: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Cruz:** (A/P: Zapata 1967, 1969), (N: Maclean 1969b), (N: De Lucca y Saggese 1992), (N: Albrieu et al. 2004), (A/P: De la Peña 2005b, 2013), (A/P: Agulán 2012), (N: J. Pemberton en WFVZ), (A/P: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers), (A/P: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tierra del Fuego:** (N: Maclean 1969b), (A/P: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (A/P: Jehl y Rumboll 1976), (N: M. Rumboll in litt.).

(b) (*Thinocorus rumicivorus boliviensis*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador 2015a)- **Mendoza:** (HF: Navas y Bó 1997), (S/D: Ferrer et al. 2011), (A/P: Schmidt 2014).

Familia Jacanidae

Jacana

(*Jacana jacana jacana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Contino 1980), (N: Blendinger 1986), (J: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: F. Contino en IML), (N: M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (N: Narosky y Lozzia 1988), (J: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005), (A/P y J: Chatellenaz 2008)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N y A/P: A. Bodrati 2009 in litt.)- **Chaco:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016c), (N y J: A. Bodrati 2000, 2001 in litt.), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Navarro 2013)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Friedmann 1927), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: Salvador en De la Peña en prep.), (N y A/P: A. Bodrati 1994, 1998 in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Durán 2014)- **La Rioja:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (S/D: Torres y Michelutti 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (A/P: Torrano 1986), (A/P: Terán 2014)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1876), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1923, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (A/P: Blanco en Babarskas et al. 2003), (N: López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, A/P: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Josens et al. 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (S/D: Furman y Bastías 2012), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.).

Familia Rostratulidae

Aguatero

(*Nycticryphes semicollaris*)

Distribución temporal: (Ene., May., Jun., Jul., Ago., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998)-

Chaco: (A/P: A. Bodrati 1997 in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Olrog 1965)- **Santa**

Fe: (N: Wilson 1926), (N: Rumboll 1967), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)-

Córdoba: (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores in litt.), (N: Salvador y

Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows

1884)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1891, 1892), (N: Grant 1911), (N: Daguerre 1922),

(N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra 1927a, 1934a, 1938), (S/D: Narosky

y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Runnacles

en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.).

Familia Stercorariidae

Escúa común

(*Stercorarius chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Korschewski 1969b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Daciuk 1975, 1977a, 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (S/D: Coconier 2006), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c)- **Santa Cruz:** (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (A/P: Lorenzo 2013), (A/P: Giovanelli 2014), (N: S. Shipton en IML), (N: M. Rumboll in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds 1935), (N: Castellanos 1935), (N: Olrog 1948, 1950), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (S/D: Clark 1986), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (A/P: Earnshaw 2014).

Escúa Polar

(*Stercorarius maccormicki*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Atlántico Sur:** (N: García Esponda et al. 2000)- **Península Antártica:** (N: Coria y Montalti 1993), (N: Aguirre 1995), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Quintana y Travaini 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Quintana et al. 2001), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Coria et al. 2011).

Escúa Parda

(a) (*Stercorarius antarcticus antarcticus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

(b) (*Stercorarius antarcticus lonnbergi*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Aguirre 1995), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Coria y Montalti 1993), (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana y Travaini 2000), (N: Quintana et al. 2000), (N: Quintana et al. 2001), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Coria et al. 2011).

Familia Laridae

Gaviota Andina

(*Chroicocephalus serranus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N y A/P: Eguia 2015), (N: Uranga en De la Peña 2016c)- **Salta:** (N: Vides Almonacid 1990), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Uranga en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005).

Gaviota Capucho Café

(*Chroicocephalus maculipennis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Wilson 1923a), (N: Burger 1974), (N: Narosky e Yzurieta 1973b), (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Uranga en De la Peña 2013)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1871a), (N: Holland 1890, 1893), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1920), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1937b, 1938), (N: Gavio 1944), (N: Mac Donagh 1944), (N: Weller 1967), (N: Narosky 1969), (N: Zuberbühler 1971), (N: Burger 1974), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Vilches y Berasain 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Petracchi y Basanta 2002), (N: Petrelli et al. 2009), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Josens et al. 2009), (N: Lyon y Eadie 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Suárez et al. 2014), (N: D. Bull en WFVZ), (N: S/C, ANWC), (N: M. Rumboll in litt.), (N: P. Canevari in litt.)- **Río Negro:** (N: Gelain 2012b), (N: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a, 1878b), (N: Lizurume et al. 1995), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: S/C, ANWC), (N: R. Beck en WFVZ).

Gaviota Capucho Gris

(*Chroicocephalus cirrocephalus cirrocephalus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Narosky e Yzurieta 1973b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Uranga en De la Peña 2013)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1893), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Petrelli et al. 2009), (N: Josens et al. 2009).

Gaviota Gris

(*Leucophaeus scoresbii*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Korschenewski 1969b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: Manriquez 1988), (N: Yorio et al. 1996), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Suárez y Yorio 2005), (S/D: Coconier 2006), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1965b), (N: Daciuk 1977b), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D:

Coconier 2006)- **Tierra del Fuego**: (N: Anónimo 1933), (N: Castellanos 1935), (N: Olrog 1948, 1950), (N: Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (S/D: Clark 1986), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1998), (S/D: Coconier 2006)- **Islas Malvinas**: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: Masello et al. 2013).

Gaviota Cangrejera

(*Larus atlanticus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires**: (N: Olrog 1967), (N: Devillers 1977), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Yorio et al. 1998a), (N: Delhey et al. 2001), (N: Yorio et al. 2001), (N: Rábano et al. 2002), (N: Herrera et al. 2006), (N: García Borboroglu y Yorio 2007) (S/D: Coconier 2006), (N: La Sala et al. 2011), (N: Suárez et al. 2014)- **Chubut**: (N: Yorio et al. 1998c), (N: Yorio et al. 2004), (N: García Borboroglu y Yorio 2007), (N: Harris 2008).

Gaviota Cocinera

(a) (*Larus dominicanus dominicanus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe**: (N: Narosky e Yzurieta 1973b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Buenos Aires**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1938), (N: Devillers 1977), (N: De la Peña 1987, 2013), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Yorio et al. 1998a), (N: Yorio et al. 1998d), (N: Petracchi et al. 2004), (N: Mauco et al. 2007), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Suárez et al. 2014)- **Neuquén**: (N: Christie et al. 2004), (N: Frixiole et al. 2012), (N: Motta et al. 2015), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Río Negro**: (N: González et al. 1998), (N: Yorio et al. 1998d), (N: García Borboroglu y Yorio 2004a, 2004b), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Coconier 2006)- **Chubut**: (N: Durnford 1878b), (N: Korschenewski 1969b), (N: Boswall y Prytherch 1972), (N: Boswall 1973), (N: Daciuk 1977a, 1977b), (N: Malacalza 1987), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1994), (N: Yorio et al. 1995), (N: Quintana y Yorio 1997a, 1997b, 1998a), (N: Yorio y Quintana 1997), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Yorio et al. 1998d), (N: Yorio y García Borboroglu 2002), (N: García Borboroglu y Yorio 2004a, 2004b), (S/D: Coconier 2006), (N: Lisnizer et al. 2014), (N: Svagelj et al. 2015), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: M. Rumboll in litt.), (N: H. Zamora en M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz**: (N: Zapata 1965b, 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Gandini y Frere 1998), (N: Frere y Gandini 1998), (N: Yorio et al. 1998d), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (N: García Borboroglu y Yorio 2004a, 2004b), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Tierra del Fuego**: (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds 1934), (N: Olrog 1958), (N: Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: Jehl y Rumboll 1976), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1998), (N: Yorio et al. 1998d), (S/D: Coconier 2006), (N: Suárez et al. 2010), (N: M. Rumboll in

litt.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Larus dominicanus austrinus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas del Atlántico Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Aguirre 1995), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: Clarke et al. 2012), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Coria y Montalti 1993), (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana y Travaini 2000), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Quintana et al. 2001), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Coria et al. 2011).

Gaviotín Chico Común

(*Sternula superciliaris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1979, 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Klimaitis y Moschione 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Povedano 1999), (N: Maugeri 2005).

Atí

(*Phaetusa simplex chloropoda*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Gaviotín Pico Grueso

(*Gelochelidon nilotica groenvoldi*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta 1979b)- **Mendoza:** (N: Sosa 1995, 2005), **Buenos Aires:** (N: Devilliers 1977), (N: Suárez et al. 2014).

Gaviotín Sudamericano

(*Sterna hirundinacea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Zalba y Belenguer 1996), (N: Yorio et al. 1998a), (N: Suárez et al. 2014)- **Río Negro:** (N: Salvador y Narosky 1987), (N: Paz 1992a), (N: Petracchi y Pérez 1997), (N: Yorio et al. 1998b), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (N: Daciuk 1977a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Scolaro et al. 1996), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Blanco et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (N: Harris 2008), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N:

M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (Hartert y Venturi 1909), (N: Zapata 1965b, 1967), (N: Daciuk 1977b), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (N: Olrog 1948, 1950), (N: Humphrey et al. 1970), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Schiavini y Yorio 1995), (N: Schiavini et al. 1998)- **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Gaviotín Antártico

(a) (*Sterna vittata georgiae*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Georgias del Sur:** (N: Bennett 1920), (N: Carcelles 1931), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

(b) (*Sterna vittata gaini*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Atlántico Sur:** (N: Aguirre 1995), (N: García Esponda et al. 2000), (N: Soave et al. 2000), (N: P. Canevari en M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Península Antártica:** (N: Olrog 1958), (N: Coria y Montalti 1993), (N: Coria et al. 1996), (N: Quintana et al. 2000), (N: Favero et al. 2000), (N: Montalti y Soave 2002), (N: Coria et al. 2011).

Gaviotín Lagunero

(*Sterna trudeaui*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1977, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Uranga en De la Peña 2013)- **Mendoza:** (N: Darrieu et al. 1989), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1890, 1892), (N: Gibson 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1937b, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Suárez et al. 2014), (N: D. Bull en MVZ), (N: D. Bull en UF)- **Río Negro:** (N: González et al. 1998), (S/D: Coconier 2006), (S/D: Llanos et al. 2011).

Gaviotín Real

(*Thalasseus maximus maximus*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Devillers 1977), (N: Yorio et al. 1998a), (N: Suárez et al. 2014), (N: Marinao et al. 2015)- **Río Negro:** (S/D: Coconier 2006)- **Chubut:** (N: Korschenewski 1969b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1994), (N: Quintana y Yorio 1997a, 1997b, 1998a), (N: Yorio y Quintana 1997), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Harris 2008), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c)- **Santa Cruz:** (N: Quintana y Yorio 1997a), (N: Harris 2008).

Gaviotín Pico Negro

(*Thalasseus sandvicensis eurygnatha*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Devillers 1977), (N: Yorio et al. 1998a), (N: Suárez et al. 2014), (N: Marinao et al. 2015)- **Chubut:** (N: Korschnewski 1969b), (N: Daciuk 1973a, 1977a, 1977b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Yorio et al. 1994), (N: Quintana y Yorio 1997a, 1997b, 1998a), (N: Yorio y Quintana 1997), (N: Yorio et al. 1998b, 1998c), (N: Frere y Gandini 1998), (S/D: Coconier 2006), (N: Harris 2008), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1965b), (N: Quintana y Yorio 1997a).

Familia **Rynchopidae**

Rayador

(*Rynchops niger intercedens*)

Distribución temporal: (Ene, Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Klimaitis y Moschione 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938).

Orden **COLUMBIFORMES**

Familia **Columbidae**

Paloma Doméstica

(*Columba livia*)

Distribución temporal: (todo el año)

Nota: cría en todo el país.

Paloma Trocal

(*Patagioenas speciosa*)

Nota: S/D

Paloma Picazuró

(*Patagioenas picazuro picazuro*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929), (N: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N:

Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1927), (N: Baliño 1984) (S/D: Chebez et al. 1998)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1920), (N: Carman 1971), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (N: Brocca en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Paloma Manchada

(*Patagioenas maculosa maculosa*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929)- **Santa Fe:** (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Gelain 2012d)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1927, 1931), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Miatello et al. 1999), (N: de la Peña 2005b, 2013), (N: Maron et al. 2012), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b), (N: Leiva et al. 2004)- **San Luis:** (N: Casares 1944), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: De la Peña 2005b), (N: S. Salvador y M. Nores obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (J: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: M. Rumboll in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Río Negro:** (Hudson 1872a), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a).

Paloma Nuca Blanca

(*Patagioenas fasciata albilinea*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Paloma Araucana

(*Patagioenas araucana*)

Distribución temporal: (Ago.)

Distribución territorial: **Chubut:** (N: Vidoz en De la Peña 2016c).

Paloma Colorada

(*Patagioenas cayennensis sylvestris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998)- **Misiones:** (N:

Bodrati et al. 2010), (N: Delpietro en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador obs. pers.)-

Santa Fe: (N: Hartert y Venturi 1909)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt.).

Paloma Plomiza

(*Patagioenas plumbea plumbea*)

Nota: S/D

Paloma Montera Castaña

(*Geotrygon montana montana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Partridge 1954), (S/D: Saibene et al. 1996),

(S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Almirón et al. 2012), (N: Bodrati y Salvador 2013b).

Paloma Montera Violácea

(*Geotrygon violacea*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: A. Bodrati 2009 in litt.).

Yerutí Común

(*Leptotila verreauxi chalcauenia*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Jujuy: (N: Contino 1980)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)-

Catamarca: (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: L. Salvador y S: Salvador en prep.)-

Santiago del Estero: (N: L. Salvador y S: Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1927), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: S/C, IML)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c)- **La Rioja:** (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010)-

Córdoba: (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c) (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Zapata 1977), (N: Fraga 1983b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013c)- **San Luis:** (N: Masramón 1977), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1933b, 1938), (N: Fraga 1983b), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Yerutí Colorada

(*Leptotila rufaxilla reichenbachii*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati y Salvador 2013a), (N: Uranga en De la Peña 2016c), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Yerutí de la Yunga

(*Leptotila megalura*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Paloma Montera Grande

(*Zentrygon frenata margaritae*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Torcaza Alas Blancas

(*Zenaida meloda*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (N: Vitale et al. 2010).

Torcaza

(a) (*Zenaida auriculata auriculata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: S. Salvador obs. pers.)-

Neuquén: (S/D: Contreras 1977), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: y A/P: Horvath y Topal 1963), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Gelain 2012b)- **Chubut:** (N: Korschnewski 1969b), (N: De la Peña 2005b)- **Santa Cruz:** (N: De Lucca y Saggese 1992)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

(b) (*Zenaida auriculata chrysauchenia*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1929), (N: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1931), (N: Bucher y Nores 1973), (N: Murton et al. 1974), (N: Bucher y Di Tada 1975), (N: Bucher et al. 1977), (N: Bucher y Orueta 1977), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: Zapata 1977), (N: Baliño 1984)- **San Luis:** (N: Partridge 1953), (N: Masramón 1977), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (N: Reed 1921), (N: Contreras 1980c), (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1880, 1920), (N: Holland 1892), (N: Hussey 1916), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Zuberbühler 1971), (N: Carman 1973, 1979), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Torcacita Enana

(*Columbina minuta minuta*)

Nota: S/I

Torcacita Colorada

(*Columbina talpacoti talpacoti*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Santiago del Estero:** (N: A. Bodrati 2003 in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Corrientes:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Fraga 2001), (N: Salvador en De la Peña 2016c)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b,

2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Buenos Aires:** (A/P: Bodrati et al. 2001 y Bodrati et al. 2006, A/P: A. Bodrati 1994 in litt. 2015), (A/P: Pagano y Mérida 2009).

Torcacita Escamada

(*Columbina squammata squammata*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: A. Bodrati in litt. 2015).

Torcacita Común

(*Columbina picui picui*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1924), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Gelain 2012d)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1931), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (H/F: Altamirano et al. 2009), (N: Salvador y Bodrati 2013a, 2013c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927)- **San Luis:** (N: Masramón 1977), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Contreras 1980c), (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Moreyra en Babarskas et al. 2003), (N: Pereira en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Palomita Azulada

(*Claravis pretiosa*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (J: A. Bodrati 2008)- **Chaco:** (J: A. Bodrati 1998 y 1999 in litt.).

Palomita Morada

(*Claravis godefrida*)

Nota: S/I

Palomita Moteada

(*Metriopelia ceciliae zimmeri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Palomita de Ojos Desnudos

(*Metriopelia morenoi*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Palomita Cordillerana

(*Metriopelia melanoptera melanoptera*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Budin 1931)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)-
Tucumán: (N: Salvador 1992), (N: Caplonch et al. 2011)- **San Juan:** (HF: Navas y Bó 2001), (N: A. Bodrati 1999 in litt.)- **Mendoza:** (N: Reed 1921), (HF: Navas y Bó 2001), (S/D: Sosa 2005), (S/D: Ferrer et al. 2011)- **Neuquén:** (N: Nores e Yzurieta en Salvador 1992), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: Wetmore 1926a).

Palomita Dorada

(*Metriopelia ayamaru*)

Distribución temporal: (Feb., Oct.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (J: Caplonch et al. 2011)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001).

Orden CUCULIFORMES

Familia Cuculidae

Pirincho

(*Guira guira*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: De la Peña 1987, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Davis 1940b), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)-
Misiones: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Tucumán:** (N: Girard en Serié 1923a), (N: Friedmann 1927), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ), (N: C. Olrog en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: P. Girard en MVZ), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016c) (N: A. Bodrati in litt. 2015), (J: L.

Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Corrientes**: (N: Davis 1940b), (N: Wilson 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004)- **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (NP: Jenny 1997), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba**: (N: Castellanos 1932), (N: Azategui 1975), (N: Salvador 1981a, 2011c), (N: Martella et al. 1985), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Barrows 1884), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Davis 1940b), (N: De la Peña 2005b), (N: C. Smyth en WFVZ)- **San Luis**: (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires**: (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1870e), (N: Gibson 1880), (N: White 1882), (N: Withington 1888), (N: Holland 1892), (N: Pereyra 1923), (N: Smyth en Serié 1923b), (N: Daguerre 1924a), (N: Smyth 1928), (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (N: Brocca en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: P. Mason en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: P. Canerari in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011).

Anó Grande

(*Crotophaga major*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones**: (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Uranga en De la Peña 2016c), (N y A/P: A. Bodrati in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco**: (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Uranga en De la Peña 2016c), (N y A/P: A. Bodrati in litt.)- **Corrientes**: (S/D: Chebez et al. 1998).

Anó Chico

(*Crotophaga ani*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: A. Contino y F. Contino en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: F. Contino in litt.)- **Salta**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Bodrati et al. 2010, N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Salvador en De la Peña 2016c)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Tucumán**: (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba**: (N: Biancucci 1995), (N: Salvador 2011c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores in litt.).

Anó de Pico Surcado

(*Crotophaga sulcirostris*)

Nota: S/I

Crespín

(*Tapera naevia naevia*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (NP: Höy 1968), (NP: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (NP: Contino 1980)- **Formosa:** (NP: López Lanús 1997), (NP: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (J: Bodrati et al. 2010), (NP: Bodrati y Salvador 2015)- **Chaco:** (NP: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. 1983), (S/D: Chatellenaz 2005), (NP: Salvador y Bodrati 2013a), (NP: Bodrati y Salvador 2015), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Tucumán:** (NP: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (NP: Mogensen 1927), (NP: Smyth 1928), (NP: Girard en Pereyra 1938), (NP: Girard en Segura et al. 2014), (NP: S/C, WFVZ)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (NP: Hartert y Venturi 1909), (NP: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2006, 2013), (NP: Antoniazzi et al. 2010), (NP: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (NP: Salvador 1982, 2011c, 2013e), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (NP: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (NP: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, NP: A. Bodrati in litt. 2015).

Yasiyateré Grande

(*Dromococcyx phasianellus*)

Nota: S/I

Yasiyateré Chico

(*Dromococcyx pavoninus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (J: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Cuclillo Chico

(*Coccycua cinerea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: P. Girard en IML)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador 2011c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (A/P: Bodrati et al. 2006 e in litt.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001).

Tingazú

(a) (*Piaya cayana mogensi*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Piaya cayana macroura*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Cockle et al. 2016), (N: Uranga en De la Peña 2016c)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (J: Salvador y Bodrati 2013c), (N: A. Bodrati 1997 in litt.)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001).

Cuclillo Canela

(*Coccyzus melacoryphus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: A. Contino y F. Contino en WFVZ)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016c), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2011)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ), (N: C. Olrog en WFVZ)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983a, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Salvador 2011c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Dabbene 1926), (N: Pereyra 1933b), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001).

Cuclillo Ceniciente

(*Coccyzus euleri*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (HF: Partridge 1961), (N: M. Pearman en Bodrati et al. 2012, y N: Bodrati et al 2012), (N y A/P: A. Bodrati 2012 in litt.), (N: Cockle et al. 2016).

Orden STRIGIFORMES

Familia Tytonidae

Lechuza-de-campanario

(*Tyto alba tuidara*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul., Ago., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Misiones:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1997, 1999 in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador en De la Peña 2016c)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (S/D: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **Córdoba:** (N: Nores y Gutiérrez 1986), (N: De la Peña 2005b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1931a, 1937a, 1938), (N: Harper 1935), (N: Fraga 1984b), (N: Bellocq y Kravetz 1993), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Santos en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (N: Liebana et al. 2013), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (A/P: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Zainz Trápaga en De la Peña 2016c)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 2006), (N: Otley et al. 2008).

Familia Strigidae

Alilicueú Común

(a) (*Megascops choliba wetmorei*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., May., Jun., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (A/P: Bodrati y Pietrek 2000), (N y A/P: A. Bodrati in litt.), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Berkunsky y Reboreda 2009), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Girard 1933), (N: Lillo en Salvador 1990), (N: Caplonch 1997), (S/D: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Nores y Nores 1994), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012e), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (N: Liebana et al. 2013)- **Río Negro:** (A/P: Piacentini y Acerbo 1998), (S/D: Llanos et al. 2011).

(b) (*Megascops choliba uruguaiensis*)

Distribución temporal: (Nov., Dic., Ene.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y

Elesgood 2012)- **Corrientes**: (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Entre Ríos**: (N: A. Bodrati in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires**: (A/P: Klimaitis 1975), (A/P: Gallardo y Gallardo 1984), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Morici 2012b), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Alilicucú Yungueño

(*Megascops hoyi*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (S/D: Caplonch 2007), (N: Ortiz y Caplonch 2007).

Alilicucu Grande

(*Megascops atricapillus atricapillus*)

Nota: S/I

Alilicucu Orejudo

(*Megascops sanctaecatarinae*)

Nota: S/I

Lechuzón Mocho Grande

(a) (*Pulsatrix perspicillata perspicillata*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Formosa**: (S/D: White 2001), (J: Ramírez-Llorens y Bellocq 2007)

(b) (*Pulsatrix perspicillata boliviensis*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (A/P: Pierotti en Salvador 1990), (S/D: Moschione et al. 2013).

Lechuzón Mocho Chico

(*Pulsatrix koeniswaldiana*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones**: (A/P: Cockle y Bodrati 2007), (A/P: Bodrati et al. 2010 y N: A. Bodrati in litt. 2014).

Ñacurutú

(*Bubo virginianus nacurutu*)

Distribución temporal: (Mar., Jun., Jul., Ago., Set., Nov.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (A/P: Esteban en Salvador 1990), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1999 in litt.)- **Tucumán**: (N: Girard 1933), (N: Girard en Salvador 1990), (N: Ortiz y Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes**: (S/D: Chatellenaz 2004)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba**: (N:

Miatello et al. 2003)- **Entre Ríos:** (A/P: Pereyra 1942), (A/P: La Grotteria 2010), (A/P: Lorenzo 2011), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015)- **Buenos Aires:** (A/P: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati 1994 in litt.), (A/P: Carus 2014), (N: L. Pagano obs. pers.).

Tucúquere

(*Bubo magellanicus*)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Córdoba:** (A/P: Castellanos 1932), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (A/P: Salvador y Salvador 2012)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N y A/P: Sainz Trápaga 2014, 2015), (N: Zainz Trápaga en De la Peña 2016c), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (A/P: Segura 2015), (A/P: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933).

Lechuza Listada

(*Strix hylophila*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Lechuza Bataraz Chaqueña

(*Strix chacoensis*)

Distribución temporal: (Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980 e in litt.), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Mendoza:** (N: Pereyra Lobos y Jara 2013)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

Lechuza Bataraz

(*Strix rufipes rufipes*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct.)

Distribución territorial: **Río Negro:** (A/P: Kovacs en Salvador 1990), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Beaudoin y Ojeda 2011)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Wallace 2010), (A/P: Costa 2012).

Lechuza Estriada

(*Ciccaba virgata borreliana*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Misiones:** (J: Partridge 1954), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Lechuza Negra

(a) (*Ciccaba huhula huhula*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

(b) (*Ciccaba huhula albomarginata*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati y Cockle 2013), (N: L. Pagano obs. pers.).

Caburé Yungueño

(*Glaucidium bolivianum*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Caburé Chico

(*Glaucidium brasiliandum brasiliandum*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (J: López Lanús 1997), (A/P: Krapovickas y Yanosky en Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Carrera et al. 2008), (N: Berkunsky y Reboreda 2009), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Lillo en Salvador 1990)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador 2012e), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (N: Plotnick 1956), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati 1995 in litt. 2015), (A/P: Mérida y Bodrati 2006, A/P: A. Bodrati in litt 2015), (S/D: Pagano et al. 2012), (N y A/P: A. Bodrati 1985 in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Liebana et al. 2013)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Caburé Grande

(*Glaucidium nana*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Río Negro: (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: Santillán et al. 2010)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Reynolds 1934).

Lechucita de Vizcachera

(a) (*Athene cunicularia cunicularia*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Formosa: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Handford 1983), (N: Capllonch 2007), (N: Capllonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San**

Juan: (HF: Navas y Bó 2001)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: Zapata 1977), (N: Salvador en De la Peña 2016c)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1874b), (N: Gibson 1879), (N: Withington 1888), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1927), (Mata 1927), (N: Pereyra 1931a), (N: Zuberbühler 1971), (N: Bellocq 1993), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Chubut:** (N: Durfnford 1877a)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907).

(b) (*Athene cunicularia juninensis*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Lönnberg 1903), (S/D: Budín 1931), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Lechucita Canela

(a) (*Aegolius harrisii dabbenei*)

Distribución temporal: (May.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Rodríguez 2013), (S/D: Moschione et al. 2013).

(b) (*Aegolius harrisii iheringi*)

Distribución temporal: (May.)

Distribución territorial: **Misiones:** (J: A. Bodrati in litt. 2015).

Lechuzón Orejudo

(*Pseudoscops clamator midas*)

Distribución temporal: (Feb., Abr., Ago., Set., Oct.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: F. Contino in litt.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Rodríguez Moulín en López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)-

Misiones: (A/P: A. Bodrati 2004 in litt.)- **Chaco:** (N: A. Bodrati 1998 in litt.)-

Corrientes: (N: Wilson 1977)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N:

Pautasso 2000), (N: Pautasso y De la Peña 2001)- **Córdoba:** (N: Pautasso y De la Peña 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Moroni in litt.)-

Entre Ríos: (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1931a, 1938), (N:

Fraga 1984b), (N: Blendinger et al. 1987), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D:

Martínez et al. 1996), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (A/P:

Segura 2011), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012),

(A/P: La Grotteria 2013), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La**

Pampa: (N: Tittarelli y Villareal 2009a)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Lechuzón Negruzco

(*Asio stygius barberoii*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (A/P: La Grotteria 2014), (A/P: Terán 2014), (A/P: A. Bodrati in litt.).

Lechuzón de Campo

(a) (*Asio flammeus suinda*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Ago., Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Shipton en IML), (N: P. Girard en IML)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador 1981b, 2012b), (N: Salvador y Salvador 2012), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1870f), (N: Withington 1888), (N: Runnacles en Grant 1911), (N: Gibson 1919, 1920), (N: Pereyra 1931a, 1937a), (N: Larreta 1977), (N: Aprile 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (S/D: Pagano et al. 2012)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (HF: Horvath y Topal 1963), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Ojeda et al. 2013).

(b) (*Asio flammeus sanfordi*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Orden CAPRIMULGIFORMES

Familia Nyctibiidae

Urutaú Coludo

(*Nyctibius aethereus aethereus*)

Nota: S/D

Urutaú Común

(*Nyctibius griseus griseus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Almeida 2015)- **Formosa:** (N: Daher y Spagarino 2011)- **Misiones:** (N: Saibene 1987), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Germain 2013), (N: Militello 2015), (N: Fernández 2014), (N: A. Bodrati in litt. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: J. L. Navarro en eBird 2016b)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2011, 2013), (N: Merlino 2013).

Familia Caprimulgidae

Ñacundá

(*Chordeiles nacunda nacunda*)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati en prep.)-

Santiago del Estero: (N: T. Narosky y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador y Bodrati en prep.)- **Tucumán:** (N: P. Lillo en IML)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y

Salvador en De la Peña 2016c)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: De la Peña 1987, 2005b)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1932a, 1938), (N: Ilincheta 2011).

Añapero Chico

(*Chordeiles pusillus pusillus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Krauczuk 2000, 2013), (N: Bodrati 2007 e in litt.).

Añapero Castaño

(*Lurocalis semitorquatus nattereri*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Straneck et al. 1987), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: A. Bodrati in litt. 2009).

Atajacaminos Ñañarca

(a) (*Systellura longirostris longirostris?*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic., Ene.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Systellura longirostris bifasciatus*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Juan:** (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Neuquén:** (N: Contreras 1977), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.).

(c) (*Systellura longirostris patagonicus*)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: Casañas 2007), (N: Salvador y Bodrati 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Ramonella 1993)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a)- **Río Negro:** (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c)-

Chubut: (N: Durnford 1877a), (N: Salvador en De la Peña 2016c)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1969), (N: De Lucca y Saggese 1992).

Curiango

(*Nyctidromus albicollis derbyanus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013), (N: Bodrati et al. 2010), (A/P: Allende 2011), (N: Krauczuk 2013), (N: Cockle et al. 2016)- **Chaco:** (N: Bodrati 2004)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010).

Atajacaminos Alas Negras

(*Eleothreptus anomalus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Martínez 1984), (N: Krauczuk 2013).

Atajacaminos Lira

(*Uropsalis lyra*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Atajacaminos Chico

(*Setopagis parvula parvula*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)-

Formosa: (N: Di Giacomo 2005), (N: F. Gorleri en eBird 2015b)- **Misiones:** (N: Krauczuk 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013b)-

Tucumán: (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987,

2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador y Bodrati 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1932a, 1938), (N: Klimaitis 1975),

(S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

Atajacaminos Ceja Blanca

(*Hydropsalis maculicaudus*)

Nota: S/I

Atajacaminos Tijera

(*Hydropsalis torquata furcifera*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Rodríguez 2012), (S/D: Moschione et al. 2013), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Misiones:** (Bodrati et al. 2010), (N: Krauczuk 2013)- **Chaco:**

(S/D: Chatellenaz 2005)- **Catamarca**: (N: S. Salvador y M. Nores en De la Peña 2016c)- **Tucumán**: (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes**: (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000, 2002), (N: Pautasso y Cazenave 2002)- **San Juan**: (HF: Navas y Bó 2001)- **Córdoba**: (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador, M. Nores y D. Yzurieta en De la Peña 2016c), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.)- **Entre Ríos**: (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: La Grotteria 2010)- **Mendoza**: (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001)- **Buenos Aires**: (N: Holland 1897), (N: López Lanús en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1932a, 1937a).

Atajacaminos Coludo

(Macropsalis forcipata)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (J: Bodrati et al. 2010).

Atajacaminos Ocelado

(Nyctiphrynus ocellatus ocellatus)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati y Baigorria 2013), (N: L. Pagano obs. pers.).

Atajacaminos Oscuro

(Antrostomus sericocaudatus sericocaudatus)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Partridge 1956b), (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Chebez et al. 1988), (N: Partridge en Chebez et al. 1988), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013b).

Atajacaminos Colorado

(a) (*Antrostomus rufus saltarius*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Salvador et al. 2014)- **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Salvador et al. 2014)- **Catamarca**: (N: Salvador et al. 2014).

(b) (*Antrostomus rufus rutilus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Chaco: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador et al. 2014), (N: J. Temporetti en M. Rumboll in litt.)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Cracogna en De la Peña 1996).

Orden APODIFORMES
Familia Apodidae

Vencejo Pardo

(*Cypseloides rothschildi*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Girard 1918), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML).

Vencejo Negruzco

(*Cypseloides fumigatus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Pearman et al. 2010).

Vencejo de Cascada

(*Cypseloides senex*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: De la Peña 1982, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y T. Narosky en De la Peña 2016c).

Vencejo de Collar

(*Streptoprocne zonaris kuenzeli*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard 1918), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1982, 1987, 2005b, 2013), (N: Miatello et al. 1999), (N: Passeggi 2011), (N: S. Salvador y R. Fraga en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (N: Da Forno en Reed 1919).

Vencejo de Nuca

(*Streptoprocne biscutata biscutata*)

Nota: S/I

Vencejo Chico

(*Chaetura cinereiventris cinereiventris*)

Nota: S/I

Vencejo de Tormenta

(*Chaetura meridionalis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Coconier et al. 2007)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005).

Vencejo Montañés

(*Aeronautes montivagus montivagus*)

Nota: S/D

Vencejo Blanco

(*Aeronautes andecolus andecolus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Caplonch et al. 2011)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1982, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Pereyra 1927e).

Familia Trochilidae

Picaflor Negro

(*Florisuga fusca*)

Nota: S/I

Ermitaño Canela

(*Phaethornis pretrei*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998)-
Salta: (N: Fraga et al. 1984), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: A. Bodrati 2012 in litt.).

Ermitaño Escamado

(*Phaethornis eurynome paraguayensis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 2015).

Colibrí Grande

(*Colibri coruscans coruscans*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Narosky 1984), (N: Salvador 2015a), (N: Uranga en De la Peña 2016c)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013).

Colibrí Mediano

(*Colibri serrirostris*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Picaflor de Antifaz

(*Polytmus guainumbi thaumantias*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: Corrientes: (HF: Short 1971).

Picaflor de Pecho Naranja

(*Chrysolampis mosquitus*)

Nota: S/I

Picaflor Vientre Negro

(*Anthracothorax nigricollis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998).

Picaflor Rubí

(*Sephanooides sephanioides*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Márquez 2001), (N: Christie et al. 2004), (N: Calvelo et al. 2006), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Calvelo et al. 2006), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: M. Rumboll in litt.)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y T. Narosky en De la Peña 2016c).

Picaflor Yungueño

(*Adelomyia melanogenys inornata*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Picaflor Cometa

(*Sappho sparganura sapho*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (N: Contino 1980), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1975, 1980), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Uranga 2016), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Catamarca:** (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (S/D: Capllonch 2007), (N: Capllonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Rioja:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (N: Miatello et al. 1999), (N: Leiva et al. 2004), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: M. Rumboll in litt.).

(N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.)- **San Luis:** (N: Nellar Ramonella 1993), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005), (N: Perez 2014), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Picaflor Puneño

(*Oreotrochilus estella estella*)

Distribución temporal: (Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Salta:**

(N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador 1992)- **San Juan:** (N: A. Bodrati 2000 in litt.).

Picaflor Andino Común

(*Oreotrochilus leucopleurus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Juan:** (N: Bodrati et al. 2003), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Neuquén:** (N: Christie et al. 2004), (N: Calvelo et al. 2006)- **Río Negro:** (N y J: Navas 1965), (N: Christie et al. 2004)- **Chubut:** (N: Calvelo et al. 2006).

Picaflor Andino Castaño

(*Oreotrochilus adela*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Areta et al. 2006).

Picaflor Frente Azul

(*Eriocnemis glaucoptoides*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Picaflor Gigante

(a) (*Patagona gigas gigas*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Reed 1919), (N: Spegazzini 1920), (N: Contreras 1978b), (N: Pérez 2014).

(b) (*Patagona gigas peruviana*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a), (N: Puca en De la Peña 2016c)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Salvador et al. en prensa).

Picaflor de Barbijo

(*Heliomaster furcifer*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: D. Wilson in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (S/D: Chebez et al. 1998).

Picaflor Enano

(*Microstilbon burmeisteri*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (J: L. Pagano obs. pers)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007).

Picaflor Amatista

(*Calliphlox amethystina*)

Nota: S/I

Picaflor Común

(a) (*Chlorostilbon lucidus igneus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Lönnberg 1903)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Prado 2015)- **Formosa:** (N: Narosky y Lozzia 1988), (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador en De la Peña 2016c)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **La Rioja:** (N: Giacomelli 1905)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Gelain 2011, 2012a)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador en De la Peña 2016c), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **La Pampa:** (S/D: Maceda y Kin 2001)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

(b) (*Chlorostilbon lucidus berlepschi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Corrientes:** (N: Contreras 1987), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Smyth 1928), (N: Leiva et al. 2004), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Grant 1911), (N: Gibson 1918), (N:

Pereyra 1923, 1931c, 1933b, 1938), (N: Fraga 1984a), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Pereira en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Picaflor Copetón

(*Stephanoxis loddigesii*)

Distribución temporal: (Jun., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010 e in litt. 2015), (N: Di Fiore 2012), (N: Tejo 2015), (J: L. Pagano obs. pers.).

Picaflor Tesoro

(*Eupatomena macroura macroura*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (A/P: A. Bodrati, F. Di Sallo y C. Ferreyra obs. pers. 2015)

Picaflor Zafiro

(*Thalurania furcata baeri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Picaflor Corona Violácea

(*Thalurania glaukopis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.).

Distribución territorial: Misiones: (N: De la Peña 1984, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Bodrati 2005 in litt.).

Picaflor Garganta Blanca

(*Leucochloris albicollis*)

Distribución temporal: (Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010)- **Buenos Aires:** (N: Núñez Chas 1992), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Bodrati 1993, 2001 in litt.), (S/D: DECB 2011), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Picaflor Vientre Blanco

(*Amazilia chionogaster*)

Distribución temporal: (Feb., Ago., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. S. Di Giacomo en Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al.

2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **La Rioja:** (N: Salvador 1992).

Picaflor Esmeralda

(*Amazilia versicolor versicolor*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Militello y Castillo 2005), (N: Heredia 2012).

Picaflor Cola Castaña

(*Hylocharis sapphirina*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005).

Picaflor Bronceado

(*Hylocharis chrysura*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N. Narosky y Lozzia 1988), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N. Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004)- **Santa Fe:** (N: Giai 1950), (De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Buenos Aires:** (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (N: Godoy et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N y J: L. Pagano obs. pers.).

Orden TROGONIFORMES

Familia Trogonidae

Surucuá Aurora

(*Trogon curucui behni*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1968), (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998).

Surucuá Común

(*Trogon surrucura surrucura*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Partridge en Chebez 1993), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D:

Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Schreiber 2012), (N: De la Peña 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: A. Bodrati 1998, 1999 in litt.)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz 2004).

Surucuá Amarillo

(*Trogon rufus chrysoclorus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Núñez Montellano et al. 2009), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2015, 2016), (N y P/A: A. Bodrati in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.).

Orden CORACIIFORMES

Familia Alcedinidae

Martín Pescador Grande

(a) (*Megacyrle torquata torquatus*)

Distribución temporal: (Feb., Jun., Jul., Ago., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Shipton en IML)- **Corrientes:** (N: De la Peña 1987, 2013), (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983a, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 1987, 2005b)- **San Luis:** (S/D: Nellar Ramonella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Blanco en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (A/P: Doiny Cabré 2006), (S/D: Morici 2012b).

(b) (*Megacyrle torquata stellata*)

Distribución temporal: (Oct., Dic., Ene.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Chubut:** (A/P: J. De Leonardis en eBird 2015g).

Martín Pescador Mediano

(*Chloroceryle amazona*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Shipton en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y

Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (S/D: Bodrati et al. 2006), (N: Mérida y Bodrati 2006, A. Bodrati in litt, 2015).

Martín Pescador Chico

(*Chloroceryle americana mathewsii*)

Distribución temporal: (Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Shipton en IML), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1923, 1932b, 1938), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D:), (N: Mérida y Bodrati 2006, A. Bodrati in litt, 2015), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

Martín Pescador Enano

(*Chloroceryle aenea aenea*)

Nota: S/I

Familia Momotidae

Yeruvá

(*Baryphthengus ruficapillus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Chebez 1995b), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Protomastro 2001), (N: Bodrati et al. 2010).

Burgo

(*Momotus momota pilcomajensis*)

Distribución temporal: (Ago., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Oscar 2012)- **Salta:** (N: Höy 1968), (S/D: Moschione et al. 2013).

Orden GALBULIFORMES

Familia Bucconidae

Chacurú Grande

(*Notharchus swainsoni*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (A/P: Bodrati y Cockle 2007b), (N: Bodrati et al. 2010).

Chacurú Cara Negra

(*Nystalus chacuru chacuru*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013, 2016d), (N: Bodrati et al. 2010 e in litt. 2015), (N: S. Salvador obs. pers.).

Durmilí

(*Nystalus maculatus striatipectus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (N: Höy 1968), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Uranga en De la Peña 2016d) (N: M. Lillo en IML)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Smyth 1928), (N: Dinelli en Pereyra 1950), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML), (N: P. Girard en IML), (N: P. Girard en MVZ)- **La Rioja:** (A/P: A. Bodrati in litt. 2015)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

Chacurú Chico

(*Nonnula rubecula rubecula*)

Distribución temporal: (Set., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010 e in litt. 2015).

Orden PICIFORMES

Familia Ramphastidae

Tucán Grande

(a) (*Ramphastos toco toco*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Contino 1980), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (N: Höy 1968), (N: Contino 1980), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (N: Uranga en De la Peña 2016d).

(b) (*Ramphastos toco albicularis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Formosa: (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: A. Bodrati 2000 in litt.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1998 in litt.)-

Corrientes: (S/D: Chatellenaz et al. 2010).

Tucán Pico Verde

(*Ramphastos dicolorus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Segovia y Cockle 2012), (N: S. Salvador obs. pers.).

Arasari Chico

(*Selenidera maculirostris*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: White en Bodrati 2012b).

Arasari Banana

(*Pteroglossus bailloni*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2012).

Arasari Fajado

(*Pteroglossus castanotis australis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2015), (N: Bodrati et al. 2010).

Familia Picidae

Carpinterito Común

(a) (*Picumnus cirratus tucumanus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1968), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N y A/P: Bodrati et al. 2015)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1951), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML), (N: P. Girard en IML).

(b) (*Picumnus cirratus pilcomayensis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML), (N: Bodrati et al. 2015)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013, 2016d)- **Córdoba:** (N: Giraudo et al. 1993), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Bodrati et al. 2015), (N: Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 1987), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires:** (N: Bodrati et al. 2001 en Bodrati et al. 2006).

(c) (*Picumnus cirratus thamnophiloides*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: L. Pagano obs. pers.)

Carpinterito Ocelado

(*Picumnus dorbignyanus dorbignyanus*)

Distribución temporal: (Abr.)

Distribución territorial: **Salta:** (A/P: Chani et al. 2002).

Carpinterito Cuello Canela

(*Picumnus temminckii*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2015), (N: Bodrati et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvados obs. pers.).

Carpinterito Ocráceo

(*Picumnus nebulosus*)

Nota: S/I

Carpintero Blanco

(*Melanerpes candidus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Fernández 2013)- **Santiago del Estero:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (N: S. Salvador y T. Narosky en De la Peña 2016d)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Carpintero Arcoiris

(*Melanerpes flavifrons*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2015, 2016), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Soteras 2011), (N: M. Rumboll in litt.), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016d), (N: S. Salvador obs. pers.)

Carpintero de los Cardones

(*Melanerpes cactorum*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D:

Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1999 in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Catamarca**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero**: (N: M. Lillo en IML), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Capovilla 2014)- **San Juan**: (N: Ariza 2012)- **Córdoba**: (N: Las Heras 2015), (N: Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **San Luis**: (S/D: Nellar Romanella 1993).

Carpintero Oliva Oscuro

(*Picoides fumigatus fumigatus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Jujuy**: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013).

Carpintero Oliva Manchado

(*Veniliornis spilogaster*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús y Rodríguez Goñi 2004), (S/D: Escobar 2006), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati 2014 in litt.), (N: M. Rumboll in litt.)- **Entre Ríos**: (N: A. Bodrati 1994 in litt.).

Carpinterito Bataraz Chico

(a) (*Veniliornis mixtus mixtus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires**: (N: Withington 1888), (N: Doello Jurado 1915), (N: Pereyra 1937a, 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (Babarskas, López Lanús y Veiga en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Wessels 2012), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Veniliornis mixtus malleator*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Short 1970), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1999 in litt.)- **Santiago del Estero**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán**: (N: P. Girard en IML)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013, 2016d)- **Córdoba**: (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.).

(c) (*Veniliornis mixtus berlepschi*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis**: (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016d)- **La Pampa**: (N:

Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Tocce 2013).

Carpintero Bataraz Patagónico

(*Veniliornis lignarius*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Neuquén**: (J: Christie et al. 2004), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro**: (S/D: Chebez et al. 1998), (J: Christie et al. 2004)- **Chubut**: (A/P: Rasmussen et al. 1992).

Carpintero Oliva Chico

(*Veniliornis passerinus olivinus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes**: (N: Short 1970, 1971), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Chaco**: (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (A/P: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013).

Carpintero Oliva Yungueño

(*Veniliornis frontalis*)

Distribución temporal: (Mar., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Di Giacomo y López Lanús 2000)- **Salta**: (N: Babarskas et al. 1995).

Carpintero Dorado Común

(*Piculus chrysochloros chrysochloros*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Short 1970), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1999 in litt. 2015), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Corrientes**: (HF: Darrieu y Martínez 1984)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909).

Carpintero Dorado Verdoso

(*Piculus aurulentus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Corrientes**: (N: Short 1970).

Carpintero Dorado Gris

(*Colaptes rubiginosus tucumanus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (N: Rodríguez 2012), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (N: Salvador et al. en prensa).

Carpintero Real

(a) (*Colaptes melanochloros melanochloros*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015, 2016), (N: Bodrati et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (N: Short 1972), (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Colaptes melanochloros nigroviridis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Kerr 1892), (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

(c) (*Colaptes melanochloros leucofrenatus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1969), (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: P. Girard en IML), (N: F. Contino en IML)- **Santiago del Estero:** (N: M. Lillo en IML), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013)- **San Juan:** (N: Gelain 2012, 2013)- **Córdoba:** (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b), (N: Salvador 2013c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (S/D: Sosa 2005)- **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Carpintero Pitío

(*Colaptes pitius*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: Short 1972, 1982), (N: Christie et al. 2004), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (A/P: Horvath y Topal 1963), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005).

Carpintero Andino

(*Colaptes rupicola rupicola*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Marcaida 2014)- **Salta:** (N: De la Peña 2005b), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Salvador 2015a).

Carpintero Campestre

(a) (*Colaptes campestris campestris*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Colaptes campestris campestroides*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Cockle et al. 2011, 2012), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: Short 1972), (N: Wilson 1977), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 1988, 2012, 2014), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b), (N: Salvador 2013b), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Smyth 1928)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1870b), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: T. Burtis en MVZ), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Carpintero Cara Canela

(*Celeus galeatus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Johnson, Casañas y Adomovsky en Chebez 1995a), (N: Saibene y Castelino en Chebez 1995a), (N: Mazar Barnett, López Lanús y Rodríguez Goñi en Chebez 1995a), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Lammertink y Klavins 2012), (N: Cockle et al. 2015, 2016), (N: S. Salvador obs. pers.).

Carpintero Copete Pajizo

(*Celeus lugubris kerri*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (A/P: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 2002 in litt.).

Carpintero Copete Amarillo

(*Celeus flavescens flavescens*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Short 1970)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Allende 2014), (N: A. Bodrati 2000, 2008, 2010 in litt.).

Carpintero Garganta Estriada

(*Dryocopus lineatus erythrops*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo y Di Giacomo 2008)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015, 2016), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Uranga en De la Peña 2016d), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005).

Carpintero Negro

(*Dryocopus schulzi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo y Di Giacomo 2008)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Santa Fe:** (N: Fandiño et al. 2011)- **Córdoba:** (N: Nores en Madroño Nieto y Pearman 1993), (N: Heredia et al. 1999), (N: Buteler 2012), (N: Heredia 2013), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador obs. pers.).

Carpintero Grande

(*Campephilus robustus*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016d).

Carpintero Garganta Negra

(*Campephilus melanoleucus melanoleucus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo y Di Giacomo 2008)- **Corrientes:** (N: Gavensky 2015).

Carpintero Lomo Blanco

(*Campephilus leucopogon*)

Distribución temporal: (Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Albanesi et al. 2016), (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (N: Höy 1968), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Coconier et al. 2007), (N: Rodríguez 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (HF: Wetmore 1926), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Bodrati y Pietrek 2000, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1997, 2000, 2001, 2007), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador en De la Peña 2016d)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Short 1982), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: A. Azategui in litt.), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvados y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Carpintero Gigante

(*Campephilus magellanicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (J: Christie et al. 2004), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Short 1970a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Ojeda 2004), (J: Christie et al. 2004), (N: Ojeda y Chazarreta 2006), (N: Ojeda et al. 2007), (N: Chazarreta et al. 2011), (N: La Grotteria 2011)- **Chubut:** (N: Schefski 2015)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (S/D: Chebez et al. 1998).

Orden CARIAMIFORMES

Familia Cariamidae

Chuña de Patas Rojas

(*Cariama cristata*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Delpietro en De la Peña 2016d)- **Chaco:** (N: Uranga en De la Peña 2016d), (N y A/P: A. Bodrati 2008 in litt.)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Chuña de Patas Negras

(*Chunga burmeisteri*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (N y A/P: A. Bodrati 1997, 1998 in litt.)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.), (N: M.

Rumboll in litt.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

Orden FALCONIFORMES

Familia Falconidae

Guaicurú

(*Herpetotheres cachinnans queribundus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)-
Misiones: (A/P: Bodrati en Alderete et al. 2014)- **Chaco:** (N: Casañas, Klavins, Bodrati y Leoni en Bodrati y Pietrek 2000)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983c, 1987, 2005b, 2013).

Halcón Montés Chico

(a) (*Micrastur ruficollis ruficollis*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Misiones:** (J: Partridge 1954), (A/P: Bodrati et al. 2010, N: A. Bodrati in litt.), (N: Cockle et al. 2015)- **Chaco:** (J: Bodrati 2005a).

(b) (*Micrastur ruficollis olrogi*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (J: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Halcón Montés Grande

(*Micrastur semitorquatus semitorquatus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (J: Olrog 1985)- **Salta:** (N: Grilli et al. 2013), (S/D: Moschione et al. 2013), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (A/P: Bodrati 2005a).

Halconcito Gris

(*Spizapteryx circumcincta*)

Distribución temporal: (Ene., Set, Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1980a), (S/D: Moschione et al. 2013)-
Córdoba: (N: Martella y Bucher 1984), (N: Márquez et al. 2010), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000)-
Buenos Aires: (N: Narosky et al. 1992)- **La Pampa:** (N: Dean 1971a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Liebana et al. 2013)- **Río Negro:** (N: Dean 1971a), (S/D: Llanos et al. 2011).

Carancho

(*Caracara plancus plancus*)

Distribución temporal: (Jun., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (J: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)-

Misiones: (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D:

Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N:

Friedmann 1927), (N: Girard 1933), (N: Shipton en Salvador 1990), (N: Girad en

Salvador 1990), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ)-

Corrientes: (N: Wilson 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D:

Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Wilson 1926), (N:

De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Ríos en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000), (N:

Leiva et al. 2004), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932),

(S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2013), (N: Salvador

2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016d), (N:

Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows

1884), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: De la Peña 2013)- **San Luis:**

(S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005), (N: D. Bull WFVZ)-

Buenos Aires: (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1879), (N: Holland 1892), (N: Grant

1911), (Daguerre 1922, 1924a), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1927), (N: Pereyra

1937a), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D:

Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al.

1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas, López Lanús, Veiga y Filiberto en

Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009),

(S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: Seipke 2012), (S/D: Pagano et al. 2012),

(N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Borsellino 2015), (N: M. Earnshaw in litt.),

(N: M. Rumboll in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et

al. 1998), (N: Gochfeld 2000), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N:

Mallet et al. 2013)- **Neuquén:** (N: Travaini et al. 1994), (N: Donázar et al. 1996), (S/D:

Chebez et al. 1998)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D:

Llanos et al. 2011), (N: De Lucca y Bertini 2015), (N: J. Pemberton en WFVZ)-

Chubut: (N: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et

al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N:

Crawshay 1907), (N: Anónimo 1933), (N: Humphrey et al. 1970)- **Islas Malvinas:**

(S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Matamico Andino

(Phalcoboenus megalopterus)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fiora 1939), (N: White y Boyce 1987), (N: L.

Fernández en eBird 2015e)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S. Salvador obs.

pers.)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001)- **Mendoza:** (S/D: Ferrer et al. 2011).

Matamico Blanco

(Phalcoboenus albogularis)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Dic.)

Distribución territorial: Río Negro: (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Matamico grande

(*Phalcoboenus australis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Tierra del Fuego: (N: Reynolds 1935), (S/D: Clark 1984), (S/D: Coconier 2006), (N: Clark en De la Peña y Montalti en pren.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: A. Bennett en WFVZ), (N: H. Duncan WFVZ), (N: J. Halliday en MVZ), (N: J. Hausen WFVZ), (N: S/C, MVZ).

Chima Chima

(*Milvago chimachima chimachima*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Formosa: (J: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (A/P: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Chimango

(a) (*Milvago chimango chimango*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Höy 1969), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: C. Smyth en WFVZ)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Caplonch et al. 2011)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1923a, 1923b, 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Azategui 1975), (N: Fraga y Salvador 1986), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: J. M. G. en WFVZ), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Serié y Smyth 1923), (N: De la Peña 2005b), (N: C. Smyth en WFVZ)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: J. M. G. en WFVZ), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Sosa 2005), (N: D. Bull en WFVZ)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1879), (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Grant 1911), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth en Serié 1923b), (N: Pereyra 1923), (N: Smyth 1927), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Narosky 1969), (N: Zuberbühler 1971), (N: Fraga y Salvador 1986), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Martínez y Bó 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Moreyra en Babarskas et al. 2003), (N: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014),

(N: Miquel et al. 2015), (N: T. Burtis en MVZ), (N: S/D, WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Solaro y Sarasola 2012, 2015), (N: C. Belcher en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

(b) (*Milvago chimango temucoensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Travaini et al. 1994), (N: Donázar et. al. 1996), (N: Christie et al. 2004), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: P. Sympton en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: Gelain 2009), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Lucca et al. 2012b), (N: De Lucca 2014b), (N: De Lucca y Bustamante 2014), (N: Salvador y Narosky en De la Peña 2016d), (N: Gelain en De la Peña 2016d)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: M. Moroni in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (A/P: Keith en Humphrey et al. 1970).

Halconcito Colorado

(*Falco sparverius cinnamominus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: Lillo en Salvador 1990), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Handford 1983), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San Juan:** (N: De la Peña 1987, 2005b), (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Gelain 2012c)- **Córdoba:** (N: Fraga en De Lucca 1992), (N: Salvador De Lucca 1992), (S/D: Ordano 1996), (N: Salvador 2012e), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1927), (N: Baliño 1984), (N: Biolé en De Lucca 1992), (S/D: Chebez et al. 1998)- **San Luis:** (N: De Lucca 1992), (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: De Lucca 1992), (N: Narosky, Di Giacomo y López Lanús en De Lucca 1992), (N: Novas y Aprile en De Lucca 1992), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Morici 2012b), (N: Borsellino 2014)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Liébana et al. 2009), (N: Liébana et al. 2013), (N: Di Iorio et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **Neuquén:** (A/P: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Lucca 2014b)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S.

Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Cruz:** (N: De Lucca y Saggese 1992, 1993), (N: De Lucca 1993), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005)-**Tierra del Fuego:** (J: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: M. Rumboll in litt.).

Halcón Negro Chico

(a) (*Falco rufigularis rufigularis*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2000, 2005)- **Chaco:** (N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

(b) (*Falco rufigularis ophryophanes*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012).

Halcón Negro Grande

(*Falco deiroleucus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Halcón Plomizo

(a) (*Falco femoralis femoralis*)

Distribución temporal: (Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (S/D: Contreras et al. 2014)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012e, 2012h), (N: De Lucca et al. 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador en De la Peña 2016d) (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: De Lucca y Saggese 1996)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky e Yzurieta en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Roda en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Morici 2012b), (N: De Lucca et al. 2013), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Liébana 2015)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Lucca y Quaglia 2012)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933).

(b) (*Falco femoralis pichinchae*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Caplonch et al. 2011)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Halcón Peregrino

(*Falco peregrinus cassini*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Salvador et al. en prensa)- **Tucumán:** (S/D: Ortiz y Caplonch 2007), (J: Caplonch et al. 2011)-

San Juan: (N: Fava et al. 2012)- **Córdoba:** (N: Vasina y Straneck 1984), (N: Miatello et al. 1999), (N: Heredia 2009), (N: Márquez et al. 2010), (N: De la Peña 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: Salvador en De la Peña 2016d), (N y A/P: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1991, 1993), (N: Salvador en De la Peña 2016d)- **Mendoza:** (N: Pereyra Lobos 2003), (S/D: Sosa 2005)- **Neuquén:** (N: Donázar et. al. 1996), (J: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Paz 1992b), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: De Lucca 2013, 2014b, 2016b), (N: Tocce 2013), (N: De Lucca et al. 2015)- **Chubut:** (N: Ellis y Peres Garat 1983), (N: Harris 2008), (N: De Lucca et al. 2013), (N: García et al. 2014), (N: M. Moroni in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Cruz:** (N: Ellis y Peres Garat 1983), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: Santillán et al. 2010), (N: Agulián 2012), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (J: Clark 1984), (N: McNutt 1984)- **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Orden PSITTACIFORMES

Familia Psittacidae

Catita Serrana Grande

(*Psilopsiagon aymara*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Handford 1983), (N: Caplonch 2007), (N y J: Caplonch et al. 2011)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Salvador y Narosky 1984), (S/D: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Salvador y Salvador 2012), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Masramón 1977), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (S/D: Sosa 2005).

Catita Serrana Chica

(a) (*Psilopsiagon aurifrons margaritae*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Narosky 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador 2015a).

(b) (*Psilopsiagon aurifrons rubrirostris*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Mendoza:** (S/D: Ferrer et al. 2011).

Catita Andina

(*Bolborhynchus orbygnesius*)

Nota: S/I

Cotorra

(a) (*Myiopsitta monachus monachus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Zapata 1977), (N: Baliño 1984), (N: Eberhard 1996, 1998), (N: Mastropaolet al. 2011)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Peris y Aramburú 1995), (N: Aramburú 1996, 1997, 1998), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (N: Aramburú et al. 2002, 2003, 2009), (N: Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Volpe y Aramburú 2011), (N: Mastropaolet al. 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Miquel et al. 2015), (N: Romero et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Myiopsitta monachus cotorra*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005), (N: Mastropaolet al. 2011)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Mastropaolet al. 2011), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001), (N: Mastropaolet al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.).

(c) (*Myiopsitta monachus catita*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Mastropaolet al. 2011), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Mastropaolet al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: de la Peña 1987, 2000, 2005b, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **La Rioja:** (N: Mastropaolet al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (N: Mastropaolet al. 2011), (N: Gelain 2012d)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (N: Partridge 1953), (N: Martella et al. 1985), (N: de la Peña 1987, 2013), (N: Navarro y Bucher 1990, 1992), (N: Navarro et al. 1992, 1995), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Martella y Bucher 1993), (N: Mastropaolet al. 2011), (N: Turienzo y Di Iorio 2014), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2016d), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (N: Masramón 1977), (N: Bucher et al. 1987), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Mastropaolet al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Humphrey y Peterson 1978), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **La Pampa:** (Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (Mastropaolet al. 2011)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.).

Catita Chirirí

(a) (*Brotogeris chiriri chiriri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Brotogeris chiriri behni*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Catita Cabeza Roja

(*Pionopsitta pileata*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Segovia et al. 2009), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2015).

Loro Maitaca

(a) (*Pionus maximiliani lacerus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997).

(b) (*Pionus maximiliani siy*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Buenos Aires:*** (N: Pagano y Mérida 2009), (N: Ibañez et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.).

* Individuos asilvestrados.

(c) (*Pionus maximiliani melanoblepharus*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Chebez 1992b), (N: Segovia et al. 2009), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012).

Loro Vinoso

(*Amazona vinacea*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: White 1882), (N: Cockle et al. 2007), (N: Segovia et al. 2009), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015, 2016), (N: Cockle y Bodrati 2011), (N: Segovia y Cockle 2012).

Loro Alisero

(*Amazona tucumana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (N: Rivera y Politi 2011), (N: Rivera et al. 2011), (N: Rivera et al. 2012a, 2012b), (N: Rivera et al. 2014), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007).

Charao

(*Amazona pretrei*)

Nota: S/I

Loro Hablador

(*Amazona aestiva xanthopteryx*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (N: Sauad et al. 1991a, 1991b, 1991c), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa:** (N: Kerr 1892), (N: Di Giacomo 2005), (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Berkunsky et al. 2005), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Berkunsky 2006), (N: Berkunsky y Reboreda 2009), (N: Berkunsky et al. 2011), (N: Berkunsky et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Giai 1950)- **Córdoba:** (N: Fernández Juricic et al. 1998)- **Buenos Aires:*** (N: Ibañez et al. 2014), (J: L. Pagano obs. pers.).

* Individuos asilvestrados.

Catita Enana

(*Forpus xanthopterygius vividus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Mazar Barnett y Pearman en Bodrati y Pietrek 2000), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: De la Peña 2005b)- **Santa Fe:** (A/P: Manassero y Luna 2012).

Chiripepé Cabeza Verde

(*Pyrrhura frontalis chiripepe*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Segovia et al. 2009), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015, 2016), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Buenos Aires:*** (N: Ibañez et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.).

* Individuos asilvestrados.

Chiripepé Cabeza Parda

(*Pyrrhura molinae australis*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: S/C, MZFC)- **Salta:** (N: Höy 1968), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Cachaña

(a) (*Enicognathus ferrugineus ferrugineus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Bridges en Humphrey et al. 1970), (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Enicognathus ferrugineus minor*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (N: Díaz 2009), (N: Díaz y Kitzberger 2013)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Díaz y Kitzberger 2013)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: M. Rumboll in litt.).

Choroy

(*Enicognathus leptorhynchus*)

Nota: S/I

Loro Barranquero

(a) (*Cyanoliseus patagonus patagonus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Mendoza: (N: Bucher y Rinaldi 1986), (S/D: Sosa 2005)- **Buenos Aires:** (N: Bucher y Rinaldi 1986), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Tella et al. 2014)- **La Pampa:** (N: Bucher y Rinaldi 1986), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (N: Bucher y Rinaldi 1986), (N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: Bucher y Rinaldi 1986), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Masello y Quillfeldt 2002, 2004, 2005, 2012), (N: Christie et al. 2004), (N: Harris 2008), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (N: Di Iorio et al. 2010), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (N: Zapata 1969)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Cyanoliseus patagonus conlara*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Córdoba: (N: Castellanos 1932), (N: Bruno y Nores 2001)- **San Luis:** (N: Masramón 1977), (N: Bucher y Rinaldi 1986), (N: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador obs. pers.).

(c) (*Cyanoliseus patagonus andinus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Catamarca:** (N: White 1882), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **La Rioja:** (N: Bucher y Rinaldi 1986)- **San Juan:** (N: Bucher y Rinaldi 1986).

Calacante de Frente Dorada

(*Eupsittula aurea*)

Nota: S/I

Ñanday

(*Nandayus nenday*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Formosa: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires:*** (N: Uranga en De la Peña 2016d).

* Individuos asilvestrados.

Maracaná Cuello Dorado

(*Primolius auricollis*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1968), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013).

Guacamayo Verde

(*Ara militaris boliviana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Juárez et al. 2011, 2012), (N: Grilli et al. 2013), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.).

Calacante Común

(*Thectocercus acuticaudata acuticaudata*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1968), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Berkunsky y Reboreda 2009), (N: Berkunsky et al. 2011), (N: Aramburú et al. 2013)- **Santa Fe:** (N: Giai 1950), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Moroni in litt.)- **San Luis:** (N: Masramón 1977), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Macea et al. 2001).

Calacante Cara Roja

(*Psittacara mitratus tucumanus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1968), (N: Contino 1980), (N: Uranga en De la Peña 2001b, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Catamarca:** (N: Salvador, Nores e Yzurieta en De la Peña 2016d), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997)- **Buenos Aires:*** (N: Ibañez et al. 2014), (N y J: L. Pagano obs. pers.).

* Individuos asilvestrados.

Calacante Ala Roja

(*Psittacara leucophthalma leucophthalma*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Misiones:** (N: Segovia et al. 2009), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2015), (N: Cockle 2010), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador, Narosky y Fraga en De la Peña 2016d)- **Chaco:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Buenos Aires:*** (N: Ibañez et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.).

* Individuos asilvestrados.

Orden PASSERIFORMES
Familia Thamnophilidae

Batará Goteado

(*Hypoedaleus guttatus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010).

Batará Gigante

(a) (*Batara cinerea cinerea*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (A/P: Bodrati et al. 2010).

(b) (*Batara cinerea argentina*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985)- **Salta:** (N: Uranga en De la Peña 2001b, 205b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985).

Batará Pintado

(*Mackenziaena leachii*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Batará Copetón

(*Mackenziaena severa*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Chororó

(*Taraba major major*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Contino en Fraga y Narosky 1985)- **Salta:** (N: Girard en Friedmann 1929), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)-

Tucumán: (N: Smyth 1928), (N: Girard en Friedmann 1929), (Pereyra 1938), (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: L. Dinelli en WVFZ), (N: P. Girard en WVFZ), (N: C. Olrog en WVFZ)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1991), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1975, 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: M. Nores, D. Yzurieta y S.

Salvador en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Batará Pecho Negro

(*Biatas nigropectus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Choca Listada

(*Thamnophilus doliatus radiatus*)

Distribución temporal: (Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 1998b, 2005), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Caplonch et al. 2015)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Jordan y Frutos 2015)- **Entre Ríos:** (N: Almeida 2015).

Choca Corona Rojiza

(a) (*Thamnophilus ruficapillus ruficapillus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set, Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1933b, 1938), (N: Venturi en Fraga y Narosky 1985), (N: Earnshaw en Fraga y Narosky 1985), (N: Aguilar y Di Giacomo en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (N: Carman y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

(b) (*Thamnophilus ruficapillus cochabambae*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S/C, IML).

Choca Común

(a) (*Thamnophilus caerulescens caerulescens*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b).

(b) (*Thamnophilus caerulescens dinellii*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: Contino en Fraga y Narosky 1985), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Scrochi en Fraga y Narosky 1985), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador y Fraga en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

(c) (*Thamnophilus caerulescens gilvigaster*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1884), (N: Zelich en Fraga y Narosky 1985), (N: Klimaitis en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 2005b), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Saibene en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (Bodrati et al. 2001 en Bodrati et al. 2006), (N: Mérida y Bodrati 2006).

Choca Estriada

(*Dysithamnus stictothorax*)

Nota: S/I

Choca Amarilla

(*Dysithamnus mentalis mentalis*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Bosso et al. 1988), (N: Castelino y Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010).

Batará Estriado

(*Myrmorchilus strigilatus suspicax*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **Chaco:** (N y A/P: Bodrati 2012a)- **Santiago del Estero:** (N: Caziani y Protomastro 1991), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Tiluchi Plomizo

(*Herpsilochmus atricapillus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Tiluchi Ala Rojiza

(*Herpsilochmus rufimarginatus rufimarginatus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Saibene 1995), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Tiluchí Colorado

(*Drymophila rubricollis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010).

Tiluchí Estriado

(*Drymophila malura*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010 e in litt. 2015).

Batará Negro

(*Pyriglena leucoptera*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Protomastro 2002), (N y A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt. 2015).

Familia Melanopareiidae

Gallito de Collar

(a) (*Melanopareia maximiliani argentina*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli en Pereyra 1942)- **Córdoba:** (A/P: Fraga en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Miatello et al. 1999), (A/P: Salvador et al. en prep.).

(b) (*Melanopareia maximiliani pallida*)

Distribución temporal: (Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Formosa: (N: Di Giacomo 2005)- **Santiago del Estero:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013).

Familia Conopophagidae

Chupadientes

(*Conopophaga lineata vulgaris*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010 e in litt 2015).

Familia Grallariidae

Chululú Pintado

(*Grallaria varia imperator*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985), (N: Protomastro 2000), (N: Castelino en Protomastro 2000), (N: Bodrati et al. 2010), (N: M. Lammertink y A. Bodrati in litt.), (N: A. Bodrati y F. Di Sallo in litt. 2015).

Chululú Cabeza Rojiza

(*Grallaria albicula*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)

Chululú Chico

(*Hylopezus nattereri*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati, F. Di Sallo y C. Ferreyra obs. pers. 2015).

Familia Rhinocryptidae

Gallito Overo

(*Psilorhamphus guttatus*)

Nota: S/I

Gallito Copetón

(*Rhinocrypta lanceolata lanceolata*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1969), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Formosa:** (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Chaco:** (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santiago del Estero:** (N: Smyth 1928), (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Lillo IML)- **Catamarca:** (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Shipton IML), (N: P. Girard en MVZ)- **La Rioja:** (De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Masramón 1962), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Mendoza:** (N: Pereyra 1951), (N: Salvador y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Mezquida 2000, 2001a, 2004), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Río Negro:** (N: Hudson 1872a), (N: Wetmore 1926), (S/D: Llanos et al. 2011).

Gallito Arena

(*Teledromas fuscus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1980a), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Tucumán: (Olrog en Fraga y Narosky 1985)- **Catamarca:** (N y A/P: S. Salvador y M. Nores obs. pers.), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Mendoza:** (N: Reed 1919), (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926), (S/D: Llanos et al. 2011).

Huet Huet Castaño

(*Pteroptochos castaneus*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Spinuzza 2013).

Huet Huet Común

(*Pteroptochos tarnii*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (A/P: Oscar 2016), (N: J. Retolaza en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (HF y A/P: Horváth y Topál 1963), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Chubut:** (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Imberti 2003, 2005).

Chucao

(*Scelorchilus rubecula ruvecula*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998).

Churrín Grande

(*Eugralla paradoxa*)

Nota: S/I

Churrín Plomizo

(*Scytalopus pachecoi*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (A/P: Bodrati et al. 2010), (J: L. Pagano obs. pers.).

Churrín Andino

(*Scytalopus magellanicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (N y J: Christie et al. 2004), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (N y J: Christie et al. 2004), (N: Oscar y La Grotteria 2013), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Chubut:** (N: J. Pemberton

en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: L. Short en AMNH)- **Tierra del Fuego:** (J: Olrog 1948), (N: L. Decius en WFVZ).

Churrín de Zimmer

(*Scytalopus zimmeri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Churrín Ceja Blanca

(*Scytalopus superciliaris superciliaris*)

Distribución temporal: (Dic., Ene.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Stiles 1979), (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985), (J: Capllonch et al. 2011), (J: L. Pagano obs. pers.).

Familia **Formicariidae**

Tovaca Común

(*Chamaea campanisona tshororo*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N y A/P: Bodrati et al. 2010), (N: Maders y Matuchaka 2011), (N: Cockle et al. 2012, 2015, 2016), (N: Maugeri 2014b), (N: Bodrati et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.).

Tovaca Colorada

(*Chamaea ruficauda*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: A. Bodrati obs. pers 2009).

Familia **Furnariidae**

Raspahojas

(*Sclerurus scansor scansor*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: A. Bodrati in litt. 2014)

Caminera Pico Largo

(*Geositta tenuirostris tenuirostris*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador et al. 1984), (S/D: Capllonch 2007), (N: Salvador 2015a).

Caminera Común

(a) (*Geositta cunicularia cunicularia*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Darrieu y Camperi 1990)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923)- **San Luis:** (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1918), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1937a, 1938), (N: Narosky 1975), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: S/C, WFVZ), (M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Tierra del Fuego:** (N: Humphrey et al. 1970), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: M. Rumboll in litt.).

(b) (*Geositta cunicularia hellmayri*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Contreras 1977, 1979a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926a), (N: Contreras 1979a), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ).

(c) (*Geositta cunicularia contrerasi*)

Distribución temporal: (Ago., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Miatello et al. 1999), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador et al. en prep.).

(d) (*Geositta cunicularia titicacae*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909)- **Salta:** (N: Höy 1980a), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001), (N. A. Bodrati in litt. 2015)- **Mendoza:** (S/D: Ferrer et al. 2011).

Caminera Puneña

(*Geositta punensis*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Salvador 2015a).

Caminera Colorada

(a) (*Geositta rufipennis rufipennis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador

2015a)- **Salta:** (N: De la Peña 1987, 2005b), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (S/D: Capllonch 2007).

(b) (*Geositta rufipennis ottowi*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013).

(c) (*Geositta rufipennis hoyi*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Reed 1919), (HF: Navas y Bó 1987a), (S/D: Ferrer et al. 2011), (N: J. Goodall en WFVZ), (N: S. Salvador obs. pers.).

(d) (*Geositta rufipennis fragai*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (N: Salvador 2015a).

(e) (*Geositta rufipennis giaeii*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Pemberton en Narosky et al. 1983), (N: Christie et al. 2004), (N: J. Pemberton en MVZ)- **Santa Cruz:** (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Caminera Patagónica

(*Geositta antarctica*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Santa Cruz: (S/D: Chebez et al. 1988), (S/D: Imberti 2005), (S/D: Coconier 2006),

(A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Olrog 1948)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 1982).

Caminera Grande

(*Geositta isabellina*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1987a)- **Mendoza:** (HF: Navas y Bó 1987a).

Tarefero

(a) (*Sittasomus griseicapillus griseicapillus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Bodrati et al. 2012), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Jujuy: (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)-

Chaco: (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Bodrati et al. 2012), (N: Uranga y Uranga en De la Peña 2016d)- **Tucumán:** (N: Capllonch 1997), (S/D: Capllonch 2007).

(b) (*Sittasomus griseicapillus sylviellus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al.

1998), (N: Partridge en Chebez 1997a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al.

2010), (N: Cockle et al. 2011, 2015), (N: Bodrati et al. 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: L. Pagano obs. pers.).

Arapasú

(*Dendrocincla turdina*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998).

Trepador Colorado

(a) (*Dendrocolaptes picumnus casaresi*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016).

(b) (*Dendrocolaptes picumnus pallescens*)

Nota: S/I

Trepador Oscuro

(*Dendrocolaptes platyrostris platyrostris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (A/P: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Saibene 1995), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2015), (N: Cockle y Bodrati 2009), (N: Norris et. al. 2010), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **Chaco:** (N: Cockle y Bodrati 2009), (S/D: Chatellenaz 2005).

Trepador de Garganta Blanca

(*Xiphocolaptes albicollis albicollis*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Mogensen en Dodge 1968), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Cockle y Bodrati 2013).

Trepador Gigante

(a) (*Xiphocolaptes major major*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Bodrati 2003), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Berkunsky y Reboreda 2009), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013).

(b) (*Xiphocolaptes major estebani*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997).

Chinchero Enano

(*Xiphorhynchus fuscus fuscus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Picapalo Colorado

(*Campylorhamphus trochilirostris hellmayri*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Bodrati et al. 2015)- **Santiago del Estero:** (N: Bodrati et al. 2015)- **Tucumán:** (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Picapalo Oscuro

(*Campylorhamphus falcularius*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Narosky et al. 1983), (N: Cockle et al. 2015, 2016), (N: Bodrati et al. 2015).

Chinchero Grande

(*Drymornis bridgesii*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santiago del Estero:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: M. Lillo en IML)- **Tucumán:** (N: Girard en Esteban 1948)- **Corrientes:** (N: D. Wilson in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013, 2016b)- **Córdoba:** (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012e, 2013f), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Zelich en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2001b), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001).

Chinchero Chico

(a) (*Lepidocolaptes angustirostris angustirostris*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Berkunsky y Reboreda 2009), (N: Berkunsky et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Lepidocolaptes angustirostris praedatus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Ruggera et al. 2016)- **Salta:** (N: P. Girard en IML)-
Santiago del Estero: (N: Narosky en Narosky et al. 1983)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 200b, 2013, 2016d)- **Córdoba:** (N: Salvador 2012e), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Beltrán en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Zelich en De la Peña 2016d)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador obs. pes.)- **Mendoza:** (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Earnshaw en Fraga y Narosky 1985), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Babarskas y López Lanús 1993), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati et al. 2006 y A. Bodrati in litt. 2015), (N: Mérida y Bodrati 2006 y A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (N: S. Salvador obs. pes.).

(c) (*Lepidocolaptes angustirostris certhiolus*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino en Fraga y Narosky 1985)- **Salta:** (N: Höy 1971), (S/D: Moschione et al. 2013).

Chinchero Escamado

(*Lepidocolaptes falcinellus*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati y Cockle 2011), (N: Cockle et al. 2012, 2015), (N: M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Picolezna Chico

(*Xenops minutus minutus*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati in litt. 2015).

Picolezna Rojizo

(a) (*Xenops rutilans rutilans*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Cockle et al. 2012), (N: A. Bodrati in litt. 2015).

(b) (*Xenops rutilans connectens*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Picolezna Patagónico

(*Pygarrhichas albogularis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013)- Río Negro: (A/P: Peters 1923), (N: Giachino en Narosky et al. 1983), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004)- Santa Cruz: (N: Radboone 1935), (S/D: Imberti 2005)- Tierra del Fuego: (N: Reynolds 1934), (N: Olrog 1948).

Bandurrita de Cola Castaña

(*Ochetorhynchus andaecola*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Salvador 2015a), (N: L. Pagano obs. pers.)- Salta: (N: Höy 1980a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013).

Bandurrita Pico Recto

(a) (*Ochetorhynchus ruficaudus ruficaudus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: De la Peña y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- Salta: (N: Höy en Narosky et al. 1983), (S/D: Moschione et al. 2013)- Catamarca: (N: Salvador 2015a)- Tucumán: (S/D: Caplonch 2007)- San Juan: (HF: Navas 1971a), (S/D: Haene et al. 2001)- Río Negro: (S/D: Llanos et al. 2011)- Santa Cruz: (A/P: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Ochetorhynchus ruficaudus famatinae*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: La Rioja: (N: S. Salvador obs. pers.)

Patagón

(*Ochetorhynchus phoenicurus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Nov.)

Distribución territorial: Neuquén: (S/D: Contreras 1977)- Río Negro: (N: Peters 1923), (N: Pemberton en Vaurie 1980), (N: Kiff en Narosky et al. 1983) - Chubut: (N: Narosky en Vaurie 1980), (N: Straneck en Narosky et al. 1983), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Uranga en De la Peña 2016d).

Bandurrita Boliviana

(*Tarphonomus harterti*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Bandurrita Chaqueña

(a) (*Tarphonomus certhioides certhioides*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Chaco: (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- Corrientes: (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Darrieu y Camperi

1990)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)-

Buenos Aires: (S/D: Mérida y Bodrati 2006).

(b) (*Tarphonomus certhioides estebani*)

Distribución temporal: (Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santiago del Estero**: (N:

S/C, IML)- **Tucumán**: (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en MVZ)-

Córdoba: (N: Castellanos 1932), (N: Pereyra 1942), (N: Narosky 1975), (N: Partridge en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador 2012e), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **La Pampa**: (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda et al. 2001).

(c) (*Tarphonomus certhioides luscina*)

Distribución temporal: (Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (HF: Navas y Bó 1987a), (S/D: Miatello et al.

1999)- **San Luis**: (N: Masramón 1962, 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983),

(HF: Navas y Bó 1987a), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (S/D: Milesi et al.

2002).

Hornero

(a) (*Furnarius rufus rufus*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al.

1998), (N: Leiva et al. 2004), (N: Bodrati et al. 2010), (N: L. Pagano obs. pers.)-

Corrientes: (N: Wilson 1977, 1979), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)-

Entre Ríos: (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Davis 1940a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires**: (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1880, 1918), (N: Holland 1892), (N: Daguerre 1920, 1922, 1924a), (N: Castellanos 1926), (N: Wetmore 1926), (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Burger 1979), (N: Fraga 1979b, 1980), (N: Mason 1985), (N: Mason y Rothstein 1986), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Haene en Babarskas et al. 2003), (N: Aldatz et al. 2005), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tájer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: Massoni et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Miquel et al. 2015), (N: Pintos et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Furnarius rufus paraguayae*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Abr., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Contino 1980)- **Salta**: (N: Miller 1917), (N:

Contino 1980), (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa**: (N: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di

Giacomo 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Friedmann 1927), **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Alabarce y Antelo 1998), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Friedmann 1927), (N: Herman y Meise 1965), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Leiva et al. 2004), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San Juan:** (N: Gelain 2012d)- **Córdoba:** (N: Friedmann 1927), (N: Castellanos 1932), (N: Salvador 1983), (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Leiva et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Partridge 1953), (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (S/D: Nellar Ramonella 1993), (N: Turienzo y Di Iorio 2010)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Macea et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Turienzo y Di Iorio 2010)- **Neuquén:** (PP: M. Bianchini in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c), (N: S. Salvador obs. pers.).

Hornero Copetón

(*Furnarius cristatus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)-

Formosa: (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Leiva et al.

2004), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Berkunsky et al. 2011), (N: Salvador y

Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Santiago del**

Estero: (N: Smyth 1928), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: S.

Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Friedman 1927), (N: Girard en Segura et al. 2014),

(N: M. Lillo en IML), (N: S. Shipton IML), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: S/C, MVZ)-

Santa Fe: (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador, Narosky y Fraga en

Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador et al. en prep.)-

San Luis: (N: Masramón 1971), (N: Nellar Romanella 1993).

Macuquito

(a) (*Lochmias nematura nematura*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al.

1998), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Lochmias nematura obscuratus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Salta:** (S/D:

Moschione et al. 2013).

Junquero

(a) (*Phleocryptes melanops melanops*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago. Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)-

Chaco: (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: S/C, WFVZ)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Zelich en Narosky et al. 1983)- **Mendoza:** (N: Partridge en Narosky et al. 1983)- **San Luis:** (N: Goodall en Friedmann et al. 1977), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (S/D: Nellar Ramonella 1993)- **Buenos Aires:** (N: White 1883), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1923, 1938), (N: Wetmore 1926), (N: San Martín 1927), (N: Smyth 1928), (N: Mac Donagh 1933), (N: Weller 1967), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Marateo 1977), (N: Orians et al. 1977), (N: Gallegos y Beltrán en Narosky et al. 1983), (N: Clavero Bonilla y Aguilar en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (Mason 1985), (Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas y Filiberto en Babarskas et al. 2003), (N: Morici en Babarskas et al. 2003), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Chiaradia et al. 2015), (N: P. Burtis en MVZ), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Christie et al. 2004), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (N: Gelain et al. 2006), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: M. Moroni in litt.).

(b) (*Phleocryptes melanops schoenobaenus*)

Nota: S/I

Pajonalera Pico Curvo

(*Limnornis curvirostris*)

Distribución temporal: (Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Uranga en De la Peña 2016d), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1934b, 1938), (N: Venturi en Narosky et al. 1983), (N: Earnshaw en Narosky et al. 1983), (N: Carman en Narosky et al. 1983), (N: Klimaitis, Yzurieta y Narosky en Narosky et al. 1983), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.).

Bandurrita Patagónica

(*Upucerthia saturatior*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- Río Negro: (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004).

Bandurrita Común

(a) (*Upucerthia dumetaria dumetaria*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Buenos Aires: (N: Narosky en Narosky et al. 1983)-

Neuquén: (S/D: Contreras 1977)- Río Negro: (S/D: Llanos et al. 2011)- Chubut: (N: Durnford 1877a), (N: Boswall 1973), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Vuilleumier 1993), (N: Harris 2008), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- Santa Cruz: (N: Pemberton en Narosky et al. 1983), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- Tierra del Fuego: (N: L. Decius en WFVZ).

(b) (*Upucerthia dumetaria hypoleuca*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Salta: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- Catamarca: (N: De la Peña 2005b, 2013)- Tucumán: (S/D: Caplonch 2007)- Córdoba: (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999)- San Juan: (S/D: Haene et al. 2001)- Mendoza: (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Ferrer et al. 2011).

Bandurrita Andina

(a) (*Upucerthia validirostris validirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: De la Peña y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Uranga en De la Peña 2016d)- Salta: (N: Höy en Narosky et al. 1983), (S/D: Moschione et al. 2013)- Catamarca: (N: Salvador 2015a)- Tucumán: (Salvador 1992), (S/D: Caplonch 2007)- San Juan: (S/D: Chebez et al. 1998)- Córdoba: (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Salvador 2012)- Mendoza: (HF: Navas y Bó 1987a).

(b) (*Upucerthia validirostris rufescens*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: La Rioja: (N: Salvador 1992).

(c) *Upucerthia validirostris jelskii*

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Remolinera Común

(*Cinclodes fuscus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (N: Christie et al. 2004)- Río Negro: (N: Pemberton en Narosky et al. 1983), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: C. Nelson en WFVZ)- Chubut: (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- Santa Cruz: (N:

Zapata 1967), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds 1935), (N: Olrog 1950), (N: Parmelee et al. 1994).

Remolinera Negra

(a) (*Cinclodes antarcticus antarcticus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1975, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Cinclodes antarcticus maculirostris*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (A/P: Reynolds 1934), (N: Reynolds 1935), (S/D: Coconier 2006)

Remolinera Serrana

(*Cinclodes comechingonus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Nores, Yzurieta y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Partridge en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Navas y Bó 1987a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Remolinera Chocolate

(*Cinclodes olrogi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta 1979a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Remolinera Andina

(a) (*Cinclodes albiventris albiventris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador 2015a), (N: Fernández Campos 2016)- **Salta:** (N: De la Peña 1983c, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013).

(b) (*Cinclodes albiventris tucumanus*)

Distribución temporal: (Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Handford 1983), (N: Salvador 1992, 2015a), (N: Caplonch et al. 2011).

(c) (*Cinclodes albiventris riojanus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (N: S. Salvador obs. pers.).

Remolinera Chica

(a) (*Cinclodes oustaleti oustaleti*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. 1983), (S/D: Ferrer et al. 2011).

(b) (*Cinclodes oustaleti hornensis*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Chebez en Narosky et al. 1983).

Remolinera Castaña

(a) (*Cinclodes atacamensis atacamensis*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: De la Peña 1983c, 1987, 2005b, 2013), (S/D:

Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007), (N: Salvador 2015a)-

Mendoza: (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Cinclodes atacamensis schocolatinus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N:

Salvador y Narosky 1984), (HF: Navas y Bó 1987a), (N: De la Peña 1987, 2005b,

2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al.

1999), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010).

Remolinera Araucana

(a) (*Cinclodes patagonicus patagonicus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Reynolds 1934),

(N: Castellanos 1937), (N: Olrog 1950), (N: Parmelee et al. 1994).

(b) (*Cinclodes patagonicus chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998),

(N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b), (N: P. Sympson en M. Rumboll in

litt.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926a), (N:

Narosky en Narosky et al. 1983), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)-

Chubut: (N: J. De Leonardis en eBird 2015g)- **Santa Cruz:** (N: Pemberton en Narosky

et al. 1983), (N: R. González en M. Rumboll in litt.).

Picolezna Estriado

(*Heliobletus contaminatus camargoii*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Cockle et al. 2012, 2015), (N: A. Bodrati y L. Pagano in litt.).

Ticotico de Cabeza Negra

(*Philydor atricapillus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati obs. pers. 2012).

Ticotico Grande

(*Philydor rufum rufum*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Olrog en Narosky et al. 1983), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 2015).

Ticotico de Cejas Blancas

(*Anabacerthia amurotis*)

Nota: S/I

Ticotico Ocráceo

(*Anabacerthia lichtensteini*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Saibene 1995), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010, N: A. Bodrati, F. Di Sallo y C. Ferreyra in litt. 2015).

Ticotico Común

(a) (*Syndactyla rufosuperciliata oleaginea*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2015)- **Chaco:** (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

(b) (*Syndactyla rufosuperciliata acrita*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998), (N: L. Salvador obs. pers.), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Coconier et al. 2007), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Caplonch 1997), (S/D: Caplonch 2007).

Tacuarero

(*Clibanornis dendrocolaptoides*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010 y N: A. Bodrati in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Ticotico de Ojos Blancos

(*Automolus leucophthalmus sulphurascens*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati in litt. 2015).

Rayadito

(*Aphrastura spinicauda spinicauda*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: J. Retolaza en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego:** (N: Olrog 1950), (N: Humphrey et al. 1970), (A/P: Keith en Humphrey et al. 1970), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

Colilarga

(*Sylviorthorhynchus desmursii*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (N: Radboone 1935).

Coludito Canela

(*Leptasthenura fuliginiceps paranensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Abr., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **Salta:** (N: Höy 1968), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Salvador 2015a)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001)- **Córdoba:** (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (N: Miatello et al. 1999).

Coludito Ocráceo

(*Leptasthenura yanacensis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Coludito Copetón

(*Leptasthenura platensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Catamarca:** (N: Salvador y Salvador en prep.), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: Navas y Bó 1987a), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012e), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N:

Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Zelich en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Bodrati 2013a, 2013c), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Navas y Bó 1987a), (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2001b), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Earnshaw en Narosky et al. 1983), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Bodrati et al. 2006, A. Bodrati in litt. 2015), (N: Mérida y Bodrati 2006, A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Pintos et al. 2015), (N: L. Short en WFVZ)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Coludito Cola Negra

(a) (*Leptasthenura aegithaloides berlepschi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Lönnberg 1903), (N: Contino 1980), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013).

(b) (*Leptasthenura aegithaloides pallida*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1987a)- **Mendoza:** (N: Partridge en Narosky et al. 1983), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Narosky et al. 1990), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en)- **Chubut:** (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Vuilleumier 1993), (N: Harris 2008), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: M. Moroni in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1988), (J: De Luca y Saggese 1992).

Coludito de los Pinos

(*Leptasthenura setaria*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010 e in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Espinero Frente Rojiza

(*Phacellodomus rufifrons sincipitalis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et

al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (N: A. Bodrati 2013 in litt.)- **Chaco:** (N: Bodrati 2005b)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Coria et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Mogensen 1927), (N: Smyth 1928), (N: Olrog en Friedmann et al. 1977), (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ).

Espinero Andino

(*Phacelldomus striaticeps striaticeps*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Lönnberg 1903), (N: Smyth 1928) (N: Budin en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013), (N: S. Salvador y M. Nores obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Olrog en Friedmann et al. 1977), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Caplonch 2007), (N: Salvador 2015a).

Espinero Chico

(*Phacelldomus sibilatrix*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., May., Jun., Jul. Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Miquel et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Soria et al. 2012)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Bodrati 1999 in litt.), (S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba:** (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador 2013e, 2013f), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: A. Bodrati 1996-1998 in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1938), (N: Narosky y Micucci en Narosky et al. 1983), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: M. Rumboll in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Espinero Serrano

(*Phacelldodomus maculipectus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Marciada 2015), (N: Uranga en De la Peña 2016d), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (N: Mazar Barnett et al. 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Catamarca:** (N: Salvador 1992).

Espinero Pecho Manchado

(*Phacelldodomus striaticollis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Kerr 1892)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba:** (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (N: Gibson 1918), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Pereyra en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Narosky y De la Peña en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Earnshaw en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Miquel et al. 2015), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Espinero Grande

(*Phacelldodomus ruber*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Abr., May., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Salta:** (N: E. Depino et al. en eBird 2015d)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Bodrati y Salvador 2015), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Mogensen 1927), (N: Smyth 1928), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ)- **Corrientes:** (N: Zelich en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (HF: Darrieu y Camperi 1990), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013, 2016d), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Pautasso 2002), (N: De la Peña et al. 2003), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Bodrati in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N:

Bodrati et al. 2001 en Bodrati et al. 2006), (N: E. Sierra 2000 a 2014 in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.).

Leñatero

(*Anumbius annumbi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Turienzo y Di Iorio 2014a), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Turienzo y Di Iorio 2008, 2014a), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Nores 1995), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Friedmann 1927), (Smyth 1928), (Zelich en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b), (N: Turienzo y Di Iorio 2008 y 2014a), (N: Miquel et al. 2015), (N y J: A. Bodrati in litt 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (N: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Hussey 1916), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Gallegos y Beltrán en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Mason 1985), (N: Gómez y Massoia 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Mérida y Bodrati 2006 e in litt. 2015), (N: Tajer et al. 2007), (N: Turienzo y Di Iorio 2008 y 2014), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Delhey et al. 2010, 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Miquel et al. 2015), (N: Pintos et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Turienzo y Di Iorio 2008 y 2014a), (N: Miquel et al. 2015)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Crestudo

(*Coryphistera alaudina*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Areta y Bodrati 2007), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Areta y Bodrati 2007), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Turienzo y Di Iorio 2014b), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Miquel et al. 2015), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Martín et al. 2009), (N: Turienzo y Di Iorio 2014b)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P.

Girard en WFVZ)- **Corrientes**: (N: Wilson 1977)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña et al. 2003) (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba**: (N: Castellanos 1932), (N: Partridge 1953), (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Turienzo y Di Iorio 2014b), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Miquel et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928), (N: Davis 1940a), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis**: (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (N: Contreras 1980c)- **Buenos Aires**: (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Narosky et al. 1990), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (N: Turienzo y Di Iorio 2014b).

Canastero Rojizo

(*Asthenes dorbignyi dorbignyi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Nores en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- **Salta**: (N: Höy 1980a), (N: Di Iorio et al. 2010), (N: Turienzo y Di Iorio 2013), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Miquel et al. 2015)- **Catamarca**: (N: Salvador 2015a)- **Tucumán**: (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Turienzo y Di Iorio 2013), (N: Salvador 2015a), (N: Uranga en De la Peña 2016d)- **La Rioja**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza**: (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Navas y Bó 1987a).

Canastero Chaqueño

(a) (*Asthenes baeri baeri*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (N: Höy en Friedmann 1963), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco**: (N: L. Pagano obs. pers.), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Santiago del Estero**: (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983)- **Tucumán**: (N: Hartert y Venturi 1909)- **Corrientes**: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1980, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San Juan**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba**: (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983)- **Buenos Aires**: (N: Salvador y Salvador 1984), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)-

La Pampa: (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001)- **Río Negro:** (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011).

(b) (*Asthenes baeri neiffi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Luis:** (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (N: Partridge en Narosky et al. 1983), (N: Mezquida 2000, 2001b).

Espartillero Pampeano

(*Asthenes hudsoni*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Wilson 1926)- **Córdoba:** (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Wetmore 1926), (N: Pereyra 1938), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Runnacles en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: A. Bodrati in litt. 2015).

Espartillero Austral

(*Asthenes anthoides*)

Distribución temporal: (Ene., Set.)

Distribución territorial: **Santa Cruz:** (N: Roesler et al. 2014).

Espartillero Estriado

(*Asthenes maculicauda*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Espartillero Serrano

(a) (*Asthenes sclateri sclateri*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (HF: Navas y Bó 1982), (N: Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Montaldo en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Salvador 1984, 1988, 2012), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Bodrati 2011).

(b) (*Asthenes sclateri lilloi*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1975), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Tucumán: (N: Caplonch et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.).

Canastero Pálido

(a) (*Asthenes modesta modesta*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 1983c, 1987, 2013)- **Salta:** (N: De la Peña 1983c, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013).

(b) (*Asthenes modesta hilereti*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (J: Caplonch et al. 2011).

(c) (*Asthenes modesta australis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1987a), (S/D: Haene et al. 2001), (N: Marinero y Cortez 2012)- **Mendoza:** (N: Contreras 1979b), (HF: Navas y Bó 1987a), (S/D: Ferrer et al. 2011)- **Río Negro:** (N: Pemberton en Vauri 1980), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Santa Cruz:** (J: L. Pagano obs. pers.).

(d) (*Asthenes modesta corbogae*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b), (HF: Navas y Bó 1987a), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Canastero Coludo

(a) (*Asthenes pyrrholeuca pyrrholeuca*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta 1975), (N: Nores, Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983)- **Buenos Aires:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Salvador 1984)- **La Pampa:** (Pereyra 1937a)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (N: Vuilleumier 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

(b) (*Asthenes pyrrholeuca sordida*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Salvador, Fraga y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004).

Canastero Quebradeño

(*Asthenes heterura*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Pajonalera Pico Recto

(*Limnoctites rectirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Daguerre en Pereyra 1938)- **Buenos Aires:** (N: Ricci y Ricci 1985), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús et al. 1999), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: López Lanús y Babarskas en Babarskas et al. 2003).

Curutié Ocráceo

(*Cranioleuca sulphurifera*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Gibson 1918), (N: Pereyra 1938), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (J: L. Pagano obs. pers.).

Curutié Blanco

(*Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy en Friedmann 1963), (N: Höy y Ottow 1964), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Bodrati y Salvador 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Salvador y Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Fraga en Fraga y Narosky 1985), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Zelich en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (N: Pereyra 1951), (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (N: S. Salvador y L. Salvador 1984), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2001b), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y S. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Curutié Oliváceo

(*Cranioleuca obsoleta*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Castelino y Saibene 1989), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati 2009 in litt.).

Canastero Patagónico

(*Pseudasthenes patagonica*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Mendoza: (N: Contreras 1980b), (HF y N: Navas y Bó 1987a)-

Buenos Aires: (N: Narosky 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Vuilleumier 1993), (N: Delhey y Fulvio Pérez 2013), (N: Zainz Trápaga en De la Peña 2016d) (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.).

Canastero Castaño

(*Pseudasthenes steinbachi*)

Distribución temporal: (Ene., Nov.)

Distribución territorial: Salta: (N: Höy en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b,

2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **La Rioja:** (N: Salvador 1992), (N: Lobo Allende et al. 2010)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Areta et al. 2012).

Espartillero Enano

(*Spartonoica maluroides*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Córdoba: (N: Nores y Yzurieta 1979c), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N: Salvador 2013f), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Grant 1911), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1933b, 1938), (N: Narosky 1973c), (N: Runnacles en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Llambías et al. 2009), (N: Cardoni et al. 2013), (N: De la Peña 2013), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Cardoni et al. 2015a), (N: L. Pagano obs. pers.).

Cacholote Castaño

(*Pseudoseisura lophotes argentina*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)-

Formosa: (N: A. Bodrati in litt.)- **Chaco:** (N: A. Bodrati in litt.), (N: L. Pagano obs.

pers.)- **Catamarca:** (N: A. Bodrati in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: A. Bodrati in litt.)-

Tucumán: (N: P. Girard en MVZ)- **Corrientes:** (N: Wilson en Narosky et al. 1983),

(HF: Darrieu y Camperi 1990), (N: A. Bodrati in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987,

2005b, 2013), (N: Antoniazzi et al. 2010), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011)- **La Rioja:**

(N: Hartert y Venturi 1909), (N: A. Bodrati in litt.)- **San Juan:** (N: Navas y Bó 1987a)- **Córdoba:** (N: Rodríguez 1918a), (N: Castellanos 1932), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Nores y Nores 1994), (N: Nores 1995), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador 2013f), (N: Turienzo y Di Iorio 2014a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Miquel et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Davis 1940a), (N: Zelich en Narosky et al. 1983), (N: Eberhard 1996), (N: Aramburú y Campos Soldini 2008), (N: Turienzo y di Iorio 2014a), (N: A. Bodrati in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (N: Rodríguez 1918a), (N: Masramón 1971), (N: Masramón en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Nellar Romanella 1993), (N: A. Bodrati in litt.)- **Mendoza:** (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Bodrati y Sierra 2003), (Bodrati et al. 2006)- **La Pampa:** (N: Rodríguez 1918), (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Turienzo y Di Iorio 2014a), (N: A. Bodrati in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (N: Babarskas et al. 1996), (N: M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Cacholote Pardo

(a) (*Pseudoseisura gutturalis gutturalis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Camperi 1992)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Neuquén:** (N: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: S. Salvador y Narosky obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Hudson 1872a, 1885), (N: Peters 1923), (N: Casas 1992b), (A/P: Christie et al. 2004), (N: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Gelain 2012b)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Harris 2008), (N: Delhey y Fulvio Pérez 2013), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967).

(b) (*Pseudoseisura gutturalis ochroleuca*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1976b), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **La Rioja:** (N: Lobo Allende et al. 2010), (N: A. Bodrati 2013 in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (N: Navas y Bó 1987a), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Mendoza:** (N: Contreras 1980c), (N: De la Peña 2005b), (N: S. Salvador obs. pers.).

Chotoy

(*Schoeniophylax phryganophilus phryganophila*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Salvador, Narosky y

Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Corrientes**: (HF: Darrieu y Camperi 1990), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: D. Wilson in litt.)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: De la Peña et al. 2003), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba**: (N: Salvador (1982, 2013f), (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos**: (N: Barrows 1883), (N: Smyth 1928), (N: Davis 1940a), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires**: (N: Pereyra 1938), (N: Earnshaw en Narosky et al. 1983), (N: Klimaitis en Narosky et al. 1983), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Klimaitis et al. 2014), (N: Miquel et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.).

Curutié Colorado

(*Certhiaxis cinnamomeus russeolus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones**: (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Formosa**: (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Bodrati y Salvador 2015), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes**: (N: Zelich en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (S/D: Fraga 2001), (N: de la Peña et al. 2003), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000, 2002)- **Córdoba**: (N: Nores et al. 1983), (N: Miatello et al. 1991), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos**: (N: Barrows 1883), (N: Smyth 1928)- **Buenos Aires**: (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Babarskas y López Lanús 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006).

Pijuí Canela

(*Synallaxis scutata whitii*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador obs. pers.)- **Salta**: (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013).

Pijuí Negruzco

(*Synallaxis cinerascens*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Partridge en Chebez 1997a), (A/P: Bodrati et al. 2010), (J: L. Pagano obs. pers.).

Pijuí Corona Rojiza

(*Synallaxis ruficapilla*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati y Salvador 2015)- **Corrientes:** (N: Short 1971).

Pijuí Plomizo

(*Synallaxis spixi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Davis 1940a)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1927b, 1938), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Saibene, Carman y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.).

Pijuí Cola Parda

(*Synallaxis albescens australis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. 1983)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (N: Haene et al. 1995)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1932), (N: Salvador 1982, 2013f), (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: Salvador y Salvador 1984, 2014), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Miatello et al. 1999), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky et al. 1983), (N: C. Smyth en MVZ)- **San Luis:** (N: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983)- **Mendoza:** (N: Partridge en Narosky et al. 1983), (N: Mezquida 2000, 2001b), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Hussey 1916), (N: Zuberbühler 1953, 1971), (N: Fraga en Narosky et al. 1983), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: Pereyra en Narosky et al. 1983), (S/D: Maceda y Kin 2001), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b).

Pijuí Frente Gris

(*Synallaxis frontalis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (N: Höy 1968), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky et al. 1983), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Girar en Pereyra 1938), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (N: Darrieu y Camperi 1990), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: De la Peña et al. 2003), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Salvador (1982, 2013f), (N: Narosky en Narosky et al. 1983), (N: Salvador en Narosky et al. 1983), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Zelich en Narosky et al. 1983)- **San Luis:** (N: Masramón 1971)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: E. Sierra 2014 in litt.), (N y J: L. Pagano obs. pers.).

Pijuí de Ceja Canela

(*Synallaxis azarae superciliosa*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Girard en Narosky et al. 1983), (N: Dinelli en Narosky et al. 1983), (N: Girard en Segura et al. 2014).

Familia Tyrannidae

Mosqueta Pico Curvo

(*Phyllomyias burmeisteri burmeisteri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010).

Mosqueta Corona Oliva

(*Phyllomyias virescens*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino y Saibene 1989), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Mosqueta Corona Gris

(*Phyllomyias sclateri sclateri*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918b).

Mosqueta Olivácea

(*Phyllomyias fasciatus brevirostris*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010).

Fiofío Ceniciente

(*Myiopagis caniceps caniceps*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: De la Peña 1996, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010, e in litt.) (N: A. Bodrati in litt. 2015).

Fiofío Corona Dorada

(*Myiopagis viridicata viridicata*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Bodrati 2006)- **Tucumán:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Corrientes:** (HF: Darrieu 1987).

Fiofío Copetón

(*Elaenia flavogaster flavogaster*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: Castelino y Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: A. Bodrati obs. pers. 1998)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1992), (N: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Bodrati obs. pers. 2003).

Fiofío Grande

(*Elaenia spectabilis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Santiago del Estero:** (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **Corrientes:** (N y HF: Darrieu y Camperi 1992), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1973, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Grassini 2012)-

Buenos Aires: (N: Bodrati et al. 2001 en Bodrati et al. 2006), (A/P: Mérida y Bodrati 2006).

Fiofío Silbón

(*Elaenia albiceps chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1971), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Tucumán: (N: Smyth 1928), (N: Noris en Friedmann 1931), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Mendoza:** (N: Reed 1913), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Neuquén:** (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Blackburn en Narosky y Salvador 1998), (N: Nores en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Eroles en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Babarskas, Filiberto y Veiga en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Río Negro:** (N: García en Narosky y Salvador 1998), (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Nores en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Bettinelli en Narosky y Salvador 1998), (N: Casas en Narosky y Salvador 1998), (N: Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Ojeda y Trejo 2002), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Salvador, Narosky y Rodríguez Moulín en Narosky y Salvador 1998), (N: Gorosito y Cueto 2015), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds 1934), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

Fiofío Pico Corto

(*Elaenia parvirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1971), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997)-

Corrientes: (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)-

Córdoba: (N: Castellanos 1933), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Eroles en Narosky y Salvador 1998) (N: Salvador 2013b), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Zelich en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1937a), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo y Aguilar en Narosky y Salvador 1998), (N:

Babarskas y Veiga en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Godoy et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (S/D: Maceda et al. 2001), (N: S. Salvador obs. pers.).

Fiofío Oliváceo

(*Elaenia mesoleuca*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: Misiones: (N: Saibene et al. 1996), (N: Narosky y Rodríguez Moulin en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998).

Fiofío Plomizo

(*Elaenia strepera*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Eguia 2016)- **Salta:** (N: De la Peña 1996, 2005b, 2013), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Caplonch 1997), (N: Lillo en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014).

Fiofío Belicoso

(*Elaenia chiriquensis albivertex*)

Nota: S/D

Fiofío Oscuro

(a) (*Elaenia obscura obscura*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014).

(b) (*Elaenia obscura sordida*)

Nota: S/I

Piojito Silbón

(a) (*Camptostoma obsoletum obsoletum*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Formosa: (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010, N: A. Bodrati y F. Di Sallo obs. pers. 2013)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: De la

Peña 2005b), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba**: (N: Yzurieta y Nores 1983), (N: Schulz en Narosky y Salvador 1998), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Straneck en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928)- **San Luis**: (N: Bettinelli en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires**: (S/D: Narosky, Fernández y Babarskas en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati et al. 2006, A/P: A. Bodrati 2015), (N: Mérida y Bodrati 2006), (N: Salvador y Bodrati 2013a).

(b) (*Camptostoma obsoletum bolivianum*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014).

Suirirí Común

(Suiriri suiriri suiriri)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Santiago del Estero**: (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Tucumán**: (N: Friedmann 1927)- **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba**: (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Narosky, Klimaitis y Zelich en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **San Luis**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires**: (N: Earnshaw en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011).

Piojito de los Pinos

(Mecocerculus hellmayri)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Salta**: (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (S/D: Moschione et al. 2013).

Piojito Gargantilla

(Mecocerculus leucophrys leucophrys)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Salvador y Salvador obs. pers.), (N: Salvador obs. pers.)- **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998)- **Tucumán**: (N: Salvador, Narosky y Fraga en

Narosky y Salvador 1998), (N: Hethke, Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998).

Torito Pico Amarillo

(*Anairetes flavirostris flavirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Acosta en De la Peña 2001b), (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **San Juan:** (N: Mérida y Bodrati 2004)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (N: Cali y Güller 2006)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (N: Marín en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Llanos et al. 2011).

Cachudito de Pico Negro

(a) (*Anairetes parulus parulus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Rumboll y Canevari en Narosky y Salvador 1998)- **Río Negro:** (N: Retolaza en Narosky y Salvador 1998), (N: Casas en Narosky y Salvador 1998), (N: Fernández en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Casas en De la Peña 2016e)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005).

(b) (*Anairetes parulus aequatorialis*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Smyth 1928)- **Salta:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013).

(c) (*Anairetes parulus patagonicus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (N: Mérida y Bodrati 2004)- **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 2012)- **San Luis:** (N: Masramón en Narosky y Salvador 1998)- **Mendoza:** (N: Pereyra 1951), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Pérez 2014)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **Río Negro:** (N: Hudson 1872a), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998).

Piojito Gris

(*Serpophaga nigricans*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (A/P: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **San Luis:** (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918),

(N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Rodríguez Mata en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús y Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Di Giacomo y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Morici en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: E. Sierra 2011 in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Piojito Común

(*Serpophaga subcristata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918b)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (N: Wilson en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000, 2002), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Eroles en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013) (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **San Luis:** (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Holland 1891, 1892), (N: Gibson 1918), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo y Aguilar en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Di Giacomo y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Babarskas y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998)- **Río Negro:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Piojito Vientre Blanco

(*Serpophaga munda*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Tucumán:** (N: Caplonch 1997)- **La Rioja:** (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998)- **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **Mendoza:** (N: Reed 1919)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

Piojito Trinador

(*Serpophaga griseicapilla*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2004), (N: Mezquida y Marone 2000, 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (N: Mezquida en de la Peña 2005b), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Piojito Pardo

(*Phaeomyias murina murina*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998)- **Chaco:** (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Catamarca:** (N: Salvador en prensa)- **La Rioja:** (A/P: Nores e Yzurieta 1982).

Mosqueta Ceja Amarilla

(*Capsiempis flaveola flaveola*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Saibene 1987), (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Bodrati et al. 2010).

Tachurí Canela

(*Polystictus pectoralis pectoralis*)

Distribución temporal: (Set., Nov., Dic)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Giai 1950)- **Córdoba:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1893), (N: Pereyra 1933b, 1938), (S/D: Roda en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Carrizo y Delhey 2008), (J: L. Pagano obs. pers.).

Doradito Copetón

(*Pseudocolopteryx sclateri*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1987), (N: Di Giacomo 1992), (S/D: Narosky y Di Giacomo

1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Pagano et al. 2012), (J: L. Pagano obs. pers.).

Doradito Oliváceo

(*Pseudocolopteryx acutipennis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Budin en Dinelli 1918), (N: Smyth 1928)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918b), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Blendinger 1998), (N: Ortiz et al. 2006), (S/D: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011)- **Córdoba:** (A/P: Castellanos 1933), (A/P: Biancucci 1995), (S/D: Miatello et al. 1999), (A/P: Di Giacomo, Casañas y Marchisio en Navas 2002), (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Buenos Aires:** (N: Roesler 2009)- **La Pampa:** (N: Maceda 2009), (S/D: Bruno et al. 2007).

Doradito Pardo

(*Pseudocolopteryx dinelliana*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1933)- **Córdoba:** (N: Molli 1985), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014).

Doradito Común

(*Pseudocolopteryx flaviventris*)

Distribución temporal: (Ene. Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1918), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Darrieu et al. 1988), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Cardoni et al. 2015b).

Doradito Limón

(*Pseudocolopteryx citreola*)

Distribución temporal: (Dic., Mar.)

Distribución territorial: San Juan: (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Mendoza:** (N: Abalos y Areta 2009)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (A/P: López Lanús et al. 2008)- **Río Negro:** (N: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c).

Mosquitero

(*Corythopis delalandi*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Misiones: (A/P: Bodrati et al. 2010).

Barullero

(*Euscarthmus meloryphus meloryphus*)

Distribución temporal: (Ene. Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Shipton en Narosky y Salvador 1998)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Fraga y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Babarskas, Veiga y Filiberto en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires:** (N: Babarskas y López Lanús 1993), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati et al. 2006, A. Bodrati in litt, 2015), (A/P: Mérida y Bodrati 2006, A. Bodrati in litt, 2015).

Calandrita

(a) (*Stigmatura budytoides inzonata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Salta: (N: De la Peña 1987), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Lillo en Narosky y Salvador 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918b), (N: Alabarce 1987), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ)- **San Juan:** (N: S. Salvador y M. Nores obs. pers.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b)- **San Luis:** (N: Masramón 1969), (N: Salvador, Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en prep.), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador et al. en prep.).

(b) (*Stigmatura budytoides flavocinerea*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Mendoza: (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Narosky 1983), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Salvador, Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011).

Mosqueta Media Luna

(*Phylloscartes eximius*)

Distribución temporal: (Ago.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati y Cockle 2007b), (N: Bodrati et al. 2010).

Mosqueta Común

(a) (*Phylloscartes ventralis ventralis*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Bodrati et al. 2010)-

Entre Ríos: (N: Zelich en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: A. Bodrati en Kirwan et al. 2010)-

Buenos Aires: (N: Klimaitis 1984), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Cortés Loudet en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: A. Bodrati en Kirwan et al. 2010), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012).

(b) (*Phylloscartes ventralis tucumanus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L.

Salvador obs. pers.)- **Salta:** (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Catamarca: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en WFVZ), (N: S. Salvador obs. pers.).

Mosqueta de Orejas Negra

(*Phylloscartes paulista*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: A. Bodrati obs. pers. 2010).

Mosqueta Cara Canela

(*Phylloscartes sylviolus*)

Distribución temporal: (Ago., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Kirwan et al. 2010), (N: Bodrati et al. 2010).

Ladrillito

(*Mionectes rufiventris*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino y Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (C: Bodrati et al. 2010), (N: Di Sallo y Bodrati 2015).

Mosqueta Corona Parda

(*Leptopogon amaurocephalus amaurocephalus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Coconier et al. 2007)- **Salta:** (A/P: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Partridge en Chebez 1997), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.).

Suirirí de Pico Corto

(*Sublegatus modestus brevirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Lillo en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S/D, WFVZ)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1979, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: De la Peña et al. 2003)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Blanco en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador, Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001)- **Buenos Aires:** (N: Narosky et al. 1990), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.), **La Pampa:** (S/D: Maceda et al. 2001), (N: Dolsan 2014)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Piojito Picudo

(*Inezia inornata*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: A. Bodrati in litt.).

Tachurí Sietecolores

(a) (*Tachuris rubrigastra rubrigastra*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1880, 1918), (N: Holland 1892), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Weller 1967), (N: Orians et al. 1977), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998), (N: Gallegos y Beltrán en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, López Lanús y Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al.

1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Pereira en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y J: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén**: (N: Contreras 1977), (A/P: Veiga en De la Peña 2016e)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011)- **Santa Cruz**: (N: M. Moroni in litt.).

(b) (*Tachuris rubrigastra alticola*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013).

Tachurí Coludo

(Culicivora caudacuta)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo et al. 2009)- **Chaco**: (N: Hartert y Venturi 1909).

Mosqueta Enana

(Myiornis auricularis auricularis)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Bodrati et al. 2010).

Mosqueta de Anteojos

(Hemitriccus diops)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones**: (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Mosqueta Ojo Dorado

(Hemitriccus margaritaceiventer margaritaceiventer)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Contino 1980), (N: Contino en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Contino en WVFZ)- **Salta**: (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Chaco**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005)- **Catamarca**: (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998)- **Tucumán**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes**: (N: Contreras 1988), (N: Darrieu y Camperi 1992), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1973, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba**: (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N y A/P: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires**: (A/P: Bodrati et al. 2001 en Bodrati et al. 2006 y Mérida y Bodrati 2006).

Mosqueta Cabeza Canela

(a) (*Poecilotriccus plumbeiceps plumbeiceps*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati y F. Di Sallo in litt. 2015).

(b) (*Poecilotriccus plumbeiceps viridiceps*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (N: Contino 1980), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: S. Salvador obs. pers.).

Mosqueta Pico Pala

(*Todirostrum cinereum coloreum*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Nuñez Montellano et al. 2009), (N: García Allievi 2013), (N: Olejnik 2013), (N: A. Bodrati in litt.).

Picochato Grande

(a) (*Tolmomyias sulphurescens sulphurescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013c, N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: Cockle et al. 2016), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz 2004), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Tolmomyias sulphurescens pallescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998)- **Tucumán:** (N: Girard en Dinelli 1918b), (N: Girard en Segura et al. 2014).

(c) (*Tolmomyias sulphurescens grisescens*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco:** (N: Daguerre en Pereyra 1938), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: De la Peña 2013), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Bodrati y Salvador 2015).

Picochato Enano

(*Platyrinchus mystaceus mystaceus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 2008).

Mosqueta Estriada

(*Myiophobus fasciatus auriceps*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: C. Olrog en WFVZ)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **San Juan:** (N: Haene et al. 1995)- **Córdoba:** (N: Galassi en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998)- **San Luis:** (N: Masramón 1969)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Pereyra 1938), (N: Fraga 1983), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús y Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo y Agilar en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Maugeri 2006a), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

Birro Chico

(*Pyrrhomylia cinnamomeus cinnamomeus*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: R. Fraga in litt.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Ortiz et al. 2012).

Birro Común

(*Hirundinea ferruginea pallidor*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Salvador et al. en prensa)- **Tucumán:** (N: Girard en Dinelli 1918)-

Córdoba: (S/D: Miatello et al. 1999), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: S. Salvador obs. pers.).

Mosqueta Parda

(a) (*Lathrotriccus euleri euleri*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati y F. Di Sallo obs. pers. 2015).

(b) (*Lathrotriccus euleri argentinus*)

Distribución temporal: (Ene, Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Höy en De la Peña 2005b, 2013), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997)- **Corrientes:** (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **Entre Ríos:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Arturi en Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012).

Mosqueta Ceja Blanca

(a) (*Cnemotriccus fuscatus fuscatus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati et al. 2010).

(b) (*Cnemotriccus fuscatus bimaculatus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (HF: Short 1971), (HF: Darrieu y Camperi 1992)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Burlisto Copetón

(*Contopus fumigatus brachyhynchus*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bernasconi 2013)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Burlisto Chico

(a) (*Contopus cinereus cinereus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998).

(b) **Burlisto Chico** (*Contopus cinereus pallescens*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: G. Höy en MZFC).

Viudita de Río

(*Sayornis nigricans latirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Nores en Narosky y Salvador 1998), (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: S. Salvador y L. Salvados obs. pers.)- **Salta:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918b), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998).

Churrinche

(*Pyrocephalus rubinus rubinus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (J: Chatellenaz 2008)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)-**Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Girard en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Wilson en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1924, 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b), (N: Pautasso 2000, 2002), (N: Leiva et al. 2004)- **San Juan:** (N: Haene et al. 1995)- **Córdoba:** (N: Galassi en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **San Luis:** (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Masramón en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1872c), (N: Gibson 1880, 1918), (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Smyth 1928), (Bó 1973), (N: Fraga 1977), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Di Giacomo y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Babarskas y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Fiorini y Rabuffetti 2003), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (N: Couri et al. 2005), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tاجر et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Maugeri 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Macea et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007) (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.).

Sobrepuesto Común

(*Lessonia rufa*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: Pereyra 1951), (N: Salvador, Narosky y Rodríguez Moulín en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Gelain y Diez Peña 2007), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: C. Nelson en WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ)- **Chubut:** (N: Boswall 1973), (N: Salvador, Narosky y Rodríguez Moulín en Narosky y Salvador 1998), (N: Harris 2008), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (N: De la Peña 1986a, 1987, 2005b, 2013), (N: De Luca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: M. Moroni in litt.), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee et al. 1994), (N: Rumboll y Jehl en Narosky y Salvador 1998), (N: Chebez en Narosky y Salvador 1998), (N: L. Decius en WFVZ).

Sobrepuesto Andino

(*Lessonia oreas*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador et al. en prensa).

Viudita Plomiza

(*Knipolegus cabanisi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov. Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Catamarca:** (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1918b), (N: Smyth 1928), (N: Friedmann 1929), (N: Lillo en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: P. Girard en MVZ).

Viudita Pico Celeste

(*Knipolegus cyanirostris*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1937a, 1938), (N: Di Giacomo 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.).

Viudita Chaqueña

(*Knipolegus striaticeps*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Tucumán: (N: Girart en Dinelli 1918b)- **Chaco:** (N: L. Pagano obs. pers.)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.), (N: J. Heredia in litt.).

Viudita Común

(*Knipolegus aterrimus aterrimus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino en Narosky y Salvador 1998), (N: A.

Contino en WVFZ), (N: S/C, WVFZ), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (N: De la Peña

2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y

Venturi 1909), (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998)- **San Juan:**

(N: Nores y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Haene et al. 2001), (N: A.

Bodrati 2000 in litt.)- **Córdoba:** (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014),

(N: Salvador et al. en prep.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (N: Masramón 1969)-

Mendoza: (N: Reed 1919), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998)-

Buenos Aires: (S/D: DECB 2011)- **La Pampa:** (N: Fernández en Narosky y Salvador

1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Viudita Chica

(*Knipolegus hudsoni*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Catamarca:** (N: Maugeri 2014a), (A/P: S. Salvador obs.

pers.)- **San Juan:** (N: Lucero 2014)- **Buenos Aires:** (S/D: Scoffield en Caplonch et al.

2014)- **La Pampa:** (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Neuquén:** (A/P: Veiga et al.

2002), (N: Maugeri 2014)- **Río Negro:** (N: Agnolin et al. 2009), (S/D: Llanos et al.

2011).

Pico de Plata

(a) (*Hymenops perspicillatus perspicillatus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di

Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)-

Corrientes: (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Friedmann 1927), (N: De la Peña 1986a, 1987, 2005b, 2013)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Nores e

Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth

1923), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1918), (N: Holland 1892), (N: Pereyra 1938), (N: Orians et al. 1977), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N:

Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Klimaitis en Narosky

y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús, Veiga y Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Di Giacomo y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Mattos et al. 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Pretelli y Isacch 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Pretelli et al. 2016), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Hymenops perspicillatus andina*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: González del Solar 1987), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Hethke en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador, Salvador y Eroles en Narosky y Salvador 1998), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Bodrati 2011)-

Neuquén: (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)-

Río Negro: (N: Casas en Narosky y Salvador 1998), (N: Christie et al. 2004), (S/D:

Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998), (N: J.

Pemberton WFVZ)- **Santa Cruz:** (J: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Imberti 2005).

Suirirí Amarillo

(Satrapa icterophrys)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)-

Tucumán: (N: Friedman 1927, 1929), (N: Caplonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014)-

Corrientes: (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (N: R. Crossin en WFVZ)-

Santa Fe: (N: De la Peña 1983b, 1986b, 1987,

2005b, 2013), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Pautasso 2000, 2002),

(N: Leiva et al. 2004)-

Córdoba: (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador

2013b), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador

et al. en prep.)-

Entre Ríos: (N: Barrows 1883), (N: Smyth 1928), (N: Salvador y

Narosky en Narosky y Salvador 1998)-

Buenos Aires: (N: Gibson 1880, 1918), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Mason 1985), (N: Darrieu et al. 1988),

(S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N:

Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998),

(N: Babarskas y Filiberto en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y

Salvador 1998), (N: Narosky y Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky y

Saibeneen Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001),

(N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N:

Couri et al. 2005), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D:

DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.).

Dormilona Chica

(*Muscisaxicola maculirostris maculirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007)- **San Juan:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (N: Rasmussen 1985), (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998)- **Santa Cruz:** (J: De Lucca y Saggese 1992).

Dormilona Puneña

(*Muscisaxicola juninensis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Dormilona Cenicienta

(a) (*Muscisaxicola cinereus cinereus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1994), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Mendoza:** (S/D: Ferrer et al. 2011).

(b) (*Muscisaxicola cinereus argentina*)

Distribución temporal: (Ene., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1980c), (S/D: Moschione et al. 2013)- **La Rioja:** (N: Salvador et al. en prensa).

Dormilona Fraile

(*Muscisaxicola flavinucha flavinucha*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **La Rioja:** (A/P: Bodrati y Ferrari 2014)- **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1994)- **Mendoza:** (S/D: Ferrer et al. 2011), (N: Ferrer et al. 2014), (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Río Negro:** (N: Gelain 1988), (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998).

Dormilona Gris

(a) (*Muscisaxicola rufivertex rufivertex*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1994).

(b) (*Muscisaxicola rufivertex pallidiceps*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

(c) (*Muscisaxicola rufivertex achalensis*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Salvador y Narosky 1983), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Nores y Fraga en Narosky y Salvador

1998), (N: Salvador, Salvador y Eroles en Narosky y Salvador 1998), (N: Saggese, Blendinger y De Luca en Narosky y Salvador 1998), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2011).

Dormilona Cara Negra

(a) (*Muscisaxicola maclovianus maclovianus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Muscisaxicola maclovianus mentalis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998), (N: Christie et al. 2004), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (A/P: Reynolds 1934).

Dormilona Ceja Blanca

(*Muscisaxicola albilora*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (HF: Navas y Bó 1994)- **Neuquén:** (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Christie en Narosky y Salvador 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: Gelain 2013).

Dormilona Canela

(*Muscisaxicola capistratus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Vuilleumier 1994), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (N: Maugeri 2006b)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Anónimo 1933), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

Dormilona Frente Negra

(*Muscisaxicola frontalis*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (A/P: Bodrati y Ferrari 2014)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001), (A/P: Bodrati y Ferrari 2014)- **Mendoza:** (HF: Navas y Bó 1994), (N: Ferrer et al. 2014).

Gaucho Serrano

(a) (*Agriornis montanus montanus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1976a), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Salvador 2015a)- **Tucumán:** (N: Handford 1983), (S/D: Caplonch 2007).

(b) (*Agriornis montanus maritimus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Narosky et al. 1984), (N: Narosky et al. 1990)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Lambertucci et al. 2009).

(c) (*Agriornis montanus fumosus*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999)- **San Luis:** (N: Nellar Romanella 1993).

Gaucho Andino

(*Agriornis albicauda andicola*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Tucumán:** (N: Ortiz en Caplonch 2007), (J: Caplonch et al. 2011).

Gaucho Grande

(*Agriornis lividus fortis*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (J: Contreras 1977)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (J: L. Pagano obs. pers.).

Gaucho Gris

(a) (*Agriornis micropterus micropterus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (A/P: Blendinger en Caplonch 2007), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1994)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky e Yzurieta en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **Neuquén:** (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998), (N: Casas 1992b), (N: Casas en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: W. Dernelt en WFVZ)- **Chubut:** (N: Straneck en De la Peña 1989), (N: Harris 2008), (N: M. Moroni in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Agriornis micropterus andecola*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Gaucho Chico

(*Agriornis murinus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Catamarca:** (N: Nores y Salvador 1990)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977)- **Río Negro:** (N: Gelain y Sympson 2007)- **Chubut:** (N: Andors y Vuilleumier 1996).

Diucón

(*Xolmis pyrope pyrope*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: Veiga en De la Peña 2016e)- **Río Negro:** (N: Wetmore 1926a), (N: Pemberton en Narosky y Salvador 1998), (N: Casas en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Casas en De la Peña 2005b, 2013), (N: C. Nelson en WFVZ)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Rumboll y Jehl en Narosky y Salvador 1998).

Monjita Gris

(*Xolmis cinereus pepoaza*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1985, 1987, 2005b, 2013), (N: Zelich en Narosky y Salvador 1998).

Monjita Coronada

(*Xolmis coronatus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Luis:** (N: Masramón 1969)- **Mendoza:** (N: Salvador, Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Mezquida 2000, 2002) (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador, Narosky y Saibene en Narosky y Salvador 1998)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.).

Monjita Común

(*Xolmis irupero irupero*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy en Friedmann 1963), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: White 1982)- **Santiago del Estero** (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Friedmann 1929), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1973, 1977), (N: Contreras 1988), (N: Salvador, Narosky y Fraga Narosky y Salvador 1998),

(S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1985, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba**: (N: Castellanos 1933), (N: Martella et al. 1985), (N: Nores y Nores 1994), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador, Narosky y Fraga Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2012e, 2013b), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Barrows 1883), (N: Smyth 1928), (N: Zelich en Narosky y Salvador 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Luis**: (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Ramonella 1993)- **Buenos Aires**: (N: Narosky et al. 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Narosky, Di Giacomo y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, López Lanús y Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Mérida y Bodrati 2006)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a),(S/D: Maceda et al. 2001), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011).

Monjita Salinera

(*Xolmis salinarum*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **San Juan**: (J: L. Pagano obs. pers.)- **Córdoba**: (N: Cobos y Miatello 2001), (A/P: Salvador et al. en prep.).

Monjita Castaña

(*Xolmis rubetra*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires**: (J: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén**: (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Río Negro**: (N: Vuilleumier 1994), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ).

Monjita Dominica

(*Xolmis dominicanus*)

Distribución temporal: (Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001), (N: Fraga 2003)- **Entre Ríos**: (N: Fraga 2003), (N: Lieberman en Fraga 2003)- **Buenos Aires**: (J: L. Pagano obs. pers.).

Birro Grande

(*Myiotheretes striaticollis pallidus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (N: De la Peña 2001b, 2005b)- **Tucumán**: (S/D: Caplonch et al. 2011).

Birro Gris

(*Polioxolmis rufipennis bolivianus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013).

Monjita Chocolate

(*Neoxolmis rufiventris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (J: Contreras 1977)- **Río Negro:** (N: Penberton en Narosky y Salvador 1998), (N: Vuilleumier 1994)- **Santa Cruz:** (N: Maclean 1969a), (N: De la Peña 1985, 1987, 2005b, 2013), (N: Andors y Vuilleumier 1998), (N: Fahy en Andors y Vuilleumier 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Coconier 2006), (J: L. Pagano obs. pers.).

Yetapá Grande

(*Gubernetes yetapa*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: Corrientes: (N: Uranga en De la Peña 2016e).

Viudita Coluda

(*Muscipipra vetula*)

Nota: S/I

Viudita Blanca

(*Fluvicola albiventer*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Miller 1917), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Narosky y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1998 in litt.)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (N: Darrieu y Camperi 1992), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Friedmann 1927), (N: De la Peña 1983b, 1986b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Torres y Michelutti 2001, 2006), (N: Salvador 2013b), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1932c, 1938), (N: Harper 1935), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Babarskas y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011).

Viudita Enmascarada

(*Fluvicola nengeta nengeta*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Moller Jensen 2015).

Lavandera

(*Arundinicola leucocephala*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov. Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: López Lanús 1997)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Juszczuk 2014)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: La Grotteria 2012), (N: Agulián 2012)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1986b, 1987, 2005b, 2013).

Yetapá de Collar

(*Alectrurus risora*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Fraga y Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo et al. 2011a, 2011b)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1992), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N y A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1938)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1893)

Pitajo Canela

(*Ochthoeca oenanthoides oenanthoides*)

Distribución temporal: (Feb., Nov.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Ordano 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **La Rioja:** (A/P: Nores y Salvador en Narosky y Salvador 1998).

Pitajo Gris

(*Ochthoeca leucophrys tucumana*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2015a).

Peutrén

(*Colorhamphus parvirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Saibene 1988), (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Ramilo en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Spinuza et al. 2009)- **Río Negro:** (N: Zotta 1939), (N: Casas et al. 1990), (N: Casas en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chubut:** (N: Gutiérrez en Casas et al. 1990), (N: Rasmussen et al. 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Gutiérrez en De la Peña 2005b, 2013).

Yetapá Negro

(*Colonia colonus colonus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Formosa:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N y A/P: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús y Rodríguez Goñi 2004), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Picabuey

(*Machetornis rixosa rixosa*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino en Narosky y Salvador 1998)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo et al. 2010)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: A. Bodrati 1997-1998 in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918b), (N: Friedmann 1927, 1929), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (PP: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1924), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000), (N: De la Peña et al. 2003), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **San Juan:** (N: Haene et al. 1995), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Salvador 1983, 2012e, 2013b), (N: Nores y Nores 1994), (N: Galassi en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Turienzo y Di Iorio 2014), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (S/D: Chebez et al. 1998)- **San Luis:** (N: Masramón 1969), (N: Turienzo y Di Iorio 2010)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Withington 1888), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Dabbene 1924), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Turienzo y Di Iorio 2014)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Tuquito Chico

(*Legatus leucophaius leucophaius*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fraga in litt.)- **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (N:

Fraga, Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2016)- **Tucumán:** (N: Girard 1932).

Benteveo Mediano

(*Myiozetetes similis pallidiventris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Benteveo Común

(a) (*Pitangus sulphuratus argentinus*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Jul., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Narosky, Salvador y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Caplonch 1997), (N: Alabarce y Antelo 1998), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000, 2002), (N: de la Peña et al. 2003), (N: Leiva et al. 2004) (N: Antoniazzi et al. 2010), (S/D: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Gelain 2012d)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1933), (N: Salvador 1983, 2013b), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Galassi en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a, 2013c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (N: De la Peña, 1987, 2005b, 2013), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **San Luis:** (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Reed 1913), (N: Contreras 1980c)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Dunford 1876a), (N: Gibson 1880), (N: Withington 1888), (N: Holland 1892), (N: Hussey 1916), (N: Smyth 1928), (N: Daguerre 1932), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Klimaitis en Narosky y Salvador 1998), (N: Roda y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Babarskas y Veiga en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo y Aguilar en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en

Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y Haene en Babarskas et al. 2003), (N: Llambías y Ferretti 2003), (N: Couri et al. 2005), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: Godoy et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut**: (N: Leveque 1979), (N: Harris 2008).

(b) (*Pitangus sulphuratus maximiliani*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: de la Peña 2005b, 2013), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Cockle et al. 2016), (N: S. Salvador obs. pers.).

Benteveo Chico

(*Conopias trivirgatus trivirgatus*)

Distribución temporal: (Set.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Benteveo de Barbijo

(*Myiodynastes chrysocephalus chrysocephalus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013).

Benteveo Rayado

(*Myiodynastes maculatus solitarius*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Contino 1980), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Ruggera et al. 2016), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Salta**: (N: Contino 1980), (N: Rumboll en Narosky y Salvador 1998), (N: Rodríguez 2012), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo 2005), (PP: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2015), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco**: (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero**: (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Navarro 2015)- **Tucumán**: (N: Friedmann 1927), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et

al. 2014)- **Corrientes**: (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba**: (N: Salvador 2012e, 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis**: (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires**: (N: Pereyra 1934c, 1938), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Pereira en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a).

Pitanguá

(*Megarynchus pitangua pitangua*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2016)- **Chaco**: (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013).

Tuquito Rayado

(*Empidononomus varius varius*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy**: (N: Contino 1980)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005), (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Misiones**: (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco**: (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca**: (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **Tucumán**: (N: Lillo en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes**: (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Uranga en De la Peña 2016e), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos**: (N: Hartert y Venturi 1909).

Tuquito Gris

(*Empidononomus aurantioatrocristatus aurantioatrocristatus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Contino 1980)- **Salta**: (N: Contino 1980), (N: Contino en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S/C, WFVZ)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998)- **Chaco**: (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000)- **Catamarca**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero**: (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1987), (Hethke en Narosky y Salvador 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán**: (N: Dinelli 1918b), (N: Friedmann 1927), (N: Girard en

Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WFVZ)- **Corrientes**: (N: Wilson 1979), (HF: Darrieu y Camperi 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan**: (N: Haene et al. 1995)- **Córdoba**: (N: Castellanos 1933), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Pena 2005, 2013), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Barrows 1883)- **San Luis**: (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires**: (N: Belenger y Di Martino 1993), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006, J: A. Bodrati in litt. 2015)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Macea et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro**: (N: Pérez y Petracci 1997), (S/D: Llanos et al. 2011).

Suirirí Real

(*Tyrannus melancholicus melancholicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Contino 1980), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta**: (N: Contino 1980), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa**: (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco**: (N: Salvador, Narosky y Fraga en Narosky y Salvador 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero**: (N: Smyth 1928)- **Tucumán**: (N: Dinelli 1918b), (N: Friedmann 1927, 1929), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes**: (N: Wilson 1977), (N: Contreras 1988), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan**: (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba**: (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928)- **San Luis**: (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Masramón en Narosky y Salvador 1998)- **Buenos Aires**: (N: Holland 1890, 1892), (N: Zapata y Cabrera 1969), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Runnacles en Narosky y Salvador 1998), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (N: Bettinelli y Bosso en Narosky y Salvador 1998), (N: López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador

1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati et al. 2006), (N: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Tijereta

(*Tyrannus savana savana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Saibene en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Contreras 1988), (N: Partridge en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1933), (N: Salvador 1983, 2013b), (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Galassi en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998)- **San Luis:** (N: Partridge 1953), (N: Masramón 1969), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Masramón en Narosky y Salvador 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1870c), (N: Gibson 1880, 1918), (N: Withington 1888), (N: Holland 1892), (N: Smyth 1928), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Mason 1985), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Earnshaw en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Babarskas en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo y Aguilar en Narosky y Salvador 1998), (N: Di Giacomo y Lieberman en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky, Babarskas y López Lanús en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tájer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Jahn et al. 2014), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a) (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (N: Salvador y Narosky en

Narosky y Salvador 1998), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c).

Suirirí Silbón

(*Sirystes sibilator sibilator*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Burlisto Castaño

(*Casiornis rufus*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Burlisto Corona Negra

(*Myiarchus tuberculifer atriceps*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Cornell 2003)- **Salta:** (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (S/D: Moschione et al. 2013).

Burlisto Pico Canela

(a) (*Myiarchus swainsoni swainsoni*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2015).

(b) (*Myiarchus swainsoni ferocior*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1997 in litt.)- **Tucumán:** (N: Lanyon 1978), (N: Caplonch 1997)- **Corrientes:** (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Narosky en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta en Narosky y Salvador 1998), (N: Narosky en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Salvador en Narosky y Salvador 1998), (N: Salvador y Eroles en Narosky y Salvador 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2012e, 2013b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Babarskas y López Lanús 1993), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001).

Burlisto de Pico Negro

(*Myiarchus ferox australis*)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Escobar 2006)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (A/P: Bodrati 2001).

Burlisto Cola Castaña

(*Myiarchus tyrannulus tyrannulus*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Di Giacomo en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (N: Lillo en Narosky y Salvador 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a, 2013c), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Lanyon 1978), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Catamarca:** (N: A. Bodrati in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.), (J: J. Heredia in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883)- **Mendoza:** (N: Blendinger y Álvarez 1996), (N: Mezquida 2000, 2002), (N: Mezquida y Marone 2001).

Picochato Cabezón

(*Ramphotrigon megacephalum megacephalum*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Escobar 2006), (N y A/P: Bodrati et al. 2010).

Burlisto Cabeza Gris

(*Attila phoenicurus*)

Nota: S/I

Familia **Oxyruncidae**

Picoagudo

(*Oxyruncus cristatus*)

Nota: S/I

Familia **Cotingidae**

Cortarramas

(a) (*Phytotoma rutila rutila*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Nores, Yzurieta y

Salvador en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Girard en Serié 1923a), (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WfvZ), (N: P. Girard en WfvZ), (N: C. Olrog en WfvZ), (N: L. Dinelli en MVZ)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Salvador y Bodrati 2013a), (J: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky y Hethke en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Salvador y Fraga en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2013d), (N: Klavins en Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Smyth 1928), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985)- **Mendoza:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **San Luis:** (N: Partridge 1953), (N: Masramón 1984), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Earnshaw en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Narosky y Saibene en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Rumboll y J. Jehl en WfvZ), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Maceda et al. 2001) (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (N: Hudson 1872a), (N: Salvador, Narosky y Saibene en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Llanos et al. 2011), (S. Salvador y L. Salvador en prep.).

(b) (*Phytotoma rutila angustirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Budin en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (N: Hoy 1976a), (N: Hoy en Friedmann et al. 1977), (S/D: Moschione et al. 2013).

Rara

(*Phytotoma rara*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (A/P: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky, Fraga y Chebez en Fraga y Narosky 1985)- **Neuquén:** (N: Christie et al. 2004), (A/P: La Grotteria 2014)- **Río Negro:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: L. Buzzonetti en WfvZ), (N: C. Nelson en WfvZ)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005).

Yacutoro

(*Pyroderus scutatus scutatus*)

Distribución temporal: (Jun.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati y Cockle 2007a), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Pájaro Campana

(*Procnias nudicollis*)

Nota: S/I

Familia Pipridae

Bailarín Yungueño

(*Chiroxiphia boliviana*)

Nota: S/I

Bailarín Azul

(*Chiroxiphia caudata*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: De Lucca 1996a), (N: Bodrati et al. 2010), (A/P: A. Bodrati in litt.).

Bailarín Blanco

(*Manacus manacus gutturosus*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino y Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998).

Bailarín Naranja

(*Pipra fasciicauda scarlatina*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010).

Familia Tityridae

Tueré Chico

(*Tityra inquisitor inquisitor*)

Distribución temporal: (Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: S. Salvador obs. pers.)-

Misiones: (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Narosky y Rumboll en Fraga y Narosky 1985), (N: Castelino y Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: López Lanús y Rodríguez Goñi 2004), (S/D: Escobar 2006), (N: Cockle et al. 2008, 2011, 2012, 2016), (N: Bodrati et al. 2010), (A/P: Lorenzo 2014), (N: M. Rumboll in litt.)- **Chaco:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Bodrati y Pietrek 2000).

Tueré Grande

(*Tityra cayana brasiliensis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Narosky y Rumboll en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012, 2016)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: De la Peña 2013).

Tueré Enmascarado

(*Tityra semifasciata semifasciata*)

Nota: S/I

Bailarín Oliváceo

(*Schiffornis virescens*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Tijerilla

(*Xenopsaris albinucha albinucha*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Girard en Friedmann 1929), (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Giai en Pereyra 1942), (N: De la Peña 1979, 1987, 2004b, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002)- **Córdoba:** (N: Molli 1986), (A/P: Salvador et al. en prep.), (N: J. Heredia in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Di Giacomo y Lieberman 2000), (N: Haene en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (A/P: Bodrati et al. 2006 y Mérida y Bodrati 2006).

Anambé Verdoso

(*Pachyramphus viridis viridis*)

Distribución temporal: (Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985)- **Salta:** (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Nores en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Entre Ríos:** (N: Salvador y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Brunetti et al. 1991)- **Buenos Aires:** (A/P: Grilli y Areta 2003).

Anambé Castaño

(*Pachyramphus castaneus castaneus*)

Distribución temporal: (Feb., Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Nores en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Olejnik 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: S. Salvador obs. pers.).

Anambé Común

(*Pachyramphus polychopterus spixii*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Tucumán:** (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: J. Heredia in litt.)- **Entre Ríos:** (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1927b, 1938), (N: Earnshaw en Fraga y Narosky 1985), (N: Fraga en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006=N y A/P A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (J: L. Pagano obs. pers.).

Anambé Grande

(a) (*Pachyramphus validus validus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Narosky y Martelli 1995), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N y A/P: A. Bodrati 2009, 2010 in litt.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: La Grotteria 2015)- **Corrientes:** (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

(b) (*Pachyramphus validus audax*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Jujuy: (N: Eguia 2016)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Nores e Yzurieta 1982), (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Fraga y Narosky 1985)- **La Rioja:** (N: Nores e Yzurieta 1982)- **Córdoba:** (N: Montaldo y López en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador et al. en prep.).

Incertaer Sedis

Tesorito

(*Phibalura flavirostris flavirostris*)

Nota: S/I

Bailarín Verde

(*Piprites chloris chloris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Bailarín Castaño

(*Piprites pileata*)

Distribución temporal: (Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Cockle et al. 2008).

Familia Virionidae

Juan Chiviro

(a) (*Cyclarhis gujanensis viridis*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Chatellenaz 2005), (N. A. Bodrati in litt.)- **Santiago del Estero:** (N: Narosky en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Nores e Yzurieta in litt.)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: Pautasso 2000), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Narosky 1975), (N: Salvador y Eroles obs. pers.), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.).

(b) (*Cyclarhis gujanensis ochrocephala*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001)- **Buenos Aires:** (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012).

Chiví Coronado

(*Hylophilus poicilotis poicilotis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010).

Chiví Común

(a) (*Vireo olivaceus chivi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: F. Contino en IML)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Bodrati 2003), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: Caplonch 1997)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1975, 1983b, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1933b, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (Bodrati en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: T. Narosky in litt.).

(b) (*Vireo olivaceus diversus*)

Distribución territorial: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2016), (N: Saibene in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Familia Corvidae

Urraca Morada

(*Cyanocorax cyanomelas*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Misiones:** (N: Hartert y Venturi 1909)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: J. Temporetti en M. Rumboll in litt.)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988).

Urraca Azul

(*Cyanocorax caeruleus*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: A. Bodrati in litt., N: V. Matuchaka com. pers. A A. Bodrati)- **Corrientes:** (A/P: Valles 2012).

Urraca Común

(a) (*Cyanocorax chrysops chrysops*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky y Rodríguez Moulín en Fraga y Narosky 1985), (N: Fraga, Salvador y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Cockle et al. 2016)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 1998 in litt.), (A/P: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santa Fe:** (N: Hartert y

Venturi 1909), (N: Pautasso 2000), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Entre Ríos**: (N: Baliño 1984), (N: Zelich en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Chebez et al. 1998).

(b) (*Cyanocorax chrysops tucumana*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta**: (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán**: (N: Olrog en Fraga y Narosky 1985), (N: Caplonch 1997).

Familia Hirundinidae

Golondrina Barranquera

(a) (*Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Lönnberg 1903)- **Salta**: (N: De la Peña 2005b), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones**: (N: Saibene et al. 1996), (N: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Catamarca**: (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán**: (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1924), (S/D: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Corrientes**: (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985).

(b) (*Pygochelidon cyanoleuca patagonica*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: Yzurieta, Rodríguez Mata y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **San Juan**: (S/D: Haene et al. 2001), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba**: (N: Castellanos 1934), (N: Salvador en Fraga y Narosky 1985), (N: Hethke y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **San Luis**: (N: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Fraga y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: A. Johnson y J. Goodall en WFVZ)- **Buenos Aires**: (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1927c, 1938), (N: Smyth 1928), (N: Narosky 1975), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (HF: Camperi 1992), (N: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014)- **La Pampa**: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Neuquén**: (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro**: (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Gelain 2012b), (N: COA Roca Ñacurutú en eBird 2015c), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: R. Crossin en WFVZ)- **Santa Cruz**: (S/D: Albrieu et al. 2004)- **Tierra del Fuego**: (S/D: Clark 1984).

Golondrina de Collar

(*Pygochelidon melanoleuca*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Herrera y Rodríguez Moulín en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998).

Golondrina Cabeza Rojiza

(*Alopochelidon fucata*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Girard en Fraga y Narosky 1985)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (N: Darrieu y Camperi 1993)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Babarskas y López Lanús 1993), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Morici 2012b).

Golondrina Puneña

(*Orochelidon andecola andecola*)

Distribución temporal: (Feb., Ago., Set., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Mazar Barnett et al. 2014)- **Jujuy:** (N: Mazar Barnett et al. 2014).

Golondrina Ribereña

(*Stelgidopteryx ruficollis ruficollis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Cockle et al. 2016), (N: Uranga en De la Peña 2016e)- **Corrientes:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.).

Golondrina Parda

(*Progne tapera fusca*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Partridge en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N y A/P: A. Boloqui en eBird 2015a), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Friedmann 1927), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005, 2013), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Córdoba:** (N: Salvador en Fraga y Narosky 1985),

(N: Salvador 2012e), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1872b), (N: Gibson 1880), (N: Holland 1892), (N: Renard 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1938), (N: Fraga 1979b), (N: Fraga en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (N: Luciano, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Montaldo y Fraga en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas y Veiga en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Zainz Trápaga en De la Peña 2016e).

Golondrina Doméstica

(a) (*Progne chalybea chalybea*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Zelich en Fraga y Narosky 1985), (N: Zelich, Yzurieta y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Progne chalybea macrorhamphus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Girard en Fraga y Narosky 1985), (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: Girard en Fraga y Narosky 1985)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Wilson 1924, 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Michelutti en Salvador et al. en prep.), (N: Heredia en Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1872b), (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Hussey 1916), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1938), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (N: Carpintero y Aramburú 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Aramburú y Calvo 2009), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Miquel et al. 2015), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Golondrina Negra

(*Progne elegans*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1969), (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Dinelli 1918a), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Partridge 1953), (N: Salvador en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1872b), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (N: Oyamburu y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Carpintero y Aramburú 2007), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda et al. 2001)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: Durnford 1878b), (N: De la Peña 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Santa Cruz:** (N: De Lucca y Saggese 1992).

Golondrina de Alas Blancas

(*Tachycineta albiventer*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador 2014), (N: Uranga en De la Peña 2016e).

Golondrina Ceja Blanca

(*Tachycineta leucorrhoa*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Abr., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Fernández Campos 2015)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Wilson en Fraga y Narosky 1985), (N: Darrieu y Camperi 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Lorenzón y Quiroga 2012)- **Córdoba:** (N: Nores, Yzurieta y Salvador en Fraga y Narosky 1985), (N: Salvador en Fraga y Narosky 1985), (N: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Zelich en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky, Klimaitis y Zelich en Fraga y Narosky 1985)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1871b), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Venturi en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky e Yzurieta en Fraga y Narosky 1985), (N: Fraga en Fraga y Narosky 1985), (N: Narosky y Saibene en Fraga y Narosky 1985), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di

Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas et al. 2003), (N: Bilit y Massoni 2004), (N: Massoni et al. 2006), (S/D: Bodrati et al. 2006), (N: Massoni et al. 2007), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Barrionuevo et al. 2010, 2014), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y J: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001)- **Río Negro**: (N: Tocce 2014).

Golondrina Patagónica

(*Tachycineta meyenii*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires**: (N: Narosky 1983), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **Neuquén**: (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro**: (N: Peters 1923), (N: Narosky en Fraga y Narosky 1985), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: C. Nelson en WFVZ), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego**: (N: Crawshay 1907), (N: Reynolds 1934), (N: Keith 1970), (N: Liljeström et al. 2009, 2012), (N: Aramburú et al. 2012), (N: Ospina et al. 2015), (N: M. Rumboll in litt.)- **Islas Malvinas**: (N: Otley et al. 2008).

Golondrina Rabadilla Canela

(*Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (N: Salvador et al. en prensa)- **Buenos Aires**: (N: Petracci y Delhey 2004).

Golondrina Tijerita

(*Hirundo rustica erythrogaster*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (N: Gandoy en Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires**: (N: Martínez 1983, 2001), (N: Salvador, Saibene y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: Fiameni 2001), (N: Petracci y Delhey 2004), (N: Carpintero y Aramburú 2007), (N: Idoeta et. al. 2010), (N: Larracoechea et al. 2012), (N: Sánchez y Solis Fieg 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Grande et al. 2015), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: C. Chiale obs. pers.)- **La Pampa**: (N: Morici 2012a), (N: Grande et al. 2015), (N: S. Salvador obs. pers.).

Familia Troglodytidae

Ratona Común

(a) (*Troglodytes aedon musculus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Troglodytes aedon rex*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (PP: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1922)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: Salvador 1983, 2012e), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a, 2013c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Schaaf et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Di Iorio et al. 2013).

(c) (*Troglodytes aedon bonariae*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (N: De la Peña 2005b), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Gibson 1880), (N: White 1882), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Hussey 1916), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas et al. 2003), (N: Couri et al. 2005), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tuero et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Llambías y Fernández 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: Llambías 2012), (N: Fiorini et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Di Iorio en Di Iorio et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

(c) (*Troglodytes aedon chilensis*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (S/D: Mezquida 2000), (S/D: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (N: J. Retolaza en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (S/D: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (S/D: Chebez et al. 1998),

(S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (N: M. Rumboll in litt.)-

Tierra del Fuego: (N: Reynolds 1935), (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

Ratona Malvinera

(*Troglodytes cobbi*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Islas Malvinas: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Ratona de Cejas Blancas

(*Troglodytes solstitialis auricularis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Salta: (N: Ferreira et al. 2005), (N: Auer et al. 2007), (Moschione et al. 2013)-

Tucumán: (N: Girard en Dinelli 1918a).

Ratona Aperdizada

(a) (*Cistothorus platensis platensis*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: San Juan: (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Mendoza:** (N: Llambías et al. 2015a, 2015b)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: López Lanús y Roda en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (A/P: Maugeri 2003), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Cistothorus platensis tucumanus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Jujuy: (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Córdoba:** (N: Salvador y Narosky 1984), (N: Nores e Yzurieta en Salvador y Narosky 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999).

(c) (*Cistothorus platensis hornensis*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Neuquén: (S/D: Contreras 1977), (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Christie et al. 2004), (N: Gelain y Diez Peña 2005), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Castellanos 1937), (N: Schalow en Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee et al. 1994).

(d) (*Cistothorus platensis falklandicus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Islas Malvinas: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Ratona Grande

(*Campylorhynchus turdinus unicolor*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: La Grotteria 2013)- **Misiones:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)

Familia Polioptilidae

Tacuarita Blanca

(*Polioptila lactea*)

Distribución temporal: (Ago., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Willis y Bosso 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt.).

Tacuarita Azul

(*Polioptila dumicola dumicola*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1922), (N: Friedmann 1927), (Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Contreras (1988), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Salvador 1983), (S/D: Salvador y Salvador 1984), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Fraga y Salvador 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Narosky en Salvador y Bodrati 2014b), (N: T. Narosky in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Pereyra 1938), (N: Zuberbühler 1971), (N: Fraga 1979b, 2002), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (N: Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Fraga y Salvador 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Familia Donaciobiidae

Angú

(*Donacobius atricapilla atricapillus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N y A/P: A.

Bodrati 1999 in litt.)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: Uranga en De la Peña 2016e), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Familia Cinclidae

Mirlo de Agua

(*Cinclus schulzi*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Sardina Aragón et al. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (N: Mosqueira en Mazar Barnett et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Sardina Aragón et al. 2015)- **Catamarca:** (N: Nores, Yzurieta, Salvador y Narosky en Fraga y Narosky 1985), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador et al. 1986), (N: Tyler 1994), (N: Tyler y Tyler 1996), (N: Sardina Aragón et al. 2015).

Familia Turdidae

Zorzalito Overo

(*Catharus dryas blakei*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Zorzal Patagonico

(a) (*Turdus falcklandii falcklandii*)

Distribución temporal: (Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008), (N: J. Halliday en MVZ).

(b) (*Turdus falcklandii magellanicus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Narosky 1983), (S/D: Doiny Cabré 2006), (N: Ianiro 2015), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (N: De la Peña 1987, 2005b), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Christie et al. 2004), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.), (N: Morgenstern en M. Rumboll in litt.), (N: D. Yzurieta in litt.)- **Río Negro:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1937a), (A/P: Bettinelli y Chebez 1986), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Ojeda y Trejo 2002), (N: Christie et al. 2004), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Casas en De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: C. Nelson en WFVZ), (N: Retolaza en Rumboll in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (J: De

Lucca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: M. Moroni in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Tierra del Fuego:** (N: Olrog 1950), (J: Humphrey et al. 1970), (Parmelee et al. 1994), (N: L. Decius en WFVZ).

Zorzal Sabiá

(*Turdus leucomelas leucomelas*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Narosky y Lozzia 1988), (Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (Chebez et al. 1998), (PP: Fraga 2002), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2011, 2013), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Guaraz 2014), (N: Cockle et al. 2016), (N: M. Rumboll in litt.), (T. Narosky in litt.), (N: C. Saibene in litt.), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.), (N y J: L. Pagano obs. pers.)- **Corrientes:** (N: Short 1971), (S/D: Fraga 2001), (PP: Fraga 2002), (N: R. Crossin en WFVZ).

Zorzal Colorado

(*Turdus rufiventris rufiventris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Contino y F. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Contino 1980), (N: Auer et al. 2007), (N: Lomáscolo 2010), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2011), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: Cockle et al. 2015b, 2016)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Caplonch 1997), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Lomáscolo 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: Salvador y Narosky obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Smyth (1928), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1918), (N: Wetmore 1926), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Lichtenstein 1998, 2001a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Sackmann y Reboreda 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, S/D: Mérida y Bodrati 2006=N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M.

Earnshow in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (N: C. Saibene in litt.), (N: D. Luciano in litt.), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.).

Zorzal Chalchalero

(*Turdus amaurochalinus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (A. Contino y F. Contino en WFVZ)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (N: P. Girard en IML)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N: Saibene in litt.)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli (1922), (N: Friedmann 1927, 1929), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Chatellenaz y Ferraro 2000), (S/D: Fraga 2001), (N: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador y T. Narosky inéd.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: T. Narosky in litt.)- **San Luis:** (N: Masramón 1975), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Astié y Reboreda 2005, 2006, 2009a, 2009b), (N: Astié y Luchesi 2012), (N: Astié 2013)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Miquel et al. 2015), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (S. Salvador y P. Eroles obs. pers.).

Zorzal Plomizo

(*Turdus nigriceps*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Auer et al. (2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1918), (N: Smyth 1928), (N: Dinelli en Pereyra 1951), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en IML), (N: P. Girard MVZ), (N: P. Girard en WFVZ)- **La Rioja:** (N: Nores e Yzurieta 1981)- **Córdoba:** (N: Salvador y Fraga en Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.).

Zorzal Plomizo

(*Turdus subalaris*)

Distribución temporal: (Dic.).

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.).

Zorzal Chiguancó

(*Turdus chiguancó anthracinus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: S. Salvador, L. Salvador y P. Eroles obs. pers.)-

Salta: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: M. Nores y S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1922), (N: Handford 1983), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: De la Peña 2005b), (S/D: Caplonch 2007), (S/D: Caplonch et al. 2011), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **La Rioja:** (N: A. Bodrati 2009 in litt.)- **San Juan:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Ortiz et al. 2003) (N: A. Bodrati 1999, 2000 in litt.)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: Salvador y Salvador 1984, 1988, 2012), (N: de la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Leiva et al. 2004), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: Vergara Tabares y Peluc 2013), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: R. Fraga in litt.), (N: Salvador, Narosky y Fraga obs. pers.)- **San Luis:** (N: Partridge 1953), (N: Masramón 1975), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Reed 1919)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Río Negro:** (A/P: Pérez et al. 2006), (S/D: Llanos et al. 2011).

Zorzal Negro

(*Turdus serranus contínoi*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Jujuy:** (J: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Zorzal de Collar Blanco

(*Turdus albicollis paraguayensis*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013), (N: Bodrati et al. 2010).

Familia Mimidae

Tenca

(*Mimus thenca*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Matarasso y Seró López 2008).

Calandria Mora

(*Mimus patagonicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2011)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: S. Salvador y M. Nores obs. pers.)- **San Juan:** (N: Contreras y Roig 1976), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (HF: Navas y Bó 2000), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta 1975), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Mendoza:** (N: Reed 1913), (N: Contreras y Roig 1976), (N: Salvador y Salvador 1984), (HF: Navas y Bó 2000)- **Buenos Aires:** (N: Doering 1881), (N: Renard (1933), (N: Salvador y Salvador 1984), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Río Negro:** (N: Pemberton en Friedmann et al. 1977), (N: Salvador y Salvador 1984), (J: Bettinelli y Chebez 1986), (N: Vuilleumier 1993), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pes.)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Santa Cruz:** (J: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: J. Pemberton en WFVZ).

Calandria Grande

(*Mimus saturninus modulator*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Miller 1917)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010), (Salvador y Bodrati 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Tucumán:** (Dinelli 1918a), (Friedmann 1927), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (N: D. Wilson in litt.)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Wilson 1924, 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2000), (N: De la Peña et al. 2003) (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: Salvador 1983, 1984), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **San Luis:** (S/D: Nellar Ramonella 1993), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1933b, 1938), (N: Zuberbühler 1956), (N: Fraga 1979b, 1985), (N: Mason 1985), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Sackmann y Reboreda 2003), (N: Couri et al. 2005), (N: Fiorini y Reboreda 2006),

(S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: de la Colina et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (N: P. Canevari in litt.), (N: D. Luciano y C. Saibene in litt.)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (PP: M. Bianchini in litt.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Calandria Real

(Mimus triurus)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: J. Heredia in litt.)- **San Luis:** (N: Masramón 1975), (N: Salvador y Salvador 1984)- **Mendoza:** (N: Reed 1913, 1919), (N: Mezquida 2000), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1897), (N: Salvador y Salvador 1984), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: S/C, WFVZ), (N: T. Narosky in litt.), (A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Wetmore 1926), (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: S/C, WFVZ), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Salvador y Salvador 1984), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: Salvador y Eroles obs. pers.).

Calandria Castaña

(Mimus dorsalis)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Dinelli 1918a), (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (PP: Fraga 2005), (N: Lillo IML), (N: T. Narosky in litt.), (N: S. Salvador y L. Narosky obs. pers.), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Familia Sturnidae

Estornino Crestado

(Acridotheres cristatellus cristatellus)

Distribución temporal: (Feb., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Chiurla 1999), (N: Aguerre et al. 2008), (A/P: Carballo 2015), (Pichón en el MLP).

Estornino Pinto

(Sturnus vulgaris vulgaris)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Yngelmo 2015)- **Córdoba:** (N: Klavins y Álvarez 2012)- **Buenos Aires:** (N: Schmidtz y Agulán 1988), (N: Babarskas y Veiga en Di Giacomo et al. 1993), (Rivero et al. 1996), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (Rizzo 2010), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (Ibañez et al. 2011), (S/D: DECB 2011), (Pagano et al. 2012), (Furman y Bastías 2012), (N: Montalti et al. 2013), (Di Iorio en Di Iorio et al. 2013), (N: Danti 2013), (N: Di Sallo y Segura 2014), (N: Carro et al. 2014), (N: Chimento 2015), (N: L. Pagano obs. pers.).

Familia Motacilidae

Cachirla Chica

(*Anthus lutescens lutescens*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (PP: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Gavio 1944), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

Cachirla Uña Corta

(*Anthus furcatus furcatus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Catamarca:** (N: S. Salvador y M: Nores obs. pers.)- **Tucumán:** (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1993)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Luis:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Grant 1911), (N: Gibson 1918), (N: Wetmore 1926), (N: Plótnick 1953), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: T. Narosky in litt.), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a)- **Chubut:** (N: Andors y Vuilleumier 1995).

Cachirla Trinadora

(*Anthus chacoensis*)

Nota: S/I

Cachirla Común

(a) (*Anthus correndera correndera*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Santa Fe: (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: T. Narosky in litt.), (N: M. Rumboll in litt.)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (N: Reed 1913)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1870c, 1873), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas y Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Cozzani y Zalba 2009), (Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (N: Contreras 1977), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: de la Peña 2005b, 2013), (S/D: Pagano y Mérida 2009)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: M. Christie, S. Salvador y T. Narosky obs. pers.).

(b) (*Anthus correndera catamarcae*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador 2015a), (N: L. Dinelli en WFVZ).

(c) (*Anthus correndera chilensis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: Chubut: (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N: L. Decius en WFVZ), (N: M. Moroni in litt.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Humphrey et al. 1970), (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: M. Rumboll in litt.).

(d) (*Anthus correndera grayi*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: Islas Malvinas: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

Cachirla Grande

(*Anthus antarcticus*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: Islas Georgias del Sur: (N: Murphy 1923), (S/D: Price y Croxall 1996), (N: Clarke et al. 2012).

Cachirla Dorada

(*Anthus nattereri*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: Corrientes: (N: Short 1971), (S/D: Fraga 2001), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Cachirla Pálida

(a) (*Anthus hellmayri hellmayri*)

Distribución temporal: (Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador 2015a)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001)- **Córdoba:** (N: Partridge 1953), (S/D: Miatello et al. 1999), (N: De la Peña 2005b, 2013), (J: J. Heredia in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

(b) (*Anthus hellmayri dabbenei*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Christie et al. 2004).

(c) (*Anthus hellmayri brasiliianus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Buenos Aires:** (A/P: Narosky 1983), (S/D: Blanco en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Henschke en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Güller et al. 2004), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Pagano et al. 2012).

Cachirla Andina

(*Anthus bogotensis shiptoni*)

Nota: S/I

Familia Thraupidae

Cardenal Común

(*Paroaria coronata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Banchs y Fraga 1994), (J: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Friedmann 1929), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en FML)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N y A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1981a, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña et al. 2003), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: A. Bodrati in litt. 2000 in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880), (N: Holland 1892), (N: Pereyra 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (N: Moreyra en Babarskas et al. 2003), (N: Zanello y Juber en Babarskas et al. 2003), (A/P: Doiny Cabré 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Segura y Arturi 2009), (N: Segura y Reboreda 2011, 2012a, 2012b), (N: Segura y Berkunsky 2012), (N: Segura et al. 2012), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura

et al. 2014), (N: Segura et al. 2014, 2015), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011).

Cardenilla

(*Paroaria capitata capitata*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Corrientes**: (N: Contreras 1988), (S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Fe**: (N: Friedmann 1927), (N: De la Peña 1981a, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba**: (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928)- **Buenos Aires**: (N: Bodrati et al. 2006 y Mérida y Bodrati 2006 A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011), (S/D: Furman y Bastías 2012).

Frutero Canela

(*Schistochlamys ruficapillus*)

Nota: S/I

Frutero Overo

(*Cissopis leverianus major*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Bodrati et al. 2010).

Frutero Cabeza Negra

(*Nemosia pileata caerulea*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes**: (HF: Darrieu y Camperi 1994), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: C. Saibene in litt.)

Tangará Alisero

(*Thlypopsis ruficeps*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013).

Tangará gris

(*Thlypopsis sordida sordida*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (N: Girard en Dinelli 1918a)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001), (S/D:

Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe**: (HF: Hartert y Venturi 1909).

Pioró

(*Pyrrhocoma ruficeps*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones**: (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010 e in litt.).

Frutero Corona Amarilla

(*Trichothraupis melanops*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010 e in litt.), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012).

Frutero Coronado

(*Tachyphonus coronatus*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones**: (N: Bodrati et al. 2010), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (J: L. Pagano obs. pers.), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Frutero Negro

(*Tachyphonus rufus*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Chaco**: (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005) (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Buenos Aires**: (N: Carman in litt.).

Pepitero Colorado

(*Dubusia “Saltator” rufiventris*)

Distribución temporal: (Mar.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Rodríguez 2014).

Frutero Azul

(*Stephanophorus diadematus*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones**: (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Entre Ríos**: (N: Uranga en De la Peña 2016f)- **Buenos Aires**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Babarskas y López Lanús 1993), (N: Babarskas y López Lanús Babarskas et al. 2003), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Pagano et al. 2012).

Saíra de Antifaz

(a) (*Pipraeidea melanonota melanonota*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Pipraeidea melanonota venezuelensis*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Caplonch 1997).

Celestino Común

(a) (*Thraupis sayaca sayaca*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: C. Saibene in litt.), (N: Salvador, Narosky y Fraga obs. pes.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: Luciano in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Entre Ríos:** (Leiva et al. 2004)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938), (S/D: Chebez et al. 1998), (Bodrati et al. 2006 y Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: M. Christie in litt.).

(b) (*Thraupis sayaca obscura*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: F. Contino in litt.)- **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: M. Nores, D. Yzurieta y S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Girard en Friedmann 1929), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **La Rioja:** (A/P: A. Bodrati in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.), (N: A. Bodrati y C. Ferrari 2014 in litt.) (N: S. Salvador obs. pers.), (J: J. Heredia in litt.).

Naranjero

(a) (*Thraupis bonariensis bonariensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (N: Contreras 1988)- **Entre Ríos:** (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.).

(b) (*Thraupis bonariensis schulzei*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (N: Miller 1917), (N: Smyth 1928), (N: Höy y Ottow 1964), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Uranga 2016)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Santiago del Estero:** (N: Smyth 1928), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (S/D: Caplonch 2007), (J: Caplonch et al. 2011, (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli WVFZ), (N: C. Olrog en WVFZ), (N: S/C, WVFZ)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **La Rioja:** (N: S. Salvador obs. pes.)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador obs. pes.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: A. Azategui in litt.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: T. Narosky, R. Fraga y J. C. Chebez in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1920), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (N: Maceda et al. 2001)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Celestino Oliváceo

(*Thraupis palmarum palmarum*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (PP: Chebez 2009).

Saíra Castaña

(*Tangara preciosa*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (N y A/P: Bodrati et al. 2010).

Saíra Pecho Negro

(*Tangara cayana chloroptera*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1994).

Saíra Arcoiris

(*Tangara seledon*)

Distribución temporal: (Set., Oct.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: M. Rumboll in litt.), (N: C. Saibene in litt.).

Tersina

(*Tersina viridis viridis*)

Distribución temporal: (Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Saibene in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.).

Saí Azul

(*Dacnis cayana paraguayensis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010).

Saíra Dorada

(a) (*Hemithraupis guira boliviiana*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Hemithraupis guira fosteri*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1994).

Saí Común

(*Conirostrum speciosum speciosum*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (J: Salvador y Bodrati 2013c)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1993), (S/D: Fraga 2001).

Saí Grande

(*Oreomanes fraseri*)

Nota: S/I

Payador Canela

(*Diglossa sittoides*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (A/P: Salvador en prensa).

Diadema

(*Catamblyrhynchus diadema citrinifrons*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Comesebo Cabeza Negra

(*Phrygilus atriceps*)

Distribución temporal: (Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Lönnberg 1903), (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: Salvador 2015a), (J: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Comesebo Andino

(a) (*Phrygilus gayi gayi*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (HF: Navas y Bó 1991b), (S/D: Ferrer et al. 2011).

(b) (*Phrygilus gayi caniceps*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1991b), (S/D: Haene et al. 2001), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (A/P: Bettinelli y Chebez 1986), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Narosky 1987), (N: Uranga en De la Peña 2016f), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Radboone 1935), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego:** (HF: Olrog 1948), (N: De la Peña 2005b, 2013).

Comesebo Patagónico

(*Phrygilus patagonicus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Ojeda y Trejo 2002), (A/P: Christie et al. 2004), (A/P: S.

Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador obs. pers.)-

Santa Cruz: (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Chebez et al. 1988),

(S/D: Imberti 2005), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Yal Negro

(*Phrygilus fruticeti fruticeti*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Budin en Dinelli 1918a), (N: Budin en Pereyra 1942), (N: De la Peña 1983e, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Juan:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Haene et al. 2001)- **Mendoza:** (N: Reed 1919), (N: De la Peña 2005b),

(S/D: Ferrer et al. 2011)- **Buenos Aires:** (N: Narosky 1983), (S/D: Fernández D'Olivera en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Ferguson Lee en Narosky y Di Giacomo 1993)-

Neuquén: (S/D: Contreras 1977), (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton WFVZ), (N: C. Mercer en

WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Chubut**: (N: Durnford 1878b), (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Santa Cruz**: (J: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998).

Yal Plomizo

(a) (*Phrygilus unicolor unicolor*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Neuquén**: (A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro**: (A/P: Christie et al. 2004), (N: J. Pemberton en WFVZ).

(b) (*Phrygilus unicolor tucumanus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Salvador 2015a)- **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1924), (S/D: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011).

(c) (*Phrygilus unicolor cyaneus*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (N: Nores e Yzurieta 1983), (N: Salvador y Narosky 1984), (Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Bodrati 2011)- **San Luis**: (S/D: Nellar Romanella 1993).

Comesebo Puneño

(*Phrygilus dorsalis*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (S/D: Caplonch 2007).

Yal Chico

(a) (*Phrygilus plebejus plebejus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (N: Salvador 2015a).

(b) (*Phrygilus plebejus naroskyi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (N: De la Peña 1983e, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Bodrati 2011).

Yal Carbonero

(*Phrygilus carbonarius*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba**: (A/P: Salvador et al. en prep.)- **Mendoza**: (S/D: Milesi et al. 2002)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (N: La Grotteria 2010)- **Río**

Negro: (N: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut:** (N: De la Peña 1996, 2005b, 2013).

Comesebo Platero

(*Phrygilus alaudinus venturii*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007), (N: Caplonch et al. 2011)- **Córdoba:** (N y A/P: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Yal Grande

(*Idiopsar brachyurus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Diuca Ala Blanca

(*Diuca speculifera*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Höy 1976a).

Diuca Común

(a) (*Diuca diuca diuca*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.), (PP: M. Bianchini in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Contreras 1978a), (N: de la Peña 1983d, 1987, 2005b, 2013), (N: Casas y De la Peña 1994), (S/D: Chebez et al. 1998), (PP: Fraga 2002), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: C. Nelson en WFVZ)- **Chubut:** (N: Narosky en Casas y De la Peña 1994), (S/D: Chebez et al. 1998), (PP: Fraga 2002).

(b) (*Diuca diuca minor*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (N: Navas y Bó 1987b)- **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador en Nores 1996), (S/D: Salvador y Salvador 2014)- **San Luis:** (N: Salvador y Salvador 1984), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Narosky en Friedmann et al. 1977), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Mendoza:** (N: Reed 1913), (N: Navas y Bó 1987b), (N: Mezquida 2000, 2003), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Short 1967), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Narosky 1983), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Narosky en Casas y De la Peña 1994), (N: Camperi 1992), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Wetmore 1926), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Río Negro:** (N: De la Peña 1983d, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador y Salvador

1984), (N: Narosky en Casas y De la Peña 1994), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Chubut**: (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: J. Pemberton en MVZ), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Cruz**: (S/D: Chebez et al. 1998).

(c) (*Diuca diuca crasirostris*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca**: (N: De la Peña 1983d, 1987, 2005b, 2013)- **San Juan**: (S/D: Ortiz et al. 2003), (N: Salvador y Nores obs. pers.).

Yal Austral

(a) (*Melanodera melanodera melanodera*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas**: (S/D: Wace 1921), (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(b) (*Melanodera melanodera princetoniana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego**: (N: Olrog 1948), (J: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

Yal Andino

(a) (*Melanodera xanthogramma xanthogramma*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego**: (N: Reynolds 1932), (N: Olrog 1950).

(b) (*Melanodera xanthogramma barrosi*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén**: (S/D: Chebez et al. 1998)- **Santa Cruz**: (S/D: Imberti 2005).

Afrechero Plomizo

(*Haplospiza unicolor*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones**: (A/P: Bodrati et al. 2010).

Soldadito Común

(*Lophospingus pusillus*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán**: (N: Girard en Dinelli 1918a)- **La Rioja**: (A/P: Salvador et al. en prensa)- **San Juan**: (N: Haene et al. 1995)- **Córdoba**: (N: Heredia en Salvador et al. en prep.), (J: Salvador et al. en prep.)- **San Luis**: (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993).

Soldadito Gris

(*Lophospingus griseocristatus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Cachilo Canela

(*Donacospiza albifrons*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: Uranga en De la Peña 2016f)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (A/P: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Runnacles en Pereyra 1938), (PP: Di Giacomo y Aguilar 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Monterita Boliviana

(*Poospiza boliviana*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Monterita Pecho Gris

(*Poospiza hypochondria affinis*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Córdoba:** (S/D: Miatello et al. 1999).

Monterita de Cejas Rojizas

(*Poospiza erythrophrys erythrophrys*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Dinelli 1918a), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Monterita Canela

(*Poospiza ornata*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Luis:** (HF: Navas y Bó 1991b), (S/D: Nellar Ramonella 1993), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)-

Mendoza: (HF: Navas y Bó 1991b), (N: Mezquida 2000, 2004), (N: Mezquida y Marone 2001, 2003), (S/D: Milesi et al. 2002), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Uranga en De la Peña 2016f)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Sietevestidos Común

(*Poospiza nigrorufa*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Hussey 1916), (N: Gibson 1918), (N: Pereyra 1938), (N: Runnacles en Friedmann et al. 1977), (N: Narosky en Friedmann et al. 1977), (N: Di Giacomo y Aguilar 1986), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas, López Lanús y Veiga en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Sietevestidos Serrano

(*Poospiza whiti*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Miller 1917), (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Tucumán:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1924), (N: L. Dinelli en WFVZ)- **La Rioja:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador et al. en prep.), (N: A. Azategui in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Monterita Litoraleña

(*Poospiza cabanisi*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1933b, 1938), (N: Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (A/P y J: L. Pagano obs. pers.).

Monterita de Collar

(*Poospiza torquata pectoralis*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy en Friedmann et al. 1977), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Höy en De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santiago del Estero:** (N: Sánchez et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1924)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (HF: Navas y Bó 1991)- **Mendoza:** (N: Mezquida 2000, 2004), (N: Mezquida y Marone 2001, 2003), (S/D: Milesi et al. 2002)- **Buenos Aires:** (N: Zapata y Cabrera 1969)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

Monterita Cabeza Negra

(*Poospiza melanoleuca*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (N: Miller 1917), (N: Höy en Friedmann 1963), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: E. Depino et al. en eBird 2015d)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: S. Salvador y M. Nores obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Friedmann 1929), (N: Girard en Pereyra 1938), (N: Alabarce 1983), (N: Alabarce y Antelo 1998), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en FML), (N: S. Shipton en FML), (N: M. Lillo en FML), (N: L. Dinelli en MVZ)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba:** (N: Salvador y Salvador 1984, 2014), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador et al. en prep.), (N: R. Straneck en M. Rumboll in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.), (N: MZFC)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **San Luis:** (N: Masramón 1979)- **Buenos Aires:** (N: Babarskas y López Lanús 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Furman y Bastías 2012).

Monterita Serrana

(*Compsospiza baeri*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Jun.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Peris 1997), (S/D: Caplonch 2007), (N: Soria 2015), (A/P: S. Salvador y M. Nores obs. pers.), (J: L. Pagano obs. pers.).

Jilguero de Cola Blanca

(*Sicalis citrina pratensis*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Tucumán:** (N: Handford 1983), (S/D: Caplonch 2007).

Jilguero Puneño

(*Sicalis lutea*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Höy 1980a), (N: Narosky 1983), (N: De la Peña 1983d, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Jilguero de Cara Gris

(*Sicalis uropygialis*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 1983d, 1987, 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Jilguero Corona Gris

(*Sicalis luteocephala*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Uranga en De la Peña 2016f), (A/P: S. Salvador obs. pers.), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)

Jilguero Grande

(*Sicalis auriventris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb.)

Distribución territorial: **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001)- **Mendoza:** (N: Reed 1913), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Cruz:** (N: Roesler et al. 2014), (N, A/P y J: L. Pagano obs. pers.).

Jilguero Oliváceo

(*Sicalis olivascens*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Narosky 1983), (N: Salvador 2015a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Salvador 2015a).

Jilguero de Monte

(*Sicalis mendozae*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (A/P: Salvador et al. en prensa)- **San Juan:** (N: De la Peña 1983d, 1987, 2005b, 2013), (HF: Navas y Bó 2000), (S/D: Haene et al. 2001), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **San Luis:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Nellar Romanella 1993), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Jilguero Austral

(*Sicalis lebruni*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (N: Vuilleumier 1993), (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pes.)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: L. Pagano obs. pers.).

Jilguero Dorado

(a) (*Sicalis flaveola pelzelni*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: Friedmann 1927, 1929), (N: Girard en Segura et al.

2014)- **Corrientes**: (N: Wilson 1977), (N: Contreras 1988), (HF: Darrieu y Camperi 1996), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1983d, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000), (N: Quiroga et al. 2003), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba**: (N: Haro y Gutiérres 1992), (N: Nores y Nores 1994), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Salvador 2012e), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.)- **San Luis**: (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (N: Contreras 1980c)- **Buenos Aires**: (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Hussey 1916), (N: Gibson 1918), (N: Renard 1920), (N: Daguerre 1922), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Arhex et al. 2005), (N: Arhex et al. 2005), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Arhex y Massoni 2008), (N: Palmerio y Massoni 2009, 2011), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Miquel et al. 2015), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa**: (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén**: (N: Dupuy 2005)- **Río Negro**: (S/D: Llanos et al. 2011).

(b) (*Sicalis flaveola brasiliiana*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Misiones: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: S. Salvador obs. pers.).

Misto

(*Sicalis luteola luteiventris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1983b, 1983d, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000)- **Córdoba**: (N: Salvador 1983), (N: Salvador y Salvador 1984, 1986, 1988, 2012, 2014), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.)- **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928)- **San Luis**: (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza**: (N: Reed 1913)- **Buenos Aires**: (N: Sternberg 1869), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Zuberbühler 1956, 1971), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Narosky en Friedmann et al. 1977), (N: Mason 1985), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **La Pampa**: (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno

et al. 2007), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Neuquén**: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro**: (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011)- **Chubut**: (N: Durnford 1877a).

Coludo Grande

(*Emberizoides herbicola herbicola*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco**: (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Corrientes**: (HF: Darrieu y Camperi 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010).

Coludo Chico

(*Emberizoides ypiranganus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa**: (N: Di Giacomo 1998a, 2005)- **Corrientes**: (HF: Darrieu y Camperi 1996), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010).

Verdón

(a) (*Embernagra platensis platensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa**: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo y Di Giacomo 2013)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes**: (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe**: (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (A/P: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba**: (N: Nores e Yzurieta 1979c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Baliño 1984), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires**: (N: Holland 1892, 1895), (N: Gibson 1918), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Narosky en Friedmann et al. 1977), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Earnshaw en Salvador y Bodrati 2014b), (N: P. Mason en WVFZ), (N: S/C, WVFZ), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Embernagra platensis olivascens*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (N: Höy en Friedmann 1963)- (S/D: Moschione et al. 2013)- **Santiago del Estero**: (N y A/P: Salvador y Salvador en prep.)- **Tucumán**: (N: Dinelli 1918a), (N: Alabarce 1983), (N: Alabarce y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en FML)- **Córdoba**: (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador et al. en prep.), (N y A/P: Salvador y Salvador en prep.)- **San Luis**: (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993).

(c) (*Embernagra platensis gossei*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Pereyra 1951)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003).

(d) (*Embernagra platensis catamarcanus*)

Nota: S/I

Volatinero

(*Volatinia jacarina jacarina*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Escobar 2006), (N:

Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2014b) (N: W. Partridge en MACN)-

Corrientes: (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013, 2016f)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N:

Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993).

Corbatita Overo

(*Sporophila lineola lineola*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:**

(N: Höy en Friedmann et al. 1977), (N: Contino 1980), (N: De la Peña 1981b, 1987, 2005b, 2013), (N: Uranga en De la Peña 2016f), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Formosa: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: A. Bodrati 1997-1999 in litt.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: M. Lillo en FML), **Santa Fe:** (N:

Hartert y Venturi 1909).

Corbatita Blanco

(*Sporophila leucoptera leucoptera*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Corbatita de Boina Negra

(*Sporophila pileata*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001).

Capuchino Canela

(*Sporophila hypoxantha*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Facchinetti et al. 2008), (J: Chatellenaz 2008)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010),

(J: Areta en Salvador y Bodrati 2013a)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.).

Capuchino Garganta Café

(*Sporophila ruficollis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Narosky y Martelli 1995)- **Corrientes:** (S/D:

Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1981b, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires:** (S/D: Roda en Narosky y Di Giacomo 1993).

Capuchino de Pecho Blanco

(*Sporophila palustris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (N: Narosky 1983), (N: Vizentin Bugini et al.

2013)- **Entre Ríos:** (N y A/P: Vizentin Bugini et al. 2013).

Capuchino Castaño

(*Sporophila hypochroma*)

Distribución temporal: (Ene., Dic.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Entre Ríos:** (A/P:

S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Roda y López Lanús 2008).

Capuchino de Corona Gris

(*Sporophila cinnamomea*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: Uranga en

De la Peña 2016f)- **Entre Ríos:** (N: Zelich en Narosky 1973a), (N: Narosky y Salvador 1985), (S/D: Chebez et al. 1998).

Capuchino Iberá

(*Sporophila iberaensis*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Corrientes:** (A/P: Krause 2014)

Curió

(*Sporophila angolensis angolensis*)

Nota: S/I

Corbatita Común

(*Sporophila caerulescens caerulescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: Smyth 1928), (N: Fridmann 1929), (N: Girard en Fridmann 1929), (N: Alabarce 1987), (N: Caplonch 1997), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1981b, 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: Partridge 1953), (N: Leiva et al. 2004), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (N: Klimaitis 1986a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Leiva et al. 2004)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Pereyra 1938, 1953), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Earnshaw en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (SD: Maceda y Kin 2001), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007).

Corbatita Picudo

(*Sporophila falcirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino 1990), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Areta et al. 2013), (N y A/P: A. Bodrati 2008-2009 in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Corbatita Dominó

(*Sporophila collaris melanocephala*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Facchinetti et al. 2008)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1981b, 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004), (N: Fandiño y Pautasso 2011)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: La Grotteria 2010)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Earnshaw en Narosky y Di Giacomo 1993) (N: M. Earnshaw in litt.).

Piquitodeoro Común

(*Catamenia analis analis*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Höy 1976a)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)-
Catamarca: (N: De la Peña 2001b, 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Handford 1983), (J: Caplonch et al. 2011)- **Córdoba:** (N: Salvador y Narosky 1984), (N: Salvador y Salvador 1988, 2012)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Narosky et al. 1984), (A/P: L. Segura in litt. 2015)- **La Pampa:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Piquitodeoro Grande

(a) (*Catamenia inornata inornata*)

Distribución temporal: (Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Narosky 1983), (N: Salvador 2015a)-
Salta: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)-
Tucumán: (J: Caplonch et al. 2011), (N: Salvador 2015a).

(b) (*Catamenia inornata cordobensis*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Salvador 1992)- (N: Salvador y Salvador 2012)-
San Luis: (S/D: Nellar Romanella 1993).

Cachilo de Antifaz

(*Coryphaspiza melanotis*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Brasita de Fuego

(a) (*Coryphospingus cucullatus fargoi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Höy en Friedmann 1963), (N: De la Peña 1987), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1918a), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (De la Peña 1979, 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b), (N: MZFC)- **San Luis:** (N: Masramón 1979).

(b) (*Coryphospingus cucullatus rubescens*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Chebez et al. 1998), (PP: Fraga 2002), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1938).

Cardenal Amarillo

(*Gubernatrix cristata*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy 1969)- **Corrientes:** (N: Domínguez et al. 2015)- **Santa Fe:** (N: Pereyra 1938), (N: De la Peña 1981a, 1987, 2005b, 2013), (A/P: Pautasso 2011)- **Córdoba:** (S/D: Castellanos 1934), (N: Azategui 1985), (N: MZFC), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Hartert y Venturi 1909), (A/P: R. Fraga in litt.)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Domínguez et al. 2015), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Narosky et al. 1990), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993)- **La Pampa:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Río Negro:** (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (S/D: Llanos et al. 2011), (C. Saibene, S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.).

Mielero

(*Coereba flaveola chloropyga*)

Distribución temporal: (Abr., Ago., Oct., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: M. Rumboll in litt.), (N: C. Saibene in litt.), (N: A. Bodrati in litt. 2003), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1988).

Espiguero Pardo

(*Tiaris obscurus obscurus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1968), (N: A. Contino y F. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Höy 1976a), (N: De la Peña 1981b, 2005b, 2013), (N: Höy en De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (N: A. Bodrati in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2001c, 2005b, 2013).

Espiguero Negro

(*Tiaris fuliginosus*)

Distribución temporal: (Ago., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N y A/P: Areta y Bodrati 2008).

Incertae Sedis

Pepitero Multicolor

(*Saltatricula multicolor*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy en Friedmann 1963), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Chaco:** (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Girard FML), (N: T. Narosky y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918a), (N: Girard en Friedmann 1929), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en

MVZ)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba**: (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928)- **San Luis**: (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Mendoza**: (N: Mezquida 2000, 2003, 2004), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002).

Pepitero Gris

(*Saltator coerulescens coerulescens*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: Contino 1980), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: F. Contino in litt.)- **Salta**: (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Di Giacomo 2005), (A/P: Chatellenaz 2008), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes**: (N: Contreras 1988), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Catamarca**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán**: (N: Dinelli 1924), (N: Fridmann 1927, 1929), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en FML), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: P. Girard en MVZ)- **Corrientes**: (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1981a, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2002), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba**: (N: Castellanos 1934), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador, M. Nores y D. Yzurieta obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (N: De la Peña 1987), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires**: (N: Pereyra 1938), (S/D: Klimaitis en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: López Lanús en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Narosky y Babarskas en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB 2011).

Pepitero Verdoso

(*Saltator similis similis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Formosa**: (J: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones**: (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Corrientes**: (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004)- **Entre Ríos**: (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Buenos Aires**: (S/D: DECB 2011).

Pepitero Picudo

(*Saltator maxillosus*)

Distribución temporal: (May.)

Distribución territorial: **Misiones**: (A/P: Bodrati y Cockle 2006 e in litt. 2015).

Pepitero de Collar

(a) (*Saltator aurantiirostris aurantiirostris*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (J: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (J: López Lanús 1997), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: P. Girard en IML), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: Friedmann 1927), (N: Girard en Fridmann 1929), (N: Friedmann et al. 1977), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: P. Girard en FML), (N: L. Dinelli en WFVZ)- **Corrientes:** (HF: Darrieu y Camperi 1996)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1981a, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Antoniazzi et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: De la Peña 1981a, 1987, 2005b, 2013), (N: Rojas et al. 2013), (N: Luczywo et al. 2013), (N: Heredia en Salvador y Bodrati 2014b), (N: Díaz et al. 2015), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Friedmann 1927, 1929), (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Leiva et al. 2004)- **Buenos Aires:** (S/D: Fernández en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

(b) (*Saltator aurantiirostris tilcarae*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Uranga 2016).

(c) (*Saltator aurantiirostris nasica*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **La Rioja:** (N y A/P: A. Bodrati in litt.)- **Mendoza:** (N: Reed 1913, 1919), (N: Pereyra 1951), (N: Mezquida 2000, 2003), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002), (J: Martín et al. 2011)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Pepitero negro

(Saltator fuliginosus)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Escobar 2006), (A/P: A. Bodrati in litt. 2015).

Familia Emberizidae

Frutero Yungueño

(Chlorospingus flavopectus argentinus)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Cadena et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Cachilo Corona Castaña

(a) (*Rhynchospiza strigiceps strigiceps*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Uranga en De la Peña 2016f)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.).

(b) (*Rhynchospiza strigiceps dabbenei*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Höy en Friedmann 1963), (N: Höy 1971), (S/D: Moschione et al. 2013).

Cachilo Ceja Amarilla

(*Ammodramus humeralis xanthornus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Chatellenaz et al. 2010)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1975, 1983b, 1987, 2005b, 2013), (J: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Nores e Yzurieta in litt.), (N: Salvador y Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Smyth 1928), (N: Montefinale 2014)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1893), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1937a), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: Morici 2012b) (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1951).

Cerquero Vientre Blanco

(*Arremon torquatus borellii*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.).

Cerquero de Collar

(a) (*Arremon flavirostris dorbignii*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Di Giacomo y López Lanús 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: A. Contino en WVFZ)- **Salta:** (N: Höy en Friedmann et al. 1977), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Höy en De la Peña 2005b, 2013), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1918a), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et al. 2014).

(b) (*Arremon flavirostris polionotus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Salvador en de la Peña 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2000)-

Corrientes: (N: Contreras 1988), (HF y N: Darrieu y Camperi 1996), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: R. Crossin en WFVZ), (N: L. Short en WFVZ)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Chingolo

(a) (*Zonotrichia capensis pulacayensis*)

Distribución temporal: (Feb., Mar.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Narosky en Carman 1989), (N: Salvador 2015a)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.).

(b) (*Zonotrichia capensis subtorquata*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2011), (N: Cockle et al. 2016), (N: Partridge NACN), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.).

(c) (*Zonotrichia capensis sanborni*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **San Juan:** (HF: Navas y Bó 1991b), (S/D: Haene et al. 2001), (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Mendoza:** (N: Reed 1913), (HF: Navas y Bó 1991b), (N y A/P: S. Salvador obs. pers.).

(d) (*Zonotrichia capensis chorauleus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Partridge 1953), (S/D: Ordano 1996), (N: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Salvador 2012), (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (N: Contreras 1980c), (N: Mezquida 2000, 2003), (N: Mezquida y Marone 2001), (S/D: Milesi et al. 2002)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007).

(e) (*Zonotrichia capensis hypoleuca*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., May., Jul., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (N: Miller 1917), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador en Carman 1989), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (N: Narosky y Martelli 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (N: Narosky en Carman 1989), (N: Utges 1992), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Catamarca:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: Salvador en Carman 1989)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1924), (N: King 1973), (N: Handford 1980), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Salvador y Narosky en Carman 1989), (N: Caplonch 1997), (S/D: Caplonch 2007), (S/D: Caplonch et al. 2011), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: De la Peña en Carman 1989), (N: Ríos en Pautasso 2000), (N: De la Peña en Pautasso 2000), (N: Pautasso 2002), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: Salvador 1983), (N: De la Peña 1987,

2005b, 2013), (N: Salvador en Carman 1989), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: Salvador y Salvador en prep.).

(f) (*Zonotrichia capensis argentina*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1928), (N: De la Peña 1987), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: A. Bodrati in litt.)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Hudson 1870c), (N: Gibson 1880), (N: Hussey 1916), (N: Wetmore 1926), (N: Smyth 1928), (N: Renard 1933), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Orians et al. 1977), (N: Fraga 1978, 1983a), (N: Gochfeld 1979a), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (N: Carman 1989), (N: Salvador en Carman 1989), (N: Di Giacomo en Carman 1989), (N: Mosteirin en Carman 1989), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas, López Lanús y Veiga en Babarskas et al. 2003), (N: Bodrati et al. 2006 e in litt.), (N: Fernández y Duré Ruiz 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (S/D: Carro y Fernández 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

(g) (*Zonotrichia capensis australis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (N: Contreras 1977), (N: Christie et al. 2004), (PP: M. Bianchini in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Río Negro:** (N: Peters 1923), (N: Wetmore 1926), (N: Keve y Kovács 1971), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Chubut:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Cruz:** (N: Zapata 1967), (J: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Tierra del Fuego:** (N: Crawshay 1907), (N: Olrog 1950), (N: Parmelee et al. 1994), (N: M. Rumboll in litt.).

Cerquero Cabeza Castaña

(*Atlapetes fulviceps*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Uranga en De la Peña 2016f)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Cerquero Amarillo

(*Atlapetes citrinellus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Abr., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Girad en Dinelli 1918a), (N: Smyth 1928), (N:

Girard en Fridmann 1929), (N: Girard en Pereyra 1951), (S/D: Caplonch 2007), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010), (N: Caplonch et al. 2014), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en FML), (N: P. Girard en FML), (N: P. Girard en WFVZ).

Familia Cardinalidae

Fueguero

(a) (*Piranga flava flava*)

Distribución temporal: (Set., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Uranga en De la Peña 2005b, 2013), (N: A. Bodrati 2003 in litt.)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador obs. pers.), (N: J. Heredia in litt.)- **Buenos Aires:** (S/D: Montaldo y Claver 1986), (S/D: Ciocatto en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Morici 2012b), (N: L. Pagano obs. pers.).

(b) (*Piranga flava saira*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bertoni 1918), (A/P: Bodrati et al. 2010) (N: M. Rumboll in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.).

Fueguero Morado

(*Habia rubica rubica*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (A/P: Bodrati et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 2014).

Rey del Bosque

(*Pheucticus aureoventris aureoventris*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: De la Peña 2001b 2005b, 2013)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1924), (N: Girard en Fridmann 1929)- **San Juan:** (N: Haene et al. 1995)- **Córdoba:** (S/D: Castellanos 1934), (A/P: Heredia en Salvador et al. en prep.), (A/P: Salvador et al. en prep.), (J: Bean en Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (N: Nellar Romanella 1993), (N: Olivieri Bornand 2015).

Reinamora Enana

(*Amaurospiza moesta*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010).

Reinamora Chica

(*Cyanoloxia glaucoaerulea*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Uranga en De la Peña 2016f), (A/P: A. Bodrati in litt. 1994)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1923, 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: DECB 2011).

Reinamora Grande

(a) (*Cyanocompsa brissonii argentina*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N y A/P: A. Bodrati in litt.)-

Santiago del Estero: (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Dinelli 1924), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Fridmann 1929), (N: Girard en Pereyra 1951), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (S/D: Nellar Romanella 1993).

(b) (*Cyanocompsa brissonii sterea*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N y A/P: Bodrati et al. 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (HF: Darrieu y Camperi 1996), (A/P: A. Bodrati in litt. 1992)- **Entre Ríos:** (S/D: Chebez et al. 1998), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (S/D: Fernández en Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 1996), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: DECB 2011).

Familia Parulidae

Arañero Cara Negra

(*Geothlypis aequinoctialis velata*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Miller 1917), (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Misiones:** (A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (N: Dinelli 1922), (S/D: Caplonch 2007), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: M. Lillo en IML)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Pautasso 2000, 2002, 2006), (N: Leiva et al. 2004), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (Castellanos 1934), (N: Salvador y Salvador 1984, 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.), (S. Salvador obs. pers.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1923, 1938), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas y López Lanús en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), A/P: A.

Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: T. Narosky in litt.), (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.), (A/P: L. Pagano obs. pers.).

Pitiayumí

(*Setophaga pitiayumi pitiayumi*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (N: Hartert y Venturi 1909), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (N: A. Bodrati in litt. 1997, 2000)- **Tucumán:** (N: Alabarce 1987)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (N: Chatellenaz y Ferraro 2007), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (A/P: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: A. Bodrati in litt. 1997)- **Buenos Aires:** (N: Pereyra 1937b, 1938), (N: Milat y Klimaitis 1993, 2015), (N: Moschione en Milat y Klimaitis 1993, 2015), (N: Di Giacomo en Milat y Klimaitis 1993, 2015), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N y A/P: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014).

Arañero de Pico Páldido

(*Myiothlypis flaveola*)

Nota: S/I

Arañero Silbón

(*Myiothlypis leucoblephara*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Salvador en De la Peña 2010)- **Misiones:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (N y A/P: Bodrati et al. 2010), (N: C. Saibene in litt.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 1998)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: W. Partridge en MACN)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Arañero de Cejas Amarillas

(*Myiothlypis signata flavovirens*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Arañero Rivereno

(*Myiothlypis rivularis rivularis*)

Distribución temporal: (Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: De la Peña 1984, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: T. Narosky in litt.), (N: C. Saibene in litt.), (A/P: A. Bodrati 2005 in litt.).

Arañero Coronado Grande

(*Myiothlypis bivittatus argentinae*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L.

Salvador en prep.), (A/P: A. Bodrati in litt.)- **Salta:** (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013).

Arañero Coronado Chico

(a) (*Basileuterus culicivorus viridescens*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Tucumán:** (N: Girard en Dinelli 1918a), (N: Caplonch 1997).

(b) (*Basileuterus culicivorus azarae*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: C. Saibene in litt.)-

Chaco: (S/D: Chatellenaz 2005), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 1998)- **Corrientes:** (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b)- **Buenos Aires:** (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012).

Arañero Corona Rojiza

(*Myioborus brunniceps brunniceps*)

Distribución temporal: (Ene., Set, Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Auer et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013)-

Tucumán: (S/D: Caplonch 2007), (A/P: Caplonch et al. 2011)- **Córdoba:** (N y A/P: Heredia y Salvador 2014), (N: Narosky e Yzurieta en Heredia y Salvador 2014).

Familia Icteridae

Yapú

(*Psarocolius decumanus decumanus*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino en Olrog 1958), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Caradona en Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Marcaida 2014), (N: A. Bodrati in litt. 1996)- **Salta:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo y López Lanús 2000), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: Uranga en De la Peña 2016f), (N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: L. Pagano obs. pers.) (N: S. Salvador y L. Salvador obs. pers.)- **Formosa:** (N: Narosky y Martelli 1995), (N: Ramírez Llorens et

al. 2003), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Corrientes**: (N: Soteras 2011), (PP: Teran 2014), (N: Uranga en De la Peña 2016f), (N: R. Fraga in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.).

Boyero Negro

(*Cacicus solitarius*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Abr., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy**: (N: A. Contino en WVFZ)- **Salta**: (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa**: (N: Kerr 1892), (N: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Leiva et al. 2004), (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008), (N: Di Giacomo et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco**: (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Santiago del Estero**: (N: Coria et al. 2013), (N: S. Salvador y P. Eroles obs. pers.)- **Corrientes**: (N: Contreras 1988), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz 2004), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: L. Short en WVFZ), (N: R. Crossin en WVFZ)- **Santa Fe**: (N: Beltzer 1986), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: Merlino 2013)- **Córdoba**: (J: Spinuzza y Villegas 2013)- **Entre Ríos**: (N: Smyth 1928), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: A. Bodrati in litt. 1996), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Buenos Aires**: (N: Pereyra 1923, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Haene y Bodrati en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: La Grotteria 2010), (S/D: DECB 2011), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Boyero de Alas Amarillas

(*Cacicus chrysopterus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta**: (N: Babarskas et al. 1995), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Coconier et al. 2007), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Formosa**: (N: Kerr 1892), (S/D: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Leiva et al. 2004), (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008), (N: A. Bodrati in litt. 1995), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Misiones**: (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Oscar 2012), (N: Cockle et al. 2016), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Chaco**: (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Bodrati y Fraga 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013a, 2013c), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: C. Ferrari y S. Vitale in litt.)- **Santiago del Estero**: (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán**: (N: Girard 1932), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes**: (N: Wright y Ferrero 1985), (N: Contreras 1988), (S/D: Chatellenaz 2004), (N: De la Peña 2005b), (N: Bodrati y Fraga 2010), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: L. Short en WVFZ)- **Santa Fe**: (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Entre Ríos**: (S/D: Chebez et al. 1998).

Boyero Cacique

(*Cacicus haemorrhous affinis*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Fraga 2011a), (N: Salvador y Bodrati 2014a), (N: Cockle et al. 2016), (N: S. Salvador, T. Narosky y R. Fraga obs. pers.), (N: L. Pagano obs. pers.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (N: Fraga 2011a), (N: A. Bodrati in litt. 2007, 2014).

Matico

(*Icterus croconotus strictifrons*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Maugeri y Drozd 2006), (S/D: Moschione et al. 2013).

Boyerito

(*Icterus pyrrhogaster*)

Distribución temporal: (Ene., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Contino 1980), (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Chatellenaz 2008)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Escobar 2006), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Fraga 2011b), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015)- **Corrientes:** (N: Contreras 1988), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: M. Christie en MVZ)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1970a), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Pereyra 1938), (S/D: Montaldo y Claver 1986), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.).

Chopí

(*Gnorimopsar chopi chopi*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Mahler et al. 2009), (N: Di Giacomo y Reboreda 2014)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (N: Fraga 1996, 2008), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Cockle et al. 2011, 2012), (S/D: Anfuso y Elesegood 2012), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 2015) (N: S. Salvador obs. pers.)-

Corrientes: (N: Fraga 2008), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: S. Salvador obs. pers.)-
Santa Fe: (N: De la Peña 1983a, 1987, 2005b, 2013).

Tordo Patagónico

(a) (*Curaeus curaeus curaeus*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Neuquén:** (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (A/P: Orians et al. 1977), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: C. Nelson en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005).

(b) (*Curaeus curaeus reynoldsi*)

Distribución temporal: (Nov.)

Distribución territorial: **Tierra del Fuego:** (N: Hartert y Venturi 1909).

Federal

(*Amblyramphus holosericeus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (J: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador 2012f)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati 2000 in litt.)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: A. Boloqui en eBird 2015a)- **Santa Fe:** (N: Leiva et al. 2004)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1880, 1918), (N: Dabbene 1918b), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1934b, 1938), (N: Orians et al. 1977), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Fernández y Mermoz 2000), (S/D: Martínez 2001), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (N: Fernández et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (A/P: Serur 2014), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: P. Mason en WFVZ), (N: S/C, WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.).

Varillero Negro

(*Agelasticus cyanopus cyanopus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., May., Jun., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Jujuy:** (N: Contino 1980)- **Formosa:** (J: López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (PP: Salvador y Bodrati 2014b), (N: A. Bodrati in litt. 1997, 1999)- **Corrientes:** (N: S. Salvador y T. Narosky obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Babarskas y López Lanús 1993), (N y A/P: A. Bodrati in litt. 1996).

Varillero Ala Amarilla

(*Agelasticus thilius petersi*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Tucumán:** (N: Girard en Friedmann 1929)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: White 1882), (N: Withington 1888), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1933a, 1938), (N: Narosky en Friedmann et al. 1977), (N: Orians et al. 1977), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Massoni y Reboreda 1999, 2002), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Graña Grilli y Montalti 2014), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: col. G. Stewart en WFVZ), (N: P. Mason en WFVZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Chubut:** (PP: Fraga 2002)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti y Albrieu 2001), (N: M. Moroni in litt.).

Varillero Congo

(*Chrysomus ruficapillus ruficapillus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: A. Contino en WFVZ)- **Salta:** (N: Höy y Ottow 1964), (S/D: Moschione et al. 2013), (N: M. Rumboll in litt.)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (N: M. Rumboll in litt.), (N: A. Bodrati in litt.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (S/D: Torres y Michelutti 2001), (N: C. Olrog en WFVZ)- **Tucumán:** (N: Dinelli en Hartert y Venturi 1909), (N: Smyth 1928), (N: Girard en Friedmann 1929), (N: Alabarse y Antelo 1998), (N: Girard en Segura et al. 2014), (N: L. Dinelli en WFVZ), (N: P. Girard en WFVZ), (N: P. Girard en MVZ)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (S/D: Pergolani de Costa 1950), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Fandiño y Pautasso 2011), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (N: Lucero 2009)- **Córdoba:** (N: Salvador 1983), (N: Salvador y Salvador 1984, 2014), (N: De la Peña 2005b, 2013), (S/D: Torres y Michelutti 2006), (N: Corelli et al. 2009), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Daguerre 1922, 1932), (N: Pereyra 1932, 1933a, 1938), (S/D: Pergolani de Costa 1950), (N: Orians et al. 1977), (N: Klimaitis 1973), (N: Narosky en Friedmann et al. 1977), (N: De la Peña 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Blanco 1995), (N: Lyon 1997), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (S/D: Pergolani de Costa 1950).

Tordo Amarillo

(*Xanthopsar flavus*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N y AP: Klimaitis 1984, 1986), (N: Fraga et al. 1998)- **Buenos Aires:** (N: Holland 1893), (N: Pereyra 1933a, 1938).

Pecho Amarillo Grande

(*Pseudoleistes guirahuro*)

Distribución temporal: (Ene., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Fraga y Di Giacomo 2004), (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (N: Uranga en De la Peña 2013, 2016f) - **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Pecho Amarillo Común

(*Pseudoleistes virescens*)

Distribución temporal: (Set., Oct., Nov., Dic.)

Corrientes: (S/D: Fraga 2001), (N: D. Wilson in litt.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: S/C, WVFZ)- **Córdoba:** (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Barrows 1883), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Smyth 1928), (PP: Fraga 2002), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1870c), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1932c, 1938), (N: Gavio 1944), (N: Weller 1967), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Orians et al. 1977), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Mermoz y Reboreda 1994, 1996, 1998, 1999, 2003), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Di Giacomo en Babarskas et al. 2003), (N: Babarskas en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Cozzani y Zalba 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (N: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: P. Mason en WVFZ), (N: S/C, WVFZ), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: T. Narosky in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.).

Tordo Músico

(*Agelaioides badius*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Miller 1917), (N: Höy y Ottow 1964), (N: De la Peña 1987, 2013), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Gil y Gómez en López Lanús 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Di Giacomo 2005), (N: Mahler et al. 2009)- **Misiones:** (N: Fraga 2008)- **Chaco:** (N: Bodrati y Pietrek 2000), (S/D: Chatellenaz 2005), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Catamarca:** (N: Orians et al. 1977)- **Tucumán:** (N: Friedmann 1927, 1929), (N: Smyth 1928), (N: Caplonch 1997), (N: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (N: Fraga 2008)- **Santa Fe:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: De la Peña 1983b, 1987, 2005, 2013), (N: Pautasso 2002), (N: De la Peña et al. 2003), (N: Leiva et al. 2004), (N: Antoniazzi et al. 2010)- **La Rioja:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N:

Salvador 1983, 2012e), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Martella et al. 1985), (N: Fraga 1988), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (N: Nores y Nores 1994), (N: Lichstein 2001b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923), (N: Smyth 1926, 1928), (N: Friedmann 1927, 1929), (N: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 19870d, 1874a), (N: Holland 1892), (N: Gibson 1918), (N: Daguerre 1922, 1924b), (N: Pereyra 1938), (N: Fraga 1979a, 1983d, 1984c, 1988, 1991), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Fernández y Mermoz 2000), (N: Lichstein 2001b), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: De Mársico y Reboreda 2010), (N: De Mársico et al. 2010, 2014), (S/D: DECB 2011), (S/D: Morici 2012b), (N: De Mársico et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Tordo Pico Corto

(*Molothrus rufoaxillaris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (NP: Miller 1917), (NP: Höy y Ottow 1964), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (NP: Di Giacomo 2005), (NP: Mahler et al. 2009), (NP: Di Giacomo et al. 2010), (NP: Di Giacomo y Reboreda 2014)- **Misiones:** (NP: Fraga 1996, 2008)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Tucumán:** (NP: Friedmann 1927, 1929)- (NP: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (NP: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (NP: Antoniazzi et al. 2010)- **Córdoba:** (NP: Castellanos 1934), (S/D: Salvador y Salvador 1984), (NP: Fraga 1988), (NP: Martella et al. 1985), (NP: Lichstein 2001b), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (NP: Salvador et al. en prep.), (NP: Salvador y Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (NP: Smyth 1926, 1928), (NP: Friedmann 1927, 1929), (NP: Baliño 1984), (S/D: Chebez et al. 1998), (NP: Salvador y Salvador en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (NP: Salvador y Salvador en prep.)- **Buenos Aires:** (NP: Hudson 1874a), (NP: Holland 1892), (NP: Gibson 1918), (NP: Daguerre 1922, 1924b), (NP: Pereyra 1938), (N: Fraga 1979a, 1983d, 1984c, 1988, 1991), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (NP: Mermoz y Reboreda 1996), (NP: Fernández y Mermoz 2000), (NP: Lichstein 2001b), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (NP: De Mársico y Reboreda 2010, 2014), (NP: De Mársico et al. 2010), (S/D: Morici 2012b), (NP: De Mársico et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (NP: Runnacles en Segura et al. 2014), (NP: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (NP: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Tordo Gigante

(*Molothrus oryzivorus oryzivorus*)

Distribución temporal: (Ene., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (NP: De la Peña 1984, 1987, 2005b, 2013), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (NP: Bodrati et al. 2010), (NP: Fraga 2011a), (NP: Salvador y Bodrati 2014a), (NP: L. Pagano obs. pers.), (NP: S. Salvador obs. pers.)- **Corrientes:** (NP: Fraga 2011a), (PP: Teran 2014).

Tordo Renegrido

(*Molothrus bonariensis bonariensis*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Mar., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (NP: Salvador y Bodrati 2011), (NP: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (NP: Miller 1917), (NP: Höy y Ottow 1964), (NP: Höy en Friedmann et al. 1977), (NP: Salvador y Salvador 1984), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (NP: Castelino 1985), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (PP: Fraga 2002), (NP: Bodrati et al. 2010), (NP: Salvador y Bodrati 2011)- **Formosa:** (NP: Salvador y Salvador 1984), (NP: Di Giacomo 1998b, 2005), (S/D: Chebez et al. 1998)- **Chaco:** (NP: Salvador y Salvador 1984), (S/D: Chatellenaz 2005), (N/P: Bodrati y Fraga 2010), (N/P: Salvador y Bodrati 2013c)- **Catamarca:** (N/P: De la Peña 2001b)- **Santiago del Estero:** (N/P y PP: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (NP: Friedmann 1927, 1929), (NP: Noris en Friedmann 1931), (NP: King 1973), (NP: Olrog en Friedmann et al. 1977), (NP: Salvador y Salvador 1984), (NP: Alabarce y Antelo 1998), (NP: Girard en Segura et al. 2014)- **Corrientes:** (NP: Wilson 1977, 1979), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (PP: Fraga 2002), (NP: Bodrati y Fraga 2010), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (NP y PP: S. Salvador obs. pers.)- **Chaco:** (NP: Salvador y Salvador 1984)- **Santa Fe:** (NP: Friedmann 1927), (NP: Hermann y Meise 1965), (NP: De la Peña 1983b, 1987, 2005b, 2013), (NP: Beltzer 1986), (NP: De la Peña en Pautasso 2000), (NP: Pautasso 2000, 2002), (PP: Antoniazzi et al. 2010)- **La Rioja:** (NP: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (S/D: Ortiz et al. 2003)- **Córdoba:** (NP y PP: Castellanos 1934), (NP: Salvador y Narosky 1983), (NP: Salvador 1983, 1984, 2011b), (NP: Salvador y Narosky en Narosky et al. 1983), (NP: Salvador y Salvador 1984, 1986, 2012, 2014), (NP: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Ordano 1996), (PP: Miatello et al. 1999), (NP: Turienzo y Di Iorio 2010), (NP: Salvador y Bodrati 2011, 2013a), (NP: Salvador et al. en prep.), (NP: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Entre Ríos:** (NP: Serié y Smyth 1923), (NP: Smyth 1928), (NP: Friedmann 1929), (N: Baliño 1984), (NP: Fraga et al. 1998), (S/D: Chebez et al. 1998), (NP: Salvador y Bodrati 2013a)- **San Luis:** (NP: Goodall en Friedmann et al. 1977), (NP: Salvador y Salvador 1984), (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Mendoza:** (NP: Reed 1913), (NP: Contreras 1980c), (NP: Partridge en Narosky et al. 1983), (NP: Salvador y Salvador 1984), (NP: Milesi et al. 2002), (NP: Astié 2003, 2013), (NP: Astié y Reboreda 2005, 2006, 2009a, 2009b), (NP: Fiorini et al. 2005)- **Buenos Aires:** (NP: Hudson 1870c, 1874a), (NP: Gibson 1880, 1918), (NP: White 1882), (NP: Withington 1888), (NP: Holland 1890, 1892), (NP: Grant 1911, 1912), (NP: Dabbene 1918b), (NP: Daguerre 1922), (NP:

Wetmore 1926), (NP: Friedmann 1929, 1933, 1963), (NP: Pereyra 1933b, 1938), (NP: Renard 1933), (NP: Zapata y Cabrera 1969), (NP: Fraga 1978, 1983a, 1985), (NP: Gochfeld 1979a, 1980), (NP: Carman en Narosky et al. 1983), (NP: Narosky e Yzurieta en Narosky *et al.* 1983), (NP: Salvador y Salvador 1984), (NP: Mason 1985), (NP: Earnshaw en Fraga y Narosky 1985), (NP: Mason y Rothstein 1986), (NP: Montaldo y Claver 1986), (PP: Di Giacomo y Aguilar 1987), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (NP: Darrieu et al. 1988), (NP: Babarskas y López Lanús 1993), (NP: Narosky y Di Giacomo 1993), (NP: Lichstein 1998, 2001a), (NP: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (NP: López Lanús et al. 1999), (NP: Massoni y Reboreda 1999, 2002), (NP: Fernández y Mermoz 2000), (S/D: Martínez 2001), (PP: Fraga 2002), (NP: Sackmann y Reboreda 2003), (PP: Couri et al. 2005), (NP: Fiorini et al. 2005), (NP: Fiorini y Reboreda 2006), (NP: Massoni et al. 2006), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (NP: Mahler et al. 2007), (NP: Tuero et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (NP: Cozzani y Zalba 2009), (NP: Turienzo y Di Iorio 2010), (NP: De Mársico y Reboreda 2010), (NP: De Mársico et al. 2010), (NP: Delhey et al. 2010, 2011), (NP: Fiorini et al. 2012), (NP: Tuero et al. 2012), (PP: Sánchez y Solis Fieg 2012), (NP: Segura y Reboreda 2012b), (NP: de la Colina et al. 2012), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (NP: Carro y Fernández 2013), (NP: Runnacles en Segura et al. 2014), (NP: M. Earnshaw in litt.), (NP: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (NP: Pereyra 1937a), (NP: Maceda y Kin 2001), (NP: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (NP: Contreras 1977), (PP: Fraga 2002), (Christie et al. 2004), (PP: M. Bianchini in litt.)- **Río Negro:** (NP: Wetmore 1926), (NP: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (NP: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (NP: Salvador y Salvador 1984), (PP: Fraga 2002).

Pecho Colorado

(*Sturnella superciliaris*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001)- **Santa Fe:** (N: Wilson 1926), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (J: Fandiño y Pautasso 2011)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador y Bodrati 2014b), (N: Salvador et al. en prep.), (N: M. Nores y D. Yzurieta in litt.), (N: Salvador y Salvador en prep.), (N: S. Salvador obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993)- **Buenos Aires:** (N: Sternberg 1869), (N: Holland 1892), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gibson 1918), (N: Dabbene 1918b), (N: Daguerre 1922), (N: Pereyra 1933b, 1938), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Martínez 2001), (PP: Fraga 2002), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: Morici 2012b), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Codesido et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: M. Earnshaw in litt.), (N: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a).

Loica Pampeana

(*Sturnella defilippii*)

Distribución temporal: (Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Santa Fe:** (N: Wilson 1926)- **Entre Ríos:** (N: Serié y Smyth 1923)- **Buenos Aires:** (N: Withington 1888), (N: Holland 1893), (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Grant 1911), (N: Gibson 1918), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Gochfeld 1979a), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Cozzani et al. 2004), (N: Zalba et al. 2008), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (A/P: S. Salvador obs. pers.).

Loica Común

(a) (*Sturnella loyca loyca*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Mendoza:** (N: Reed 1913)- **Buenos Aires:** (N: Hartert y Venturi 1909), (N: Gochfeld 1979a), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Cozzani y Zalba 2009), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: Di Giacomo en Salvador y Bodrati 2014b), (N: col. G. Stewart en WFVZ), (N: T. Narosky in litt.), (N: M. Rumboll in litt.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Maceda et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007)- **Neuquén:** (S/D: Contreras 1977), (PP: Fraga 2002), (N y A/P: Christie et al. 2004), (N: P. Sympson en M. Rumboll in litt.)- **Río Negro:** (N: Nelson en Friedmann et al. 1977), (N y A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Lambertucci et al. 2009), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: J. Pemberton en WFVZ), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: Durnford 1877a), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (J: De Lucca y Saggese 1992), (S/D: Albrieu et al. 2004), (S/D: Imberti 2005)- **Tierra del Fuego:** (N: Reynolds en Humphrey et al. 1970).

(b) (*Sturnella loyca falklandi*)

Distribución temporal: (Ene., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Islas Malvinas:** (N: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006), (N: Otley et al. 2008).

(c) (*Sturnella loyca catamarcanus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013), (A/P: R. Fraga in litt.)- **Catamarca:** (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **San Juan:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Ortiz et al. 2003).

(d) (*Sturnella loyca obscura*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Nores e Yzurieta 1979), (N: Salvador y Salvador 1984, 1988, 2012), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (S/D: Ordano 1996), (S/D: Miatello et al. 1999), (N: Salvador y Bodrati 2011), (A/P: L. Pagano obs. pers.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993), (A/P: S. Salvador obs. pers.)

Familia **Fringillidae**

Verderón

(*Carduelis chloris chloris*)

Distribución temporal: (Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: Armani 1983), (N: Marateo en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Babarskas en Narosky y Di Giacomo 1993), (N: Maugeri 2006a)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

Cabecitanegra Picudo

(*Spinus crassirostris crassirostris*)

Distribución temporal: (Feb.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Salvador y Narosky 1983), (N: De la Peña 2005b, 2013), (N: Salvador 2015a)- **San Juan:** (S/D: Haene et al. 2001).

Cabecitanegra Común

(a) (*Spinus magellanicus magellanica*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Córdoba:** (N: Salvador et al. en prep.)- **Buenos Aires:** (N: Hudson 1870c), (N: Gibson 1880), (N: Holland 1892), (N: Smyth 1928), (N: Pereyra 1938), (N: Mason 1985), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Martínez 2001), (N: Brocca en Babarskas et al. 2003), (S/D: Bodrati et al. 2006), (S/D: Mérida y Bodrati 2006), (N: Tájer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (S/D: DECB 2011), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Salvador y Bodrati 2013a), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (N: M. Earnshaw in litt.), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **Río Negro:** (S/D: Llanos et al. 2011).

(b) (*Spinus magellanicus icterica*)

Distribución temporal: (Ene., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Bodrati et al. 2010 e in litt.)- **Corrientes:** (S/D: Fraga 2001).

(c) (*Spinus magellanicus tucumana*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: Uranga 2016), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **San Juan:** (N: Gelain 2012d)- **Tucumán:** (S/D: Caplonch 2007)- **San Luis:** (N: Masramón 1979), (N y A/P: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- **Mendoza:** (N: Contreras 1980c), (N: Mezquida 2000, 2003), (N: Mezquida y Marone 2001).

(d) (*Spinus magellanicus allenii*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (Castellanos 1934), (N: De la Peña 1987, 2013), (N: Haro y Gutiérrez 1992), (Miatello et al. 1999), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.), (N: S. Salvador y L. Salvador en prep.)- (N: S. Salvador obs. pers.).

Negrillo

(*Spinus atratus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Dic.)

Distribución territorial: **Jujuy:** (N: De la Peña 2005b, 2013)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Catamarca:** (N: A. Bodrati in litt. 2007)- **La Rioja:** (A/P: A. Bodrati in litt. 2007), (A/P: Salvador et al. en prensa)- **San Juan:** (N: A. Bodrati in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (HF: Navas y Bó 1991b).

Cabecitanegra Andino

(*Spinus uropygialis*)

Distribución temporal: (Ene.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Mendoza:** (S/D: Ferrer et al. 2011)- **Neuquén:** (A/P: Veiga 1993).

Cabecitanegra Austral

(*Spinus barbatus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Buenos Aires:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Mendoza:** (N: Astié 2003)- **Neuquén:** (A/P: Christie et al. 2004), (N: Arenas y Bianchini 2010)- **Río Negro:** (A/P: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: D. Yzurieta in litt.), (A/P: S. Salvador obs. pers.)- **Chubut:** (N: Uranga en De la Peña 2016f), (N: J. Pemberton en WFVZ)- **Santa Cruz:** (S/D: Imberti 2005), (N: R. González en M. Rumboll in litt.)- **Islas Malvinas:** (S/D: Daciuk 1975), (N: Woods 1982, 2006).

Tangará Común

(*Euphonia chlorotica serrirostris*)

Distribución temporal: (Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (N: Contino 1980), (N: Rodríguez 2012), (S/D: Moschione et al. 2013)- **Formosa:** (N: Di Giacomo 2005)- **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N y A/P: Bodrati et al. 2010)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: A. Bodrati in litt. 1998)- **Corrientes:** (S/D: Chebez et al. 1998), (S/D: Fraga 2001), (S/D: Chatellenaz et al. 2010), (N: A. Bodrati in litt. 1996), (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santa Fe:** (N: De la Peña 1996, 2005b, 2013)- **Córdoba:** (N: Heredia en Salvador et al. en prep.)- **San Luis:** (S/D: Nellar Romanella 1993).

Tangará Amarillo

(*Euphonia violacea aurantiicollis*)

Distribución temporal: (Oct., Set., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Uranga en De la Peña 2016f), (N: A. Bodrati in litt. 2012).

Tangará Cabeza Celeste

(*Euphonia cyanocephala*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Jujuy:** (S/D: Chebez et al. 1998)- **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

Tangará Alcalde

(*Euphonia pectoralis*)

Distribución temporal: (Set., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino y Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010 e in litt.), (N: Saibene in litt.).

Tangará Bonito

(*Chlorophonia cyanea cyanea*)

Distribución temporal: (Ago., Oct., Nov.)

Distribución territorial: **Misiones:** (N: Castelino y Saibene 1989), (N: Saibene 1989), (S/D: Saibene et al. 1996), (S/D: Chebez et al. 1998), (N: Bodrati et al. 2010), (N: Bodrati y Cockle 2011), (N: Cockle et al. 2016), (N: L. Pagano obs. pers.).

Familia Passeridae

Gorrión

(*Passer domesticus domesticus*)

Distribución temporal: (Ene., Feb., Ago., Set., Oct., Nov., Dic.)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013)- **Misiones:** (N: Salvador y Bodrati 2014b)- **Chaco:** (S/D: Chatellenaz 2005), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: A. Bodrati in litt. 1994, 2010) (N: S. Salvador obs. pers.)- **Santiago del Estero:** (N: S. Salvador obs. pers.)- **Tucumán:** (N: Alabarce y Antelo 1998)- **Corrientes:** (N: Wilson 1977), (S/D: Fraga 2001), (N: A. Bodrati in litt. 2006)- **Santa Fe:** (N: Burger 1976), (N: De la Peña 1987, 2005b, 2013), (N: Leiva et al. 2004), (N: Turienzo y Di Iorio 2010)- **Córdoba:** (N: Castellanos 1934), (N: Salvador 1983, 2012e), (N: Salvador y Salvador 1984), (N: Nores y Nores 1994), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Salvador y Bodrati 2013c), (S/D: Salvador y Salvador 2014), (N: Salvador et al. en prep.)- **Entre Ríos:** (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (N: Fraga en Salvador y Bodrati 2013c), (N: Di Iorio en Di Iorio et al. 2013), (N: Miquel et al. 2015)- **Mendoza:** (N: Garrido Coria et al. 2015)- **Buenos Aires:** (N: Gibson 1918), (N: Renard 1920), (N: Pereyra 1938), (N: Zapata y Cabrera 1969), (N: Mason 1985), (S/D: Klimaitis y Moschione 1987), (N: Darrieu et al. 1988), (S/D: Narosky y Di Giacomo 1993), (S/D: Maragliano y Montalti 1997), (S/D: Martínez 2001), (S/D: Bodrati et al. 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (S/D: Mérida y Bodrati 2006, N: A. Bodrati in litt. 2015), (N: Tajer et al. 2007), (S/D: Pagano y Mérida 2009), (N: Turienzo y Di Iorio 2010), (S/D: Pagano et al. 2012), (S/D: Furman y Bastías 2012), (N: Turienzo y Di Iorio en Di Iorio et al. 2013), (N: Runnacles en Segura et al. 2014), (PP: Salvador y Bodrati 2014b), (N y A/P: L. Pagano obs. pers.)- **La Pampa:** (N: Pereyra 1937a), (S/D: Maceda y Kin 2001), (S/D: Macea et al. 2001), (S/D: Bruno et al. 2007), (N: Turienzo y Di Iorio en Di Iorio et al. 2013)- **Neuquén:** (N: Christie et al. 2004)- **Río Negro:** (N: Christie et al. 2004), (S/D: Llanos et al. 2011), (N: Miquel et al. 2015)- **Santa Cruz:** (S/D: Albrieu et al. 2004)- **Tierra del Fuego:** (N: Parmelee y Mc Donald 1975), (N: M. Rumboll in litt.)- **Islas Malvinas:** (N: Woods 1982, 2006).

Gorrión Arborícola

(*Passer montanus montanus*)

Distribución temporal: (S/D)

Distribución territorial: **Salta:** (S/D: Moschione et al. 2013).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

A

- Abalo, R. y J. I. Areta. 2009. Historia natural y vocalizaciones del Doradito Limón (*Pseudocolopteryx cf. citriola*) en Argentina. *Ornit. Neotr.* 20: 215-230.
- Abril, M. 1994. Nidificación de Cormoranes sobre plataformas artificiales en Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina). *Naturalia Patagónica* 2: 93-94.
- Agnolin, F. L., Chimento, N. R., Frank, C. y R. F. Lucero. 2009. Nuevos registros de aves argentinas. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 34: 1-4.
- Agüero, M. L., García Borboroglu, J. P. y D. Esler. 2010. Nesting habitat of Chubut Steamer Ducks in Patagonia, Argentina. *Emu* 110: 302-306.
- Agüero, M. L., García Borboroglu, J. P. y D. Esler. 2012. Distribution and abundance of Chubut Steamerducks: an endemic species to Central Patagonia, Argentina. *Bird Cons. Int.* 22: 307-315.
- Agüero, M. L. y J. P. García Borboroglu. 2013. Breeding biology of the Chubut Steamerduck (*Tachyeres leucocephalus*). *Ornit. Neotr.* 24: 85-93.
- Aguerre, G., Petracci, P. F. y M. Zamorano. 2008. Confirmación de la reproducción del Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 53: 19.
- Aguilar, H. A. y E. A. Kowalinski. 1996a. Nota sobre la nidificación y la alimentación del Gavilán Mixto *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 33: 30-31.
- Aguilar, H. A. y E. A. Kowalinski. 1996b. Nidificación del Burrito Común (*Laterallus melanophaius*) en Hudson. *Nuestras Aves* 35: 33.
- Aguirre, C. A. 1995. Distribution and abundance of birds in the region of Potter Cove and Stranger Point, King George Island, South Shetlands, Antarctica. *Marine Ornith.* 23: 23-31.
- Agullán, C. 2012. E17497, *Chloephaga picta* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/17497 (acceso 20/02/2015)
- Agullán, C. 2012. E12120, *Butorides striata* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/12120 (acceso 21/02/2015)
- Agullán, C. 2012. E17630, *Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829). www.ecoregistros.org/17630 (acceso 4/03/2015)
- Agullán, C. 2012. E17654, *Thinocorus rumicivorus* (Eschscholtz, 1829). www.ecoregistros.org/17654 (acceso 4/03/2015)
- Agullán, C. 2012. E17295, *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771). www.ecoregistros.org/17295 (acceso 21/02/2015)
- Agullán, C. 2012. E17529, *Haematopus palliatus* (Temminck, 1820). www.ecoregistros.org/17529 (acceso 4/03/2015)
- Agullán, C. 2012. E12119, *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764). www.ecoregistros.org/12119 (acceso 3/11/2015)
- Agullán, C. 2013. E18931, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/18931 (acceso 20/02/2015)
- Agullán, C. 2013. E18977, *Oxyura vittata* (Philippi, 1860). www.ecoregistros.org/18977 (acceso 20/02/2015)
- Agullán, C. 2012. E17452, *Leucophaeus scoresbii* (Traill, 1823). www.ecoregistros.org/17452 (acceso 4/03/2015)
- Alabarce, E. A. 1983. Un caso eventual de parasitismo, *Embernagra platensis* y *Poospiza melanoleuca* (Aves: Emberizidae). *Act. Zool. Lilloana* 37: 179.
- Alabarce, E. A. 1987. Notas sobre la biología de algunos passeriformes del noroeste argentino. 1. *Acta Zool. Lilloana* 34: 23-27.
- Alabarce, E. y C. Antelo. 1998. Comentarios sobre una ornitocenosis nidificante en la provincia de Tucumán. *Acta Zool. Lilloana* 44: 223-229.
- Albanesi, S., Schaaf, A., Vivanco, C., Rivera L. y N. Politi. 2016. Caracterización y selección de sitios de excavación del carpintero Lomo Blanco (*Campephilus leucopogon*) en dos regiones forestales del noroeste Argentino. *Bosque* 37: 33-40.

- Albrieu, C. y J. L. Navarro. 1997. Localización y tamaño poblacional de cormoraneras en la Ría Deseado (Santa Cruz, Argentina). *Hornero* 14: 243-246.
- Albrieu, C., S. Imberti y S. Ferrari. 2004. Las aves de la Patagonia Sur. *El estuario de Río Gallegos y zonas aledañas*. Ed. U.N. de la Patagonia Austral. Río Gallegos.
- Alcantara, G. 2013. E28441, *Ardea alba* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/28441 (acceso 21/02/2015)
- Aldatz, M., F., Lahaye, M. E., López, G. C. y V. Massoni. 2005. Biología reproductiva y análisis de la morfología de huevos en función de la secuencia de puesta en el Hornero Común *Furnarius rufus*. Resúmenes, XI Reunión Argentina de Ornitología. Buenos Aires.
- Alderete, C., Heredia, A., Gonzalez, C., Barriomuevo Fleitas, D., Fernández, J. y J. Jiménez. 2014. Nuevos registros del Guaicurú (*Herpetotheres cachinnans*) para la provincia de Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 59: 50-51.
- Allende, M. 2011. E2507, *Nyctidromus albicollis* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/2507 (acceso 4/03/2015)
- Allende, M. 2014. E65319, *Celeus flavescens* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org/65319 (acceso 4/03/2015)
- Almeida, M. 2015. E131727, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/131727 (acceso 3/01/2016)
- Almeida, M. 2015. E115652, *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764). www.ecoregistros.org/115652 (acceso 23/09/2015)
- Almirón, D., Schmidtz, C., Caiafa, D. y N. Oste. 2012. Primera documentación del nido de la Paloma Montera Castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. *Nuestras Aves* 57: 9-11.
- Altamirano, C. 2015. E101995, *Himantopus mexicanus* (Müller, 1776). www.ecoregistros.org/101995 (acceso 28/09/2015)
- Altamirano, E. I., Bulfon, M. y N. Bee de Speroni. 2009. Histología del ovario y ciclo reproductivo de *Columbina picui* (Temminck, 1813) (Aves: Columbidae) en Córdoba, Argentina. *Rev. Peruana Biol.* 16: 61-66.
- Álvarez, L. M., Astié, A. A., Debandi, G. O. y E. E. Scheibler. 2014. Effect of food availability and habitat characteristics on the abundance of Torrent Ducks during the early breeding season in the central Andes, Argentina. *Wilson Jour. Ornith.* 126: 525-533.
- Américo, C. H. 2013. E27239, *Netta peposaca* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/27239 (acceso 21/02/2015)
- Andina, M. 2012. E 17195, *Anas flavirostris* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/17195 (acceso 21/02/2015)
- Andina, M. 2014. E52723, *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/52723 (acceso 19/02/2015)
- Andina, M. 2012. E17121, *Fulica ardesiaca* (Tschudi, 1843). www.ecoregistros.org/17121 (acceso 22/02/2015)
- Andina, M. 2015. E80064, *Neochen melanoptera* (Eyton, 1838). www.ecoregistros.org/80064 (acceso 20/02/2015)
- Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1995. Breeding of *Anthus furcatus* (Aves: Motacillidae) in northern Patagonia, with a review of the breeding biology of the species. *Ornit. Neotr.* 6: 37-52.
- Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1996. Breeding of *Agriornis murina* (Aves: Tyrannidae) in Patagonia, with comments on its habitat preferences and taxonomic position. *Ornit. Neotr.* 7: 109-118.
- Andors, A. V. y F. Vuilleumier. 1998. Observations on the distribution, behavior, and comparative breeding biology of *Neoxolmis rufiventris* (Aves: Tyrannidae). *Amer. Mus. Novitates* 3220: 1-32.
- Anfuso, J. y S. Elesegood. 2012. Relevamientos realizados en la Isla Palacios. Desde mayo de 1998 hasta abril 2011. Informe Preliminar. Güiraoga.
- Anfuso, J., Gil Suárez, M. V. y J. C. Chebez. 2008. Nuevo registro de nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en la provincia de Misiones, Argentina y consideraciones sobre

- su conservación. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 21: 1-13.
- Anónimo. 1933. Huevos de aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 5: 228-230.
- Anónimo. 1937. Sobre la nidificación del “ovejero”, *Machetornis rixosa*. *Hornero* 6: 524-525.
- Antoniazzi, L. R., Manzoli, D. E., Rohrmann, D., Saravia M. J., Silvestri, L. y P. M. Beldomenico. 2011. Climate variability affects the impact of parasitic flies on Argentinean forest. *J. Zoology* 283:126-134.
- Aparicio, J. 2013. E23693, *Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/23693 (acceso 21/02/2015)
- Aparicio, G., Lizzi, J., Maturo, H. y L. Antoniazzi. 2008. *La Reserva Natural El Mangrullo y su aporte para la conservación del Gran Chaco Americano*. Informe técnico de la Fundación Hábitat y Desarrollo, Santa Fe.
- Aramburú, R. H. y N. A. Bó. 1961. Descripción de colonias de nidificación (Delta del Paraná y Golfo San José, Chubut) y estudios de los estados juveniles de “*Phalacrocorax brasiliensis brasiliensis*” (Gmelin). *Rev. Mus La Plata* 7: 107-121.
- Aramburú, R. M. 1990. Observaciones sobre posturas de Pato Barcino, *Anas flavirostris*, en nidos de Cotorra Común, *Myiopsitta monachus*. *Neotrópica* 36: 101-105.
- Aramburú, R. M. 1996. Nidadas supernormales en Cotorra Común *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae). *Ornit. Neotr.* 7: 155-156.
- Aramburú, R. M. 1997. Descripción y desarrollo del pichón de la Cotorra *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre de Argentina. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 70: 53-58.
- Aramburú, R. M. 1998. Supervivencia de pichones de Cotorra Común *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre. *Ornit. Neotr.* 9: 95-98.
- Aramburú, R. M. y S. A. Calvo. 2009. Abundancia de *Caminicimex furnarii* (Cordero y Vogelsang) (Heteroptera: Cimicidae) en nidos de Golondrina Doméstica *Progne chalybea* (Gmelin) (Passeriformes: Hirundinidae). *FACENA* 35: 36.
- Aramburú, R. y M. P. Campos Soldini. 2008. Presencia de *Psitticimex uritui* (Hemiptera: Cimicidae) en nidos de caserote *Pseudoseisura lophotes* (Passeriformes: Furnariidae) en la provincia de Entre Ríos. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 67: 131-133.
- Aramburú, R. y V. Corbalán. 2000. Dieta de pichones de Cotorra *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae) en una población silvestre. *Ornit. Neotr.* 11: 241-245.
- Aramburú, R., Cicchino, A. y E. Bucher. 2002. Material vegetal fresco en cámaros de cría de la Cotorra Argentina *Myiopsitta monachus* (Psittacidae). *Ornit. Neotr.* 13: 433-436.
- Aramburú, R. M., Kuzmanich, N. y M. Liljesthröm. 2012. Abundancia de la pulga *Dasypsyllus (Avesopsylla) lasius lasius* (Rothschild) (Siphonaptera: Ceratophyllidae) en nidos de Golondrina Chilena *Tachycineta meyenii* (Cabanis) (Passeriformes: Hirundinidae) y uso de zarandas como método de obtención de insectos parásitos. *Rev. Mus. La Plata* 19: 1-6.
- Aramburú, R., Berkunsky, I., Formoso, A. y A. Cicchino. 2013. Ectoparasitic load of Blue-Crowned Parakeet (*Aratinga acuticaudata*, Psittacidae) nestlings. *Ornit. Neotr.* 24: 257-265.
- Aramburú, R., Calvo, S., Alzugaray, M. E. y A. C. Cicchino. 2003. Ectoparasitic load of Monk Parakeet (*Myiopsitta monachus*, Psittacidae) nestlings. *Ornit. Neotr.* 14: 415-418.
- Aramburú, R., Calvo, S., Carpintero, D. L. y A. C. Cicchino. 2009. Artrópodos presentes en nidos de Cotorra *Myiopsitta monachus monachus* (Aves: Psittacidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., n.s.* 11: 1-5.
- Arenas, C. y M. Bianchini. 2010. Registros de nidificación del cabecitanegra austral (*Carduelis barbata*) en la ciudad de Neuquén Capital, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 55: 1-10.
- Areta, J. I. y A. Bodrati. 2007. Historia natural y comportamiento social del Crestudo (*Coryphistera alaudina*). *Ornit. Neotr.* 18: 209-222.
- Areta, J. I. y A. Bodrati. 2008. Comportamiento, identificación y relación con la floración de

- cañas del Espiguero Negro (*Tiaris fuliginosa*) en Misiones, Argentina. *Hornero* 23: 77-86.
- Areta, J. I., Vila Moret, S., Mazar Barnett, J. y H. Casañas. 2006. Primer registro de nidificación del Picaflor Andino Castaño (*Oreotrochilus adela*) en la Argentina. *Nuestras Aves* 51: 21-23.
- Areta, J. I., Hernández, I., Prieto, J., Delhey, K. y H. Povedano. 2012. La distribución austral del Canastero Castaño (*Pseudasthenes steinbachi*). *Nuestras Aves* 57: 54-59.
- Areta, J. I., Bodrati, A., Thom, G., Rupp, A. P., Velazquez, M., Holzmann, I., Carrano, E. y C. E. Zimmermann. 2013. Natural history, distribution, and conservation of two nomadic *Sporophila* seadeaters of bamboo in the Atlantic forest. *Condor* 115: 237-252.
- Arhex, M. E., Arhex, M. I. y V. Massoni. 2005. Cuidado Parental en el Jilguero Dorado (*Sicalis flaveola*). Resúmenes, XI Reunión Argentina de Ornitología. Buenos Aires.
- Arhex, M. I. y V. Massoni. 2008. Atención al nido en el Jilguero Dorado (*Sicalis flaveola*). Resúmenes, XII Reunión Argentina de Ornitología. Neuquén.
- Arhex, M. I., Palmerio, A. y V. Massoni. 2005. Variación de la morfología de huevos con el número de puesta, la secuencia de puesta y el avance de la temporada en el Jilguero Dorado *Sicalis flaveola*. Resúmenes, XI Reunión Argentina de Ornitología. Buenos Aires.
- Ariza, M. 2012. E11341, *Melanerpes cactorum* (D'Orbigny, 1840). www.ecoregistros.org/11341 (acceso 4/03/2015)
- Armani, C. G. 1983. Le Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) nouveau Fringille sud-américain?. *L'oiseau* 53: 294-296.
- Arrighi, A. C. y J. L. Navarro. 1998. Ecología reproductiva del Cormorán Imperial (*Phalacrocorax atriceps*), en Isla Deseada (Santa Cruz, Argentina). *Hornero* 15: 64-67.
- Astié, A. A. 2003. New record of Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) parasitism in Black-chinned Siskins (*Carduelis barbata*). *Wilson Bull.* 115: 212-213.
- Astié, A. A. 2013. Lack of effects of microhabitat characteristics on nest predation and brood parasitism in the Creamy-bellied Thrush (*Turdus amaurochalinus*). *Ornit. Neotr.* 24: 311-320.
- Astie, A. y N. Luchesi. 2012. Reproductive success of the Creamy-bellied Thrush in a southern temperate zone. *Wilson Jour. Ornith.* 124: 136-141.
- Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2005. Creamy-Bellied Thrush defenses against Shiny Cowbird brood parasitism. *Condor* 107: 788-796.
- Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2006. Costs of egg punctures and parasitism by Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) at Creamy-Bellied Thrush (*Turdus amaurochalinus*) nests. *Auk* 123: 23-32.
- Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2009a. Shiny Cowbirds parasitism of low quality host: effect of host traits on a parasite's reproductive success. *J. Field Ornith.* 80: 224-233.
- Astié, A. A. y J. C. Reboreda. 2009b. Function of egg punctures by Shiny Cowbirds in parasitized and nonparasitized Creamy-bellied Thrush nest. *J. Field Ornith.* 80: 336-343.
- Attías, R. 2013. E18370, *Forpus xanthopterygius* (Taczanowski, 1883). www.ecoregistros.org/18370 (acceso 4/03/2015)
- Auer, S. K., Bassar, R. D., Fontaine, J. J. y T. E. Martin. 2007. Breeding biology of passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. *Condor* 109: 321-333.
- Azategui, A. 1975. Datos de aves de Santa Isabel (Córdoba). *Hornero* 11: 321.
- Azategui, A. 1985. Algunos datos sobre el nido del Cardenal Amarillo. *Nuestras Aves* 6: 11-12.
- B**
- Babarskas, M. y B. López Lanús. 1993. Nidos nuevos o poco conocidos para la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 28: 27-28.
- Babarskas, M., Haene, E. y J. Pereira. 2003. Aves de la Reserva Natural Otamendi. En Haene, E. y J. Pereira (Eds.) *Fauna de Otamendi. Inventario de los animales vertebrados de la Reserva Natural Otamendi*, Campana, Buenos Aires, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación 3: 47-113.
- Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires.

- Babarskas, M., Veiga, J. O. y F. C. Filiberto. 1995. *Inventario de aves del Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina.* Monografía Especial. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Babarskas, M., Veiga, J. O. y F. C. Filiberto. 1996. Nuevos registros de aves para la provincia de Neuquén. *Nuestras Aves* 34: 44-46.
- Bachmann, S. y C. A. Darrieu. 2010. Biología reproductiva del Ostrero Pardo (*Haematopus palliatus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 25:75-84.
- Badano, L. A., Scolaro, J. A. y J. A. Upton. 1982. Distribución espacial de la nidificación de *Spheniscus magellanicus* en Cabo Dos Bahías, Chubut, Argentina (Aves: Spheniscidae). *Historia Natural* 2: 241-251.
- Bahntje, N. 2014. E31434, *Chloephaga hybrida* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/31434 (acceso 20/02/2015)
- Baliño, J. J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. *Rev. Mus. Arg. Ciec. Nat.* 13: 499-511.
- Banchs, R. A. y R. M. Fraga. 1994. Supervivencia de nidos de cardenal de cresta roja (*Paroaria coronata*) en ambientes modificados del chaco argentino. *Vida Silv. Neotr.* 3: 91-95.
- Banks, R. D. y W. H. Bohl. 1968. Pentland's Tinamou in Argentina (Aves: Tinamidae). *Proc. Biol. Soc. Washington* 81: 485-490.
- Barri, F., Martella, M. y J. Navarro. 2009. Nest site habitat by Lesser Rhea (*Rhea pennata pennata*) in northwestern Patagonia, Argentina. *J. Ornith.* 150: 511-514.
- Barrios, M. y E. Frere. 2014. Parental investment in eggs and its effect on nestling growth and survival in Magellanic Penguins. *Emu* 114: 259-267.
- Barrios, M., Bulit, F. y V. Massoni. 2010. Variables que afectan el peso de los huevos en la Golondrina Ceja Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*). *Hornero* 25: 1-7.
- Barrios, M., Bulit, F. y V. Massoni. 2014. Yolk mass variation in White-Rumped Swallows (*Tachycineta leucorrhoa*). *Wilson J. Ornith.* 126: 86-93.
- Barros, R. 1930. Sobre algunas aves de la Alta Cordillera de Mendoza. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 34: 312-320.
- Barrows, W. B. 1883. Birds of the lower Uruguay. *Bull. Nutt. Orn. Club* 8: 82-94, 129-143, 198-212.
- Barrows, W. B. 1884. Birds of the lower Uruguay. *Auk* 1: 20-30, 109-113, 270-278, 313-319.
- Bazzano, G., Martella, M. B., Navarro, J., Bruera, N., y C. Corbella. 2002. Uso de hábitat por el Ñandú (*Rhea americana*) en un refugio de vida silvestre: implicancias para la conservación y manejo de la especie. *Ornit. Neot.* 13: 9-15.
- Beaudoin, F. y V. Ojeda. 2011. Nesting of Rufous-legged Owls in evergreen *Nothofagus* forests. *J. Raptor Res.* 45: 272-274.
- Belcher, C. F. 1936. Nota sobre la Agachona, *Thinocorys rumicivorus*. *Hornero* 6: 313-314.
- Belenger, C. y S. Di Martino. 1993. Nidificación del Tuquito Gris (*Empidonax aurantioatrocristatus*) en el sur de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 28: 26.
- Belenguer, C. y S. M. Zalba. 1997. Primera cita de nidificación del Jote de Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) para Buenos Aires. *Hornero* 14: 247-248.
- Belloq, M. I. 1993. Reproducción, crecimiento y mortalidad de la Lechucita Vizcachera (*Speotyto cunicularia*) en agroecosistemas pampeanos. *Hornero* 13: 272-276.
- Belloq, M. I. y F. O. Kravetz. 1993. Productividad de la Lechuza de Campanario (*Tyto alba*) en nidos artificiales en agrosistemas pampeanos. *Hornero* 13: 277-312.
- Belloq, M. I., Bonaventura, S. M., Marcelino, F. N. y M. Sabatini. 1998. Habitat use of Crowned Eagles (*Harpia haliaetus coronatus*) in the southern limits of the species' range. *J. Raptor Res.* 32: 312-314.
- Bellotti, A. 2014. E48629, *Rhea americana* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/48629 (acceso 19/02/2015)
- Bellotti, A. 2014. E56116, *Oxyura vittata* (Philippi, 1860). www.ecoregistros.org/56116 (acceso 20/02/2015)
- Bellotti, A. 2015. E75693, *Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/75693 (acceso 20/02/2015)

- Bellotti, A. 2015. E77085, *Oxyura ferruginea* (Eyton, 1838). www.ecoregistros.org/77085 (acceso 20/02/2015)
- Beltrán, J., Bertonatti, C., Johnson, A. y A. Serret. 1992. Actualizaciones sobre la distribución, biología y estado de conservación del macá tobiano (*Podiceps gallardoi*). *Hornero* 13: 193-199.
- Beltzer, A. H. 1986. *Cacicus solitarius* hospedante de *Molothrus bonariensis bonariensis* (Aves: Icteridae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 17: 215-216.
- Beltzer, A. H. 1991. Aspec of the breeding biology and the death rate of the *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 22: 35-40.
- Beltzer, A. H., Molet, U. y E. A. Mosso. 1995. Natalidad y mortalidad de la Garcita Azulada *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae) en las proximidades de la ciudad de Santa Fe, período 1989-1990, Argentina. *Rev. Ecol. Lat. Am.* 4: 11-14.
- Beltzer, A. H., Rovira, P y S. Seib. 1997. Reproducción extra temporal de la Garza Bruja *Nycticorax nycticorax* (Aves: Ardeidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 28: 157-160.
- Bennett, A. G. 1920. Breves notas sobre las aves antárticas. *Hornero* 2: 025-034.
- Bernasconi, F. 2013. E20209, *Contopus fumigatus* (D'Orbigny & Lafresnaye, 1837). www.ecoregistros.org/20209 (acceso 7/11/2015)
- Berkunsky, I. 2006. Amazon country - Argentina's "Impenetrable" Forest. *PsittaScene* 18: 3-5.
- Berkunsky, I. y J. C. Reboreda. 2009. Nest site fidelity and cavity reuse by Blue-fronted Parrots, *Amazona aestiva*, in the dry Chaco. *Ibis* 151: 145-150.
- Berkunsky, I., Formoso, A. y R. Aramburú. 2005. Ectoparasitic load of Blue-frnted Parrot (*Amazona aestiva*, Psitacidae) nestlings. *Ornit. Neotr.* 16: 573-578.
- Berkunsky, I., Ruggera, R., Aramburú, R. y J. C. Reboreda. 2012. Principales amenazas para la conservación del Loro Hablador (*Amazona aestiva*) en la región del Impenetrable, Argentina. *Hornero* 27: 39-49.
- Berkunsky, I., Kacoliris, F., Faegre, S., Ruggera, R., Carrera, J. y R. Aramburú. 2011. Nest predation by arboreal snakes on cavity-nesting birds in dry chaco woodlands. *Ornit. Neotr.* 22: 459-464.
- Bertellotti, M., Carribero, A. y P. Yorio. 1995. Aves marinas y costeras coloniales de la Península Valdés: revisión histórica y estado actual de sus poblaciones. *Informes Técnicos del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica – Fundación Patagonia Natural* 1: 1-21.
- Bertoni, A. DE W. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *Hornero* 1: 188-191.
- Bettinelli, M. D. y J. C. Chebez. 1986. Notas sobre aves de la meseta de Somuncurá, Río Negro, Argentina. *Hornero* 12: 230-234.
- Bianchini M. y C. Arenas. 2013. Nuevos registros de aves accidentales y aportes a la distribución geográfica de algunas especies de aves, para la Argentina. Parte I: No Passeriformes. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 128: 1-11.
- Biancucci, L. 1995. Una nueva especie para la avifauna cordobesa y nuevas localidades para otras seis. *Hornero* 14: 76.
- Blanco, D. 1984. Pato de collar nidificando en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 4: 6.
- Blanco, D. E. 1995. Parasitismo de cría del Tordo Renegrido *Molothrus bonariensis* sobre *Agelaius ruficapillus*, en el este de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 14: 44-45.
- Blanco, G., Yorio, P. y M. Bertellotti. 1998. Depredación diferencial y éxito de eclosión en el Gavotín Sudamericano: Valor adaptativo del color del huevo. Resúmenes, X Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires.
- Blendinger, P. 1986. Nido de Gallito de Agua. *Nuestras Aves* 9: 13.
- Blendinger, P. 1988. Registros de aves poco frecuentes en la Argentina y sector antártico argentino. *Nuestras Aves* 38: 5-8.
- Blendinger, P. G. y M. E. Alvarez. 1996. El género *Myiarchus* en la provincia de Mendoza. *Nuestras Aves* 33: 29.
- Blendinger, P., De Lucca, E. y M. Saggese. 1987. Nidificación otoño-invernal del Lechuzón Orejudo. *Nuestras Aves* 12: 19.
- Bó, M. S., Cicchino, S. y M. M. Martínez. 1993. Biología reproductiva de *Circus cinereus* y *Circus buffoni* en la Reserva Integral Laguna de los Padres, provincia de Buenos Aires. Resúmenes, VIII Reunión Argentina de

- Ornitología, VI Encuentro Argentino-Paraguayo de Ornitología.
- Bó, N. A. 1955. Observaciones sobre las razas argentinas de “*Nycticorax nycticorax*”. *Notas Mus. La Plata* 18: 43-57.
- Bó, N. A. 1956a. Observaciones morfológicas y etológicas sobre el Biguá. *Hornero* 10: 147-157.
- Bó, N. A. 1956b. Algunas observaciones sobre la nidificación del Cuaco. *Hornero* 10: 174-175.
- Bó, N. A. 1973. Observaciones sobre *Pyrocephalus rubinus rubinus* (Boddaert) (Aves, Tyrannidae). *Neotrópica* 19: 25.
- Bodrati, A. 2001. Notas sobre aves infrecuentes o poco conocidas para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 13-17.
- Bodrati, A. 2003. Predación de dendrocoláptidos sobre murciélagos, pichones y huevos de aves, y aspectos de la nidificación del Trepador Gigante (*Xiphocolaptes major*). *Nuestras Aves* 46: 45-47.
- Bodrati, A. 2004. El Curiango (*Nyctidromus albicollis*): presencia, fenología y nidificación en la provincia del Chaco, Argentina. *Nuestras Aves* 47: 34-36.
- Bodrati, A. 2005a. Notas sobre la avifauna del Parque Nacional Chaco, el Parque Provincial Pampa del Indio y otros sectores de la provincia de Chaco, Argentina. *Nuestras Aves* 49: 15-23.
- Bodrati, A. 2005b. Nuevos aportes a la distribución de algunas especies de aves Argentinas. *Nuestras Aves* 50: 30-33.
- Bodrati, A. 2006. El Fiofío Corona Dorada (*Myiopagis viridicata*) en el Chaco de Paraguay y la Argentina: distribución, abundancia e historia natura. *Nuestra Aves* 51: 23-28.
- Bodrati, A. 2007. Barra Concepción. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 310-311. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Bodrati, A. 2012a. Nido, huevos y aspectos reproductivos del Caraguatero (*Myrmorchilus strigilatus*) en el Chaco Argentino. *Nuestras Aves* 57: 23-24.
- Bodrati, A. 2012b. Informe del relevamiento de la avifauna de la reserva y Posada Puerto Bemberg, Misiones, y recomendaciones para el manejo y conservación de sus ambientes naturales. Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Bodrati, A. y J. Baigorria. 2013. El Atajacaminos Ocellado (*Nyctiphrynus ocellatus*) en Argentina: distribución abundancia y reproducción. *Nuestras Aves* 58: 75-84.
- Bodrati, A. y K. Cockle. 2006. New records of rare and threatened birds from the Atlantic forest of Misiones, Argentina. *Cotinga* 26: 20-24.
- Bodrati, A. y K. Cockle. 2007a. San Antonio. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 287-288. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Bodrati, A. y K. Cockle. 2007b. Alta cuenca del arroyo Alegría. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 290-292. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Bodrati, A. y K. L. Cockle. 2011a. Nesting of the Scalloped Woodcreeper (*Lepidocolaptes falcinellus*). *Ornit. Neotr.* 22: 195-206.
- Bodrati, A. y K. L. Cockle. 2013. Distribution, nesting, and vocalizations of the Black-banded Owl (*Ciccaba huhula albomarginata*) in Argentina. *Ornit. Neotr.* 24: 169-182.
- Bodrati, A. y H. Del Castillo. 2004. El Tataupá Listado o Mokoi Kokooé (*Crupturellus undulatus*) en las áreras protegidas del Chaco Argentino y su situación en Paraguay. *Nuestras Aves* 47: 21-23.

- Bodrati, A. y C. Ferrari. 2014. Notas sobre 36 especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de La Rioja, Argentina. *Nuestras Aves* 59: 30-42.
- Bodrati, A. y R. M. Fraga. 2010. Frequent parasitism of Golden-winged Caciques (*Cacicus chrysopterus*) by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) in the Chaco región of Argentina y Paraguay. *Rev. Bras. Ornit.* 18: 110-112.
- Bodrati, A. y A. Pietrek. 2000. Relevamiento de los recursos biológicos del Parque Provincial "Pampa del Indio" (Departamento Libertador Gral. San Martín, Chaco). Asociación Ornitológica del Plata. Informe inédito.
- Bodrati, A. y S. A. Salvador. 2013a. Nidificación de la Yerutí Colorada (*Leptotila rufaxilla reichenbachii*) en Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 58: 85-86.
- Bodrati A. y S. A. Salvador. 2013b. Aportes al conocimiento de aspectos reproductivos de la Paloma Montera Castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. *Nuestras Aves* 58: 72-75.
- Bodrati A. y S. A. Salvador. 2015. Curutié Blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*), Pijuí Corona Rojiza (*Synallaxis ruficapilla*) y Picochato Grande (*Tolmomyias sulphurescens*): hospedadores de cría del Crespín (*Tapera naevia*). *Nuestras Aves* 60: 15-18.
- Bodrati, A. y E. Sierra. 2003. Situación actual del Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*) en el norte de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 46: 41-43.
- Bodrati, A., Areta, J. I. y E. White. 2012. La avifauna de la posada y reserva Puerto Benberg, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 63-79.
- Bodrati, A., Bodrati, G. y H. Fernández. 2001. Notas sobre la avifauna del norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 17-21.
- Bodrati, A., Cockle, K. L. y F. G. Di Sallo. 2014. Nesting of the Short-tailed Antthrush (*Chamaea campanisoma*) in the Atlantic forest of Argentina. *Ornit. Neotr.* 25: 421-431.
- Bodrati, A., Mérida, E. y L. Montenegro. 2003. Nidificación del Picaflor Andino Común (*Oreothrochilus leucopleurus*) en el Parque Nacional El Leoncito, provincia de San Juan, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 26-28.
- Bodrati, A., Cockle, K. L., Salvador, S. A. y J. Klavins. 2012. Nesting of the Olivaceous Woodcreeper (*Sittasomus griseicapillus*). *Ornit. Neotr.* 23: 325-334.
- Bodrati, A., Mérida, E., Bodrati, G. y E. Sierra. 2006. Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contiguos. San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Pp.: 117-124, en: Mérida, E. y J. Athor (eds.). *Talares bonaerenses y su conservación*. Fundación de Historia Natural «Félix de Azara». Buenos Aires.
- Bodrati; A., Cockle, K. L., Di Sallo, F. G. y S. A. Salvador. 2015. Aspectos de la biología reproductiva del Picapalo Colorado (*Campylorhamphus trochilirostris*) y Picapalo Oscuro (*C. falcularius*). *Ornitología Neotropical*
- Bodrati; A., Cockle, K. L., Di Sallo, F. G., Ferreyra; C., Salvador, S. A. y M. Lammertink. 2015. Nesting and roosting of the Ochre-collared Piculet *Picumnus temminckii*, and notes on nesting of White-barred Piculet *Picumnus cirratus*. *Ornitología Neotropical*
- Bodrati, A., Cockle, K., Segovia, J. M., Roesler, I., Areta, J. I. E. Jordan. 2010. La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, provincial de Misiones, Argentina. *Cotinga* 32: 41-64.
- Boesma, P. D., Stokes, D. L. y P. M. Yorio. 1990. Reproductive variability and historical change of Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*) at Punta Tombo, Argentina. Pp: 15-43, en Davis L. S. y J. T. Darby (eds.). *Penguin biology*. Acad. Press, San Diego.
- Bohl, W. H. 1970. A study of the Crested Tinamous of Argentina. *Spec. Sc. Rep. Wildlife* 131: 1-101.
- Bolleró, V. y R. Ramírez. 2012. Relevamiento de la avifauna de la laguna El Hinojo, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Período 2009/2011. *Biológica* 15: 119-126.
- Borsellino L., 2014. Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) y del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 161: 1-11.

- Borsellino, L. 2015. Nidificación de una pareja de Caranchos (*Caracara plancus*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 60: 87-89.
- Bosso, A., Heinonen, S. y J. C. Chebez. 1988. Un nuevo hallazgo del nido del Buraja Común (*Dysithamnus mentalis*) (Passeriformes: Formicariidae). *Hornero* 13: 89.
- Boswall, J. 1973. Supplementary notes on the birds of Point Tombo, Argentina. *Bull. B.O.C.* 93: 33-36.
- Boswall, J. y D. Maclever. 1975. The Magellanic Penguin *Spheniscus magellanicus*. Pp: 271-305, en Stonehoude, B. (ed.). *The biology of penguins*. Mac Millan, Londres.
- Boswall, J. y D. Maclever. 1980. Nota sobre el Pato vapor volador (*Tachyeres patachonicus*). *Hornero* 12: 75-78.
- Boswall, J. y R. J. Prytherch. 1972. Some notes on the birds of Point Tombo, Argentina. *Bull. B.O.C.* 92: 118-129.
- Braidotti, A. 2012. E12419, *Gallinula melanops* (Vieillot, 1819). www.ecoregistros.org/12419 (acceso 22/02/2015)
- Braidotti, A. 2014. E72428, *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/72428 (acceso 19/02/2015)
- Braslavsky, O., Bodrati, A., Cockle, C., y M. A. Schaller. 2005. Nueva información sobre el Ipequí (*Heliornis fulica*) en la provincia del Chaco, Argentina. *Nuestras Aves* 50: 28-30.
- Brewer, G. L. 1997. Display and breeding behaviour of the Chiloe Wigeon *Anas sibilatrix*. *Wildfowl* 47: 97-125.
- Brunetti, A., Mouchard, A., Coulon, C. y E. Haene. 1991. El Anambé Verdoso (*Pachyramphus viridis*) en el sur de Entre Ríos. *Nuestras Aves* 25: 27-28.
- Bruning, D. F. 1973. The Greater Rhea chick and egg delivery route. *Natural History* 82: 68-75.
- Bruning, D. F. 1974. Social structure and reproductive behavior in the Greater Rhea. *Living Bird* 13: 251-294.
- Bruno, F., Acevedo, D., Maceda, J. J. y M. I. Mero. 2007. *Reserva Natural Municipal Chadilauquen*. Aves. Fund. Hist. Nat. F. de Azara.
- Bruno, G. y M. Nores. 2001. Distribución y situación actual del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonicus*) en la Provincia de Córdoba, Argentina. Resúmenes, IX Congreso Brasilerio de Ornitología.
- Bucher, E. H. 1992. Population and conservation status of Flamingos in Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. *Colonial Waterbirds* 15: 179-184.
- Bucher E. H. 2006. Flamencos. En: Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (ed. Bucher E. H.), pp. 251-261. Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina).
- Bucher, E. H. y E. Curto. 2012. Influence of long-term climatic changes on breeding of the Chilean flamingo in Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. *Hydrobiologia* 697: 127-137.
- Bucher, E. H. y I. E. Di Tada. 1975. Determinación de la edad en pichones de la Paloma Torcaza (*Zenaida auriculata chrysachenia*). *Physis* 34: 83-89.
- Bucher, E. H. y M. Nores. 1973. Alimentación de pichones de la paloma *Zenaida auriculata*. *Hornero* 11: 209-216.
- Bucher, E. H. y A. Orueta. 1977. Ecología de la reproducción de la Paloma *Zenaida auriculata*. II. Época de cría, suceso y productividad de las colonias de nidificación en Córdoba. *Ecosur* 4: 157-185.
- Bucher, E. H. y S. Rinaldi. 1986. Distribución y situación actual del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en la Argentina. *Vida Silv. Neotr.* 1: 55-61.
- Bucher, E. H., Bertín, M. A. y A. B. Santamaría. 1987. Reproduction and molt in the Burrowing Parrot. *Wilson Bull.* 99: 107-109.
- Bucher, E. H., Chani, J. M. y A. L. Echevarria. 2000. Andean Flamingos breeding at Laguna Brava, La Rioja, Argentina. *Waterbirds* 23 (Spec. Publ. 1): 119-120.
- Bucher, E. H., Echevarria, A. L., Juri, M. D. y J. M. Chani. 2000. Long-term survey of Chilean Flamingo breeding colonies on Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. *Waterbirds* 23 (Spec. Publ. 1): 114-118.
- Bucher, E. H., Gómez, E., Di Tada, I. E. y G. J. Reati. 1977. Ecología de la reproducción de la paloma *Zenaida auriculata*. I. Variación estacionales en peso corporal, gónadas, reserva de lípidos y muda. *Ecosur* 4: 47-67.

- Budin, E. 1918. El "Keu" *Tinamotis pentlandii* Vigors. *Hornero* 1: 101-103.
- Budin, E. 1931. Lista y notas sobre aves del N.O. argentino (prov. de Jujuy). *Hornero* 4: 401-411.
- Bulit, F. y V. Massoni. 2004. Arquitectura de los nidos de la Golondrina Blanca (*Tachycineta leucorrhoa*) construidos en cajas nidos. *Hornero* 19: 69-76.
- Bulit, F., Palmeiro, A. G. y V. Massoni. 2008. Differences in rates of nest-visitation and removal of faecal sacs by male and female White-rumped Swallows. *Emu* 108: 181-185.
- Bump, G. y J. Bump. 1969. A study of the Spotted Tinamous and the Pale Spotted Tinamous of Argentina. *Spec. Sc. Rep. Wildlife* 120: 1-160. Washington, USA.
- Burger, J. 1974a. Breeding biology and ecology of the Brown-Hooded Gull in Argentina. *Auk* 91: 601-613.
- Burger, J. 1974b. Determinants of colony and nest-site selection in the Silver Grebe (*Podiceps occipitalis*) and Rolland's Grebe (*Rollandia rolland*). *Condor* 76: 301-306.
- Burger, J. 1976. House Sparrows usurp Hornero nests in Argentina. *Wilson Bull.* 88: 357-358.
- Burger, J. 1979. El canto a duo del Hornero (*Furnarius rufus*). *Hornero* 12: 17-21.
- Burger, J. y L. M. Miller. 1977. Colony and nest site selection in White-Faced and Glossy Ibises. *Auk* 94: 664-676.
- Bustamante, W. 2014. E65713, *Podiceps major* (Boddaert, 1783).
www.ecoregistros.org/65713 (acceso 19/02/2015)
- Bustamante, W. 2014. E47426, *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766).
www.ecoregistros.org/47426 (acceso 20/02/2015)
- Buteler, R. 2012. E17516, *Dryocopus schulzi* (Cabanis, 1883).
www.ecoregistros.org/17516 (acceso 4/03/2015)
- C**
- Cabrera, N. A. 2015. E77350, *Oxyura vittata* (Philippi, 1860).
www.ecoregistros.org/77350 (acceso 20/02/2015)
- Cadena, C. D., Córdoba Córdoba, S., Lodoño, G. A., Calderón-F., D., Martin, T. E. y M. P. Baptiste. 2007. Nesting and singing behavior of Common Bush-Tanagers (*Chlorospingus ophthalmicus*) in south America. *Ornitología Colombiana* 5: 54-63.
- Cali, R. y R. Güller. 2006. Nidificación y descripción del juvenil del Cachudito Pico Amarillo (*Anairetes flavirostris*) en la Reserva Provincial Divisadero Largo, Provincia de Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 52: 10-11.
- Calvelo, S., Trejo, A. y V. Ojeda. 2006. Botanical composition and structure of hummingbird nests in different habitats from northwestern Patagonia (Argentina). *J. Nat. Hist.* 40: 589-603.
- Camperi, A. R. 1992. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Neotrópica* 38: 127-140.
- Capdevielle, L., Asensio, H. O., Encabo, M. y R. Rodríguez. 2011. Registro de presencia, nidificación y dieta del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en la Reserva de Biósfera de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. Resúmenes, XIV Reunión Argentina de Ornitología, Formosa.
- Capdevielle, A. E., Encabo, M., Albisu, J. A. y M. Harteneck. 2015. Primera descripción de dieta en época reproductiva de Águila Coronada *Harpyhaliaetus coronatus* en la región del Chaco Serrano. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Capllonch, P. 1997. La avifauna de los bosques de transición del noroeste de Argentina. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Tucumán.
- Capllonch, P. 2007. *Aves de Tafí del Valle, Tucumán, Argentina*. Tucumán.
- Capllonch, P. 2007. Migraciones de especies Tyrannidae de la Argentina: Parte 1. *Acta Zool. Lillioiana* 51: 151-160.
- Capllonch, P. y R. Lobo Allende. 2013. Distribución de la Martineta Chaqueña (*Eudromia formosa formosa*) en la región chaqueña de la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 113: 1-13.
- Capllonch, P. y O. Quiroga. 2013. Comentarios sobre la biología del Tero Serrano (*Vanellus resplendens*) en el noreste de la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 121: 1-5.

- Caplonch, P., Ortiz, D. y I. Ferro. 2011. Notas sobre la avifauna de las Cumbres Calchaquíes, Tucumán, Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 55: 50-63.
- Caplonch, P., Soria, K. y D. Ortiz. 2011. Un ejemplo de migración altitudinal: el Arañero Corona Rojiza *Myioborus brunniceps* (Aves: Parulidae) en las Yungas Australes. *Kempffiana* 7: 3-18.
- Caplonch, P., Ortiz, D., Núñez Montellano, M. G. y P. G. Blendinger. 2014. Aportes sobre la distribución, comportamiento y biología del cerquero amarillo, *Atlapetes citrinellus* (Aves: Emberizidae). *Acta Zool. Lilloana* 58: 222-240.
- Caplonch P., Soria, K., Alderete, C., Aveldaño, S., Barbosa, E., Mamaní, J. C. y T. Moreno Then. 2014. Primer registro de la migración de la viudita chica (*Knipolegus hudsoni*) en la provincia de Tucumán, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 149: 1-3.
- Caplonch, P., Alderete, C. A., Aráoz, R., Barboza, E., Mamaní, J. C., Ortiz, D., Pérez Bogado, W. E., Quiroga, O. B. y K. Soria. 2015. Observaciones y capturas de aves poco conocidas en el norte de Argentina. *Nuestras Aves* 60: 76-82.
- Capovilla, P. 2014. E71325, *Melanerpes cactorum* (D'Orbigny, 1840). www.ecoregistros.org/71325 (acceso 4/03/2015)
- Capurro, A., Frere, E., Gandini, M., Gandini, P., Holik, T., Lichtschein, V. y P. Dee Boersma. 1988. Nest density and population size of Magellanic Penguins (*Spheniscus magellanicus*) at Cabo Dos Bahias, Argentina. *Auk* 105: 585-588.
- Carballo, M. 2015. E111030, *Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/111030 (acceso 4/09/2015)
- Carcelles, A. 1931. Notas sobre algunas aves de la isla de Sud Georgia. *Hornero* 4: 398-401.
- Cardoni, D. A., Isacch, J. P. y O. Iribarne. 2012. Effects of cattle grazing and fire on the abundance, habitat selection, and nesting success of the Bay-Capped Wren-Spinetail (*Spartonoica maluroides*) in coastal saltmarshes of the Pampas region. *Condor* 114: 803-811.
- Cardoni, D. A., Isacch, J. P. y A. Baladrón. 2015a. Variación en la arquitectura y tamaño del nido del Espartillero Enano *Spartonoica maluroides* asociada a la vegetación, y su relación con el éxito reproductivo. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Cardoni, D. A., Pretelli, M. G., Isacch J. P., Madrid, E. ejandro y N. Chiaradia. 2015b. Modo de cuidado parental y dimorfismo sexual en el Doradito Común *Pseudocolopteryx flaviventris* reproduciendo en pastizales. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Carman, R. L. 1971. En torno a la Paloma Picazuro y su postura. *Hornero* 11: 126-127.
- Carman, R. L. 1973. *De la fauna bonaerense*. Talleres Gráficos Didot, Buenos Aires.
- Carman, R. L. 1979. Fase juvenil overa de *Zenaida auriculata*. *Hornero* 12: 39-40.
- Carman, R. L. 1989. Nidos de Chingolo en altura. *Nuestras Aves* 18: 11-12.
- Carpintero, D. L. y R. M. Aramburú. 2007. Presencia de *Caminiicimex furnarii* (Hemiptera: Cicadidae) en nidos de golondrina (Passeriformes: Hirundinidae) en Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 66: 153-156.
- Carrera, J. D., Fernández, F., Kacoliris, F. P., Pagano, L. y I. Berkunsky. 2008. Field notes on the breeding biology and diet of Ferruginoeus Pygmy-owl (*Glaucidium brasiliandum*) in the dry Chaco of Argentina. *Ornit. Neotr.* 19: 315-319.
- Carribero, A., Perez, D. y P. Yorio. 1995. Actualización del estado poblacional del Pingüino Patagónico *Sphenicus magellanicus* en Península Valdés, Chubut, Argentina. *Hornero* 14: 33-37.
- Carrizo, M. y K. Delhey. 2008. Observations on a nest of the Bearded Tachuri (*Polystictus pectoralis*). *Ornit. Neotr.* 19: 157-160.
- Casas, A. E. 1992. Nidificación simpática de los patos zambullidores *Oxyura ferruginea* y *O. vittata* en la Argentina. *Nuestras Aves* 27: 33.
- Carro, M. E. y G. J. Fernández. 2013. Can nest predation explain the lack of defenses against cowbird brood parasitism in the Rufous-collared Sparrow (*Zonotrichia capensis*)?. *Auk* 130: 408-416.
- Carro, M. E., Lacoretz, M. V. y T. H. Acosta. 2014. El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

- en General Lavalle, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 59: 29-30.
- Carrillo, S. M. 2014. E72882, *Neochen melanoptera* (Eyton, 1838). www.ecoregistros.org/72882 (acceso 20/02/2015)
- Carus, D. 2014. E45959, *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org/45959 (acceso 19/02/2015)
- Carus, D. 2014. E70040, *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org/70040 (acceso 4/03/2015)
- Casal, P. S. 1950. A Avutarda de Mar *Chloephaga hibrida hibrida* (Molina). *Hornero* 9: 167-174.
- Casañas, H. 2007. Sistema del Uritorco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 137-138. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Casares, J. 1934. Palmípedos Argentinos. *Hornero* 5: 289-306.
- Casares, J. 1935. Palmípedos Argentinos. *Hornero* 6: 1-21.
- Casares, J. 1940. Palmípedos Argentinos. *Hornero* 7: 402-411.
- Casares, J. 1944. Aves de Estanzuela. San Luis. *Hornero* 8: 379-463.
- Casas, A. E. 1992a. Nidificación simpátrica de los patos zambullidores *Oxyura ferruginea* y *O. vittata* en la Argentina. *Nuestras Aves* 27: 33.
- Casas, A. E. 1992b. La avifauna de las lagunas Cari Laufquen Chica y Cari Laufquen Grande, departamento 25 de Mayo, Río Negro. *Hornero* 13: 248-252.
- Casas, A. E. y M. R. de la Peña. 1994. Acerca de la variación en los hábitos de nidificación de las subespecies de *Diuca diuca* (Aves: Emberizidae). *Nótulas Faunísticas* 57: 1-4.
- Casas, A. E., García, A. T. y M. R. de la Peña. 1990. Contribución al conocimiento del nido de *Ochthoeca paryrostris*. *Hornero* 13: 159-160.
- Casaux, R. y E. Barrera Oro. 1993. The diet of the Blue-eyed Shag, *Phalacrocorax atriceps bransfieldensis* in the Bransfield Strait. *Antarctic Science* 5: 335-338.
- Casaux, R., Baroni, A. y E. Barrera Oro. 2002. Fish in the diet of the Antarctic Shag at four colonies on the Danco Coast, Antarctic Peninsula. *Antarctic Science* 14: 32-36.
- Castelino, M. A. 1985. El nido del Tangara de Antifaz *Pipraidea melanonota* (Vieillot) (Aves, Thraupidae). *Historia Natural* 5: 179-180.
- Castelino M. A. 1990. Un ave nueva para la República Argentina y segunda mención para otra. *Nótulas Faunísticas* 21: 1-2.
- Castelino, M. A. y C. A. Saibene. 1989. Nidificación de aves en Misiones. *Nuestras Aves* 20: 7-9.
- Castellanos, A. 1926. Nidos de Horneros (*Furnarius rufus*). *Hornero* 3: 409-411.
- Castellanos, A. 1927. Observaciones Ornitológicas. *Hornero* 4: 74-75.
- Castellanos, A. 1931. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 4: 361-391.
- Castellanos, A. 1932. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5: 1-40.
- Castellanos, A. 1933. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5: 159-174.
- Castellanos, A. 1934. Aves del Valle de los Reartes (Córdoba). *Hornero* 5: 307-338.
- Castellanos, A. 1935. Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. *Hornero* 6: 22-37.
- Castellanos, A. 1937. Observaciones de algunas aves de Tierra del Fuego e Isla de los Estados. *Hornero* 6: 382-394.
- Castillón, L. 1918. Habitat de la «Avutarda» *Chloephaga melanoptera* Eyton. *Hornero* 1: 108-110.
- Catry, P., Silva, M. C., MacKay, S., Campos, A., Masello, J., Quillfeldt, P. y I. J. Strange. 2007. Can thin-billed prions *Pachyptila belcheri* breed successfully on an island with introduced rats, mice and cats? The case of New Island, Falkland Islands. *Polar Biol.* 30: 391-394.
- Caziani, S. M. y J. J. Protomastro. 1991. Nest and eggs of the Stripe-backed Antibird (*Myrmochilus strigilatus*). *Condor* 93: 445-446.
- Caziani, S. M. y J. J. Protomastro. 1994. Diet of the Chaco Chachalaca. *Wilson Bull.* 106: 640-648.
- Caziani, S. M., Rocha, O., Rodríguez Ramírez, E., Romano, M., Derlindati, E. J., Tálamo

- A., Ricalde, D., Quiroga, C., Contreras, J. P., Valqui, M. y H. Sosa. 2007. Seasonal distribution, abundance, and nesting of Puna, Andean, and Chilean Flamingos. *Condor* 109: 276-287.
- Cejas, W. E. 2003. Registros de nidificación de Pato cutirí (*Amazonetta brasiliensis*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 46: 43-44.
- Cervio, M. 2015. E126453, *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824). www.ecoregistros.org/126453 (acceso 19/12/2015)
- Césari, C. y P. D. Alonso. 1975. Presencia en el delta bonaerense de la Pava de monte común. *Hornero* 11: 307-308.
- Chani, J. M., Juri, M. D. y A. L. Echevarria. 2002. Registros del Carpinterito Ocellado (*Picumnus dorbignyanus*) y el Pepitero Colorado (*Saltator rufiventris*) en la Finca San Andrés, Oran, Salta (Argentina). *Nuestras Aves* 43: 13.
- Chatellenaz, M. L. 2004. Avifauna del bosque de quebracho y urunday del noreste de Corrientes, Argentina. *FACENA* 20: 3-12.
- Chatellenaz, M. L. 2005. Aves del Valle del Río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina: Riqueza, Historia Natural y Conservación. En F. G. Aceñolaza (ed.) Temas de la Biodiversidad del Litoral fluvial argentino II. *INSUGE, Miscelánea* 14: 527-550.
- Chatellenaz, M. L. 2008. Avifauna del Centro-Este de la provincia de Formosa, Argentina. Pp: 387-406. En Aceñolaza, F. G. *Temas de la Biodiversidad del Litoral III*. Insugeo, *Miscelánea* 17.
- Chatellenaz, M. L. 2015. Cooperative hunting by a pair of Plumbeous Kites (*Ictinea plumbea*). *Ornit. Neotr.* 26: 109-112.
- Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro. 2000. Materiales vegetales y fúngicos en nidos de aves del noreste argentino y Paraguay. *FACENA* 16: 103-119.
- Chatellenaz, M. L. y L. I. Ferraro. 2007. Nidos de *Parula pitiayumi* (Aves, Parulidae) en masas de *Usnea* y *Ramalia*: sostén estructural o defensa contra parásitos?. *Kurtziana* 2: 49-54.
- Chatellenaz, M. L., Cano, P., Saibene, C. y H. A. Ball. 2010. Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (provincia de Corrientes, Argentina). *Acta Zool. Lilloana* 54: 139-160.
- Chazarreta, M. L., Ojeda, V. S. y A. Trejo. 2011. Division of labour in parental care in the Magellanic Woodpecker *Campephilus magellanicus*. *J. Ornith.* 152: 231-242.
- Chebez, J. C. 1990a. Los manuscritos de William Henry Partridge. *Nuestras Aves* 22: 20-24.
- Chebez, J. C. 1990b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (II). *Nuestras Aves* 23: 21-24.
- Chebez, J. C. 1991. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (III). *Nuestras Aves* 24: 8-10.
- Chebez, J. C. 1992. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (V). *Nuestras Aves* 26: 14-15.
- Chebez, J. C. 1992b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (V). *Nuestras Aves* 27: 9-14.
- Chebez, J. C. 1993. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (VIII). *Nuestras Aves* 29: 20-22.
- Chebez, J. C. 1995a. Nuevos datos sobre *Dryocopus galeatus* (Piciformes: Picidae) en Argentina. *Hornero* 14: 54-57.
- Chebez, J. C. 1995b. Los manuscritos de W. H. Partridge: Aves de Misiones IX. *Nuestras Aves* 32: 17-18.
- Chebez, J. C. 1997a. Los manuscritos inéditos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (X). *Nuestras Aves* 37: 8-10.
- Chebez, J. C. 1997b. Los manuscritos de William Henry Partridge. Aves Misioneras (XI). *Nuestras Aves* 37: 8-10.
- Chebez, J. C. 2009. *Otros que se van*. Editorial Albatros. 552 pp.
- Chebez, J. C. y D. Gómez. 1988. Notas zoogeográficas sobre las aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 13: 75-78.
- Chebez, J. C., Heinonen, S. y A. Bosso. 1988. Nidificación del Atajacaminos Oscuro (*Caprimulgus sericocaudatus*) en Misiones, Argentina. *Hornero* 13: 90-91.
- Chebez, J. C., Silva Croome, M. Serret, A. y A. Taborda. 1990. La nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. *Hornero* 13: 155-160.
- Chebez, J. C., Rey, N., Barbaskas, M. y A. Di Giacomo. 1998. *Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. Editorial L.O.L.A.
- Chebez, J. C., Bertonatti, C., Johnson, A., Heinonen Fortabat, S. y G. Gil. 1988. Notas

- sobre la distribución de algunas aves santacrucenses. *APRONA* 8: 14-27.
- Chiarradia, N. M., Cardoni, D. A., Pretelli, M. G. y J. P. Isacch. 2015. Biología reproductiva y selección del sitio de nidificación del Junquero (*Phleocryptes melanops*) en humedales del sudeste de la región Pampeana. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitológia, La Plata, Buenos Aires.
- Chimento, N. 2013. E19019, *Lophonetta specularioides* (King, 1828). www.ecoregistros.org/19019 (acceso 21/02/2015)
- Chimento, N. 2013. E18949, *Podiceps occipitalis* (Garnot, 1826). www.ecoregistros.org/18949 (acceso 19/02/2015)
- Chimento, N. 2014. E66498, *Eudromia elegans* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832). www.ecoregistros.org/66498 (acceso 19/02/2015)
- Chimento, N. 2015. Nuevos registros de Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) y comentarios sobre su nidificación. *Nuestras Aves* 60: 67-69.
- Chimento, N. R., Agnolin, F. L., Lucero, R. F. y R. Obredor. 2009. Nidificación del carpintero del cardón (*Melanerpes cactorum*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 37: 1-3.
- Chiurla, E. H. 1999. Nidificación del Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 39: 6.
- Chiurla, E. H. 2012. Presencia y nidificación del Chiricote (*Aramides cajanea*) en la costa atlántica bonaerense. *Nuestras Aves* 57: 59-62.
- Christie, M. I., Ramilo, E. J. y M. D. Bettinelli. 2004. Aves del Noroeste Patagónico. Atlas y Guía. Ed. L.O.L.A., Buenos Aires.
- Clark, R. R. 1984. Notas sobre aves de Península Mitre, Isla Grande de Tierra del Fuego, Argentina. *Hornero* 12: 212-218.
- Clark, R. R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de Campo. Editorial L.O.L.A.
- Clarke, A., Croxall, J. P., Poncet, S., Martin, A. R. y R. Burton. 2012. Important bird areas: South Georgia. *British Birds* 105: 118-144.
- Cobos, V. y R. Miatello. 2001. Descripción del nido, huevo y pichón de la Monjita Salinera (*Neoxolmis salinarum*). *Hornero* 16: 47-48.
- Cobos, V., Miatello, R. y J. Baldo. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina. II. *Nuestras Aves* 39: 7-11.
- Cockle, K. 2010. Interspecific Cavity-sharing Between a Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*) and Two White-eyed Parakeets (*Aratinga leucophthalmus*). *Wilson J. Ornith.* 122: 803-806.
- Cockle, K. y A. Bodrati. 2007. Reserva Privada Yaguaroundi. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 297-298. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Cockle, K. y A. Bodrati. 2009. Nesting of the Planalto Woodcreeper (*Dendrocolaptes platyrostris*). *Wilson J. Ornith.* 121: 789-795.
- Cockle, K. L. y A. Bodrati. 2011. Vinaceous Parrot (*Amazona vinacea*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, ed.). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=199736
- Cockle, K. L. y A. Bodrati. 2013. Nesting of the White-throated Woodcreeper *Xiphocolaptes albicollis*. *Wilson J. Ornith.* 125: 782-789.
- Cockle, K., Martin, K., y K. Wiebe. 2008. Availability of cavities for nesting birds in the Atlantic forest, Argentina. *Ornit. Neotr.* 19 (Suppl.): 269-278.
- Cockle, K., Martin, K. y K. Wiebe. 2011. Selection of nest trees by cavity-nesting birds in the Neotropical Atlantic forest. *Biotropica* 43: 228-236.
- Cockle, K., Martin, K. y G. Robledo. 2012. Linking fungi, trees, and hole-using birds in a Neotropical tree-cavity network: Pathways of cavity production and implications for conservation. *Forest Ecol. Manag.* 264: 210-219.
- Cockle, K., Bodrati, A., Lammertink, M. y K. Martin. 2015. Cavity characteristics, but not

- habitat, influence nest survival of cavity-nesting birds along a gradient of human impact in the subtropical Atlantic Forest. *Biological Conservation* 184: 193-200.
- Cockle, K., Maders, C., Di Santo, G. y A. Bodrati. 2008. The Black-capped Piprites (*Piprites pileata*) builds a spherical moss nest. *Cotinga* 29: 166-168.
- Cockle, K. L., Bodrati, A., Lammertink, M., Bonaparte, B. B., Ferreyra, C. y F. Di Sallo. 2016. Predators of bird nests in the Atlantic Forest of Argentina y Paraguay. *Wilson Jour. Ornith.* 128: 120-131.
- Cockle, K., Capuzzi, G., Bodrati, A., Clay, R., Castillo, H., Velazquez, M., Areta, J. I., Fariña, N. y R. Fariña. 2007. Distribution, abundante and conservation of the Vinaceous Amazon (*Amazona vinacea*) in Argentina y Paraguay. *J. Field Ornith.* 78: 21-39.
- Coconier, E. 2006. *Reporte Final Aves Acuáticas en Argentina*. Aves Argentina, Wetlands International.
- Coconier, E. G., Lopez Lanús, B., Roesler, I., Moschione, F., Pearman, M., Blendinger, P., Bodrati, A., Monteleone, D., Casañas, H., Pugnali, G. y M. E. Álarcerz. 2007. Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco. Pp. 32-103, en Coconier, E. G. (ed.). *Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Nat. y Cons. Nº 6. Nuestras Aves A.O.P.
- Codesido, M., Miñarro, F. y P. Prelasco. 2013. Inventario focal de las aves de las estancias La Gloria y El Raigón: sitio piloto Samborombón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. pp. 228-242 , en Marino, G. D., Miñarro, F., Zaccagnini, M. E. y B. López-Lanús (eds.). Pastizales y sabanas del cono sur de Sudamérica: iniciativas para su conservación en la Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas Nº 9. Aves Argentinas/AOP, Fundación Vida Silvestre Argentina e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires, Argentina.
- Colina, U. 2010. Descripción de la etología reproductiva y nidificación del pato de torrente (*Merganetta armata berlepschi*) en el noroeste argentino. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 54: 1-6.
- Colina, U. 2011. Primer registro de nidificación del chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*) en el noroeste argentino. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 70: 1-5.
- Colina, U. 2010. Descripción de la etología reproductiva y nidificación del Pato de torrente (*Merganetta armata berlepschi*) en el noroeste argentino. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 54: 1-6.
- Comparatore, V. M., Martínez, M. M., Vassallo, A. I., Barg, M. y J. P. Isacch. 1996. Abundancias y relaciones con el hábitat de aves y mamíferos en pastizales de *Paspalum quadrifarium* (Paja Colorada) manejados con fuego (provincia de Buenos Aires, Argentina). *Interciencia* 21: 228-237.
- Contino, F. 1965. Una nueva Gallareta para la avifauna argentina. *Hornero* 10: 282-283.
- Contino, F. 1968. Observations on the nesting of *Sporophila obscura* in association whit wasps. *Auk* 85: 137-138.
- Contino, F. 1975. Observaciones sobre la conducta de *Sappho sparganura* en el Cerro de Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. *Hornero* 11: 265-270.
- Contino, F. 1980. *Aves del noroeste argentino*. Univ. Nac. Salta, Salta.
- Contreras, J. R. 1977. La avifauna del Valle del río Collón Cura, provincia del Neuquén. *IDIA. Suplemento* 34: 250-270.
- Contreras, J. R. 1978a. Ecología de la avifauna de la región de Puerto Lobos, provincia de Río Negro y del Chubut. *Ecosur* 5: 161-181.
- Contreras, J. R. 1978b. Biota Centro-Andina. VII. Comentarios acerca de las razas del Picaflor Gigante *Patagonas gigas*, en la provincia de Mendoza y San Juan (Aves: Trochilidae). *Neotrópica* 24: 47-49.
- Contreras, J. R. 1979a. Furnariidae Argentinos. III. Nuevos datos sobre la distribución y la biología de *Geositta cunicularia hellmayri* Peters. *Neotrópica* 24: 167-171.
- Contreras, J. R. 1979b. Una nueva súespecie de Furnariidae *Tripophaga modesta navasi* (Aves, Passeriformes). *Historia Natura* 1: 3-16.
- Contreras, J. R. 1980a. Avifauna Mendocina. IV. *Gallinago paraguaiae magellanica* (King) (Aves: Scolopacidae). *Historia Natural* 1: 91-92.
- Contreras, J. R. 1980b. Furnariidae Argentinos. VI. *Tripophaga patagonica* (D'Orbigny, 1839). *Historia Natural* 1: 101-108.

- Contreras, J. R. 1980c. New data on Shiny Cowbird parasitism (*Molothrus bonariensis bonariensis*: Aves, Icteridae). *Historia Natural* 1: 151-152.
- Contreras, J. R. 1987. Acerca de la biología reproductiva del Picaflor Verde Común *Chlorostilbon aureoventris lucidus* (Shaw, 1811) (Aves, Trochilidae). *Historia Natural* 7: 31-32.
- Contreras, J. R. 1988a. Datos reproductivos de 45 especies de Passeriformes que anidan en el valle aluvial del Riachuelo, noreste de Corrientes, Argentina. Pp. 27-29 (en *Ornit. Argentina-Paraguay*, J. R. Contreras, Ed.).
- Contreras, J. R. 1988b. Acerca de la biología reproductiva del Burrito Silbón, *Laterallus melanophaius* (Aves, Rallidae). *Nótulas Faunísticas* 9: 1-2.
- Contreras, J. R. y V. G. Roig. 1976. Biota Centro-Andina. V. Nuevos datos de la nidación de *Mimus patagonicus* (Aves, Mimidae). *Neotrópica* 22: 103-104.
- Contreras, J. R., Agnolin, F., Davies, Y. E., Godoy, I., Giacchino, A. y E. E. Ríos. 2014. *Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. I. No Passeriformes*. Fundación de Historia Natural Felix De Azara. Buenos Aires.
- Copello, S. y F. Quintana. 2009. Breeding biology of the Southern Giant Petrel (*Macronectes giganteus*) in Patagonia, Argentina. *Ornit. Neotr.* 20: 369-380.
- Corelli, A., Brandolín, P. y M. Ávalos. 2009. Categorización del nido de *Agelaius ruficapillus* en dos sitios de la zona periurbana de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitología, Tucumán.
- Coria, N. R. y D. Montalti. 1993. Flying birds at Esperanza Bay, Antarctica. *Polish Polar Res.* 14: 433-439.
- Coria, N. R. y D. Montalti. 2000. A newly discovered breeding colony of Emperador Penguins *Aptenodytes forsteri*. *Marine Ornithology* 28: 119-120.
- Coria, N. R., Blendinger, P. y D. Montalti. 1996. The breeding birds of Cape Geddes, Laurie Island, South Orkney Islands, Antarctica. *Marine Ornith.* 24: 43-44.
- Coria, N. R., Montalti, D., Rombola, E.F., Santos, M. M., García Betoño, M. I. y M. A. Juarez. 2011. Birds at Laurie Island, South Orkney Islands, Antarctica: breeding species and their distribution. *Marine Ornithology* 39: 207-213.
- Coria, O. R., Gómez, N., Heredia, J., Quiroga, O., Carrizo, D. A., Ruiz, P., Herrera, M. y L. M. Rojas. 2013. Nuevos aportes sobre la avifauna de la provincia de Santiago del Estero. *Nuestras Aves* 58: 68-72.
- Cornell, F. 2003. Nidificación de dos tiránidos en la provincia de Jujuy, Argentina. *Nuestras Aves* 46: 35-36.
- Cossa, N., Roesler, I., Fasaola, L. y J. C. Reboreda. 2013. Abundancia e historia natural del Cauquén Común *Chloephaga picta* en el oeste de Santa Cruz, Argentina. Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Costa, M. 2011. E4031, *Merganetta armata* (Gould, 1842). www.ecoregistros.org/4031 (acceso 21/02/2015)
- Costa, M. 2012. E13469, *Strix rufipes* (Cherrie & Reichenberger, 1921). www.ecoregistros.org/13469 (acceso 4/03/2015)
- Costa, M. 2014. E71181, *Tachyeres patachonicus* (King, 1828). www.ecoregistros.org/71181 (acceso 21/02/2015)
- Costa, M. 2014. E71146, *Tachyeres leucocephalus* (Humphrey & Thompson, 1981). www.ecoregistros.org/71146 (acceso 21/02/2015)
- Couri, M. S., Rabuffetti, F. L. y J. C. Reboreda. 2005. New data on *Philornis seguyi* Garcia (1952) (Diptera, Muscidae). *Brazilian Journal of Biology* 65:631-637.
- Cozzani, N. y S. M. Zalba. 2009. Estructura de la vegetación y selección de hábitats reproductivos en aves del pastizal pampeano. *Ecología Austral* 19: 35-44.
- Cozzani, N. C., Sanchez, R. y S. M. Zalba. 2004. Nidificación de la Loica Pampeana (*Sturnella defilippii*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 19: 47-52.
- Crawshay, R. 1907. *The birds of Tierra del Fuego*. Bernard Quaritch. London.
- Creuwels, J. C. S., Poncet, S., Hodum, P. J. y J. A. van Franeker. 2007. Distribution and abundance of the Southern Fulmar *Fulmarus glacialisoides*. *Polar Biol.* 30: 1083-1097.
- Cruz, S. 2014. E67920, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816).

- www.ecoregistros.org/67920 (acceso 20/02/2015)
- Cruz, S. 2014. E36015, *Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790). www.ecoregistros.org/36015 (acceso 21/02/2015)
- D**
- Dabbene, R. 1916. Notas biológicas sobre gallaretas y macáes. *Anales Mus. Nac. Hist. Nat.* 28: 183-192.
- Dabbene, R. 1918a. Nido y pichones de un gavilán, “*Parabuteo unicinctus*” Temminck. *Hornero* 1: 100-101.
- Dabbene, R. 1918b. Sobre los nidos del Federal “*Amblyramphus holosericeus*” (Scop.) y del pecho colorado “*Leistes militaris superciliaris*” (Bp.). *Hornero* 1: 104-105.
- Dabbene, R. 1918c. Sobre una curiosa costumbre de nidificación del “Pato barcino chico” *Nettium flavirostre* (Vieillot). *Hornero* 1: 111-114.
- Dabbene, R. 1920. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 2: 133-136.
- Dabbene, R. 1921. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 2: 225-227.
- Dabbene, R. 1922. Una gallareta nueva para la Argentina. *Hornero* 2: 290.
- Dabbene, R. 1924. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 3: 282-284.
- Dabbene, R. 1926. Nidificación del cucúlido *Coccyzus melacoryphus* Vieill. *Hornero* 3: 420-422.
- Daciuk, J. 1972. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XIV. Pequeña colonia de nidificación del Gaviotín Brasileño en Isla de los Pájaros (Golfo san José, Prov. Chubut, Rep. Argentina). *Neotrópica* 18: 103-106.
- Daciuk, J. 1973a. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia IX. Colonia de nidificación del Gaviotín Brasileño en Caleta Valdés (Chubut) y sugerencias para su protección. *Physis* 32: 71-82.
- Daciuk, J. 1973b. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XI. Etolología y desarrollo de los pichones de cuaco o garza bruja (*Nycticorax nycticorax obscurus*) de una colonia estudiada en la isla de los Pájaros (Golfo San José, Chubut, Argentina). *Physis* 32: 107-121.
- Daciuk, J. 1975. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdes y Patagonia. XVI. Nuevas áreas de nidificación de la “Gaviota Parda de las Malvinas” (Charadriiformes: Stercorariidae). *Neotrópica* 21: 139-143.
- Daciuk, J. 1975. La fauna silvestre de las Islas Malvinas. *Anales Soc. Cient. Argentina* Tomo CXCIX: 153-176.
- Daciuk, J. 1976a. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XVII. Colonias de nidificación de *Egretta alba egretta* (Gmelin) y *Sterna eurygnatha* (Sanders) recientemente encontrada en las costas de Chubut (Rep. Argentina). *Physis* 35: 341-347.
- Daciuk, J. 1976b. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XVIII. Comportamiento del “Pato Vapor Volador” observado durante el ciclo reproductivo en costas e islas del Chubut (Rep. Argentina). *Neotrópica* 22: 27-29.
- Daciuk, J. 1977a. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. VI. Observaciones sobre áreas de nidificación de la avifauna del litoral marítimo patagónico. *Hornero* 11: 361-376.
- Daciuk, J. 1977b. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. V. Anillado de aves litoral marítimo patagónico para estudios del comportamiento migratorio. *Hornero* 11: 349-360.
- Daciuk, J. 1978. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdes y Patagonia. XXIII. Estudio bioecológico y etológico general del Ñandú Petiso y de los tinámidos de Península Valdes, Chubut, Argentina (Aves, Rheidae y Tinamidae). *Physis* 38: 69-85.
- Daciuk, J. 1983. Notas faunísticas y bioecológicas de península Valdés y Patagonia. XXVI. Estudio etológico en el hábitat (comportamiento colonial, caliológico, sexológico y parental) de *Spheniscus magellanicus* (L.R. Forster, 1781) en Bahía Janssen, Punta Tombo y Punta Clara, Chubut, Argentina. *Hornero Número extraor.*: 218-227.

- Daguerre, J. B. 1920. Observaciones sobre los patos “*Metopiana peposaca*” y “*Heteronetta atricapilla*”. *Hornero* 2: 61-62.
- Daguerre, J. B. 1921. Sobre costumbres y nidificación del Hornero. *Hornero* 2: 228-230.
- Daguerre J. B.1922. Lista de aves colecciónadas y observadas en Rosas, F. C. S. *Hornero* 2: 259-271.
- Daguerre, J. B.1923. Parasitismo del pato, *Heteronetta atricapilla*. *Hornero* 3: 194-195.
- Daguerre, J. B. 1924a. Apuntes sobre algunas aves de la Provincia de Buenos Aires. *Hornero* 3: 248-252.
- Daguerre, J. B. 1924b. Observaciones sobre la nidificación de los tordos, *Molothrus brevirostris* y *M. badius*. *Hornero* 3: 285.
- Daguerre, J. B. 1934. Colonias de aves en nidificación. *Hornero* 5: 397-402.
- Daguerre, J. B. 1935. Nidificación del “Pájaro Blanco”, *Casmerodius a. egretta* y *Leucophoyx th. thula*. *Hornero* 6: 64-69.
- Daher, E. y C. Spagarino. 2011. Reproducción de Urutaú Común (*Nyctibius griseus*) en el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina. Resúmenes, XIV Reunión Argentina de Ornitológia, Formosa.
- Daneri, C. 1960. La nidificación del Biguá *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt) en Puerto Deseado. *Physis* 21: 273-277.
- Danti, C. F. 2012. E15011, *Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/15011 (acceso 20/02/2015)
- Danti, C. F. 2013. E20421, *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/20421 (acceso 19/02/2015)
- Danti, C. F. 2013. E20388, *Podiceps occipitalis* (Garnot, 1826). www.ecoregistros.org/20388 (acceso 19/02/2015)
- Danti, C. F. 2013. E 20419, *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org/20419 (acceso 19/02/2015)
- Danti, C. F. 2013. E29892, *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824). www.ecoregistros.org/29892 (acceso 21/02/2015)
- Danti, C. F. 2013. E19990, *Pardirallus sanguinolentus* (Swainson, 1838).
- www.ecoregistros.org/19990 (acceso 22/02/2015)
- Danti, C. F. 2013. E27409, *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/27409 (acceso 10/03/2015)
- Darrieu, C. A. 1987. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. IV. Nuevos registros de aves (Passeriformes, Tyrannidae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. *Neotrópica* 33: 29-36.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1988. Estudio sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados (Parulidae, Thraupidae). *Neotrópica* 36: 133-137.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1990. Estudio de una colección de aves de Corrientes. I. (Dendrocolaptidae, Furnariidae). *Hornero* 13: 138-146.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1991. Estudio de una colección de aves de Corrientes. II. (Formicariidae, Cotingidae, Pipridae). *Neotrópica* 37: 75-80.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1992. Estudio de una colección de aves de Corrientes. III. (Tyrannidae). *Hornero* 13: 219-224.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1993. Estudio de una colección de aves de Corrientes, Argentina. IV. (Phytotomidae a Parulidae). *Neotrópica* 39: 83-92.
- Darrieu, C. A. y A. R. Camperi. 1996. Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). *Neotrópica* 42: 69-75.
- Darrieu, C. A. y M. M. Martínez. 1984. Estudio sobre la avifauna de Corrientes. I. Nuevos registros de aves (No Passeres). *Rev. Mus. La Plata* 13: 257-260.
- Darrieu, C. A., Martínez, M. M. y G. E. Soave. 1984. Sobre la nidificación de *Bubulcus ibis* y otros ardéidos en la provincia de Mendoza, Argentina (Aves: Ardeidae). *Historia Natural* 4: 141-144.
- Darrieu, C. A., Martínez, M. M. y G. E. Soave. 1989. Estudio de la avifauna de la Reserva Provincias Llancanelo, Mendoza. III. Nuevos registros de nidificación de aves acuáticas (Podicipedidae, Threskiornithidae, Anartidae, Rallidae, Laridae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 20: 81-90.
- Darrieu, C. A., Soave, G. y E. Soave. 1988. Nidificación de passeriformes en la reserva integral de Punta Lara y sus alrededores,

- Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 13: 53-58.
- Darrieu, C. A., Soave, G. E., Juárez, M. y A. R. Camperi. 2001. First breeding record of the Silvery Grebe (*Podiceps occipitalis*) in the Buenos Aires province, Argentina. *Ornit. Neotr.* 12: 87-89.
- Dassatti, E. 2012. E16324, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/16324 (acceso 20/02/2015)
- Davis, D. E. 1940a. La manifestación de localismo en los Furnariidae. *Hornero* 7: 366-370.
- Davis, D. E. 1940b. Social nesting habits of *Guira guira*. *Auk* 57: 472-484.
- Davis, D. E. 1942. The number of eggs laid by Cowbirds. *Condor* 44: 10-12.
- Dean, A. 1971a. Nidificación del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*). *Hornero* 11: 124.
- Dean, A. 1971b. Notes on *Spizapteryx circumcinctus*. *Ibis* 113: 101-102.
- De Biagi, C. 2015. E105925, *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/105925 (acceso 15/07/2015)
- De la Colina, M. A., Pompilio, L., Hauber, M. A., Reboreda, J. C. y B. Mahler. 2012. Different recognition cues reveal the decision rules used for egg rejection by hosts of a variably mimetic avian brood parasite. *Animal Cognition* 15: 881-889.
- De la Peña, R. M. 1973. Nidificación de aves de la provincia de Santa Fe. *Hornero* 11: 219-221.
- De la Peña, R. M. 1975. Nidificación de aves de la provincia de Santa Fe. II. *Hornero* 11: 318.
- De la Peña, R. M. 1977. Nidificación de aves de la provincia de Santa Fe. III. *Hornero* 11: 423-425.
- De la Peña, R. M. 1979. Nidos de aves de Santa Fe. IV. *Hornero* 12: 72-74.
- De la Peña, R. M. 1980a. Notas nidológicas sobre biguaes y cormoranes (Aves: Anhingidae y Phalacrocoracidae). *Historia Natural* 1: 109-112.
- De la Peña, R. M. 1980b. Notas nidológicas sobre garzas (Aves: Ardeidae). *Historia Natural* 1: 161-168.
- De la Peña, R. M. 1981a. Notas nidológicas sobre pepiteros, cardenales, etc. (Aves, Emberizidae). *Historia Natural* 2: 1-4.
- De la Peña, R. M. 1981b. Notas nidológicas sobre corbatitas (Aves, Emberizidae). Segunda parte. *Historia Natural* 2: 45-48.
- De la Peña, M. R. 1982. Notas nidológicas sobre vencejos (Aves, Apodidae). *Historia Natural* 2: 239-240.
- De la Peña, M. R. 1983a. Nota sobre observaciones de nidificación de aves en la provincia de Santa Fe. *Hornero* 12: 129-131.
- De la Peña, R. M. 1983b. Hábitos parasitarios de algunas especies de aves. *Hornero N° Extraordinario*: 165-169.
- De la Peña, R. M. 1983c. Notas nidológicas sobre aves argentinas. *Hornero N° Extraordinario*: 170-173.
- De la Peña, R. M. 1983d. Notas nidológicas sobre mistos y diucas (Aves, Emberizidae). Tercera parte. *Historia Natural* 3: 33-38.
- De la Peña, R. M. 1983e. Notas nidológicas sobre Fringilidos (Aves, Emberizidae) (Cuarto Parte). *Historia Natural* 3: 141-143.
- De la Peña, R. M. 1984. Descripción de nuevos nidos para la avifauna Argentina. *Historia Natural* 4: 19.
- De la Peña, R. M. 1985. Familia Tyrannidae. *Nuestras Aves* 8: 13-14.
- De la Peña, R. M. 1986a. Familia Tyrannidae. *Nuestras Aves* 9: 14-15.
- De la Peña, R. M. 1986b. Familia Tyrannidae. *Nuestras Aves* 11: 25-28.
- De la Peña, R. M. 1987. *Nidos y huevos de aves argentinas*. Santa Fe.
- De la Peña, R. M. 1989. Descripción de un nido de *Agriornis microptera*. *Nuestras Aves* 20: 5.
- De la Peña, R. M. 1996. Descripción de nidos nuevos o poco conocidos de la avifauna Argentina. *Hornero* 14: 85-86.
- De la Peña, M. R. 1996. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *Hornero* 14: 87-89.
- De la Peña, M. R. 2000. Población de la Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en el departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, Argentina. *FAVE* 14: 71-76.
- De la Peña, M. R. 2001a. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. *Hornero* 16: 17-21.

- De la Peña, M. R. 2001b. Nidificación de aves en el noroeste argentino. *Nuestras Aves* 42: 16-17.
- De la Peña, R. M. 2001c. Nidificación del Espiguero Pardo (*Tiaris obscura*) en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 42: 17-18.
- De la Peña, R. M. 2004a. Nidos de Jabirú (*Jabiru mycteria*) y Milano Plomizo (*Ictinia plumbea*) en el noreste argentino. *Nuestras Aves* 47: 15-16.
- De la Peña, R. M. 2004b. Biología reproductiva de la Tijerilla *Xenopsaris albinucha* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Santa Fe, Argentina. *FAVE* 3: 71-77.
- De la Peña, M. R. 2005a. Biología reproductiva de la Tacuarita Azul *Polioptila dumicola* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Santa Fe, Argentina. *FAVE* 4: 61-70.
- De la Peña, M. R. 2005b. *Reproducción de las aves argentinas* (con descripción de pichones). Ed. L.O.L.A.
- De la Peña, M. R. 2006. Biología reproductiva del Crespín *Tapera naevia* en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Santa Fe, Argentina. *FAVE* 5: 21-24.
- De la Peña, M. R. 2011. Nidificación del urutá común (*Nyctibius griseus*) (Aves: Nyctibiidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 75: 1-7.
- De la Peña, M. R. 2013. *Nidos y reproducción de las Aves Argentinas*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 8. Ediciones Biológica, Santa Fe.
- De la Peña, M. R. 2016a. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Rheidae a Pelecanoididae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 19 (1): 1-456.
- De la Peña, M. R. 2016b. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Ciciniidae a Heliornithidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 19 (2): 1-436.
- De la Peña, M. R. 2016c. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Charadriidae a Trochilidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 20 (1): 1-627.
- De la Peña, M. R. 2016d. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Trogonidae a Furnariidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 20 (2): 1-620.
- De la Peña, M. R. 2016e. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 21 (1): 1-633.
- De la Peña, M. R. 2016f. Aves Argentina: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Mimidae a Passeridae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 21 (2): 1-564.
- De la Peña, M. R. y D. Montalti. 2014. Nidificación de las aves argentinas. Struthioniformes a Phoenicopteriformes. *Comun. Museo Prov. Cienc. Nat. "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie) 18: 1-136.
- De la Peña, M. R., Beldomérico, P. M. y L. R. Atoniazzi. 2003. Pichones de aves parasitados por larvas de *Philornis sp.* (Diptera: Muscidae) en un sector de la provincia biogeográfica del Espinal de Santa Fe, Argentina. *FAVE* 2: 141-146.
- Del Blanco, R. 2014. E70922, *Anas platalea* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/70922 (acceso 20/02/2015)
- Delhey, J. K. V., Petracci, P. F. y C. M. Grassini. 2001. Hallazgo de una nueva colonia de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la ría de Bahía Blanca, Argentina. *Hornero* 16: 39-42.
- Delhey, K. y C. H. Fulvio Pérez. 2013. Observations on breeding of two Furnariidae in Patagonia: White-throated Cacholote *Pseudoseisura gutturalis* and Patagonian Canastero *Pseudasthenes patagonica*. *Cotinga* 35: OL 43-47.
- Delhey, K., Carrizo, M., Verniere, L. C., Mahler, B. y A. Peters. 2010. Seasonal variation in reproductive output of a Neotropical temperate suboscine: the firewood-gatherer (*Anumbius annumbi*). *Auk* 127: 222-231.

- Delhey, K., Carrizo, M., Verniere, L. C., Mahler, B. y A. Peters. 2011. Rejection of brood-parasitic shiny cowbird *Molothrus bonariensis* nestlings by the firewood-gatherer *Anumbius annumbi*? *J. Avian Biol.* 42: 463-467.
- De Lucca, E. 1986. Nidificación otoñal del Elanio Blanco. *Nuestras Aves* 11: 13.
- De Lucca, E. R. 1992. Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) en nidos de Cotorra (*Myiopsitta monachus*). *Hornero* 13: 238-240.
- De Lucca, E. R. 1993. Un caso de poliandria en el Halconcito Colorado (*Falco sparverius*). *Hornero* 13: 299-302.
- De Lucca, E. R. 1996a. Nidificación del Bailarín Azul *Chiroxiphia caudata* en Argentina. *Nuestras Aves* 33: 32.
- De Lucca, E. R. 1996b. Observaciones de un nido exitoso de Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. *Hornero* 14: 70-72.
- De Lucca, E. R. 1996c. Censos de Choiques (*Pterocnemia p. pennata*) en el sur patagónico. *Hornero* 14: 74-77.
- De Lucca, E. R. 2011. Observaciones del aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en el centro y sur de la Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 77: 1-15.
- De Lucca, E. R. 2013. Escasa distancia entre dos nidos exitosos de halcón peregrino sudamericano (*Falco peregrinus cassini*) en el norte patagónico, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 123: 1-7.
- De Lucca, E. R. 2014a. Nidificación del Aguilucho Común (*Buteo polyosoma*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 151: 1-4.
- De Lucca, E. R. 2014b. Reproducción de Halcones Preregrinos Sudamericanos (*Falco peregrinus cassini*) en acantilados marítimos de la Patagonia, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 152: 1-14.
- De Lucca, E. R. 2016a. Reproducción del Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) en un nido construido por Loros Barranqueros (*Cyanoliseus patagonus*) en un acantilado del litoral patagónico, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 194: 1-6.
- De Lucca, E. R. 2016b. Observaciones de un nido exitoso de Halcón Peregrino Sudamericano (*Falco peregrinus cassini*) en Argentina. Cuidado parental, rol de los sexos y comportamiento de pichones. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 195: 1-11.
- De Lucca, E. R. y M. Bertini. 2015. Densidades lineales y performance reproductiva de parejas de aguilucho común (*Geranoaetus polyosoma*) en el norte de la Patagonia, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 181: 1-6.
- De Lucca, E. R. y D. Bustamante. 2014. Nidificación del Gavilán Planeador (*Circus buffoni*) en la Patagonia, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 153: 1-5.
- De Lucca, E. R. y A. Quaglia. 2012. Nidificación de una pareja de halcones plomizos del sur (*Falco femoralis femoralis*) en un poste de electricidad en el noreste patagónico, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 108: 1-5.
- De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. *Hornero* 13: 259-260.
- De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1993. Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) en la Patagonia. *Hornero* 13: 302-305.
- De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1995. Fraticidio en el Águila Mora *Geranoaetus melanoleucus*. *Hornero* 14: 38-39.
- De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 1996. Nidificación del Halcón Aplomado (*Falco f. femoralis*) en la provincia de San Luis. *Hornero* 14: 81-84.
- De Lucca, E. R. y M. D. Saggese. 2012. Parental care and time-activity Budget of a breeding pair of Black-chested Buzzard-eagles (*Geranoaetus melanoleucus*) in southern Patagonia, Argentina. *Ornitología Colombiana* 12: 17-24.
- De Lucca, E. R., Bertini, M. y A. Quaglia. 2012a. Nidificación del águila mora (*Geranoaetus melanoleucus*) y del aguilucho común (*Buteo polyosoma*) en el litoral marítimo del noreste patagónico, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 103: 1-10.
- De Lucca, E. R., Bertini, M. y A. Quaglia. 2012b. Nidificación agrupada del gavilán ceniciente (*Circus cinereus*) en médanos costeros del noreste patagónico, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 107: 1-10.
- De Lucca, E. R., Bustamante, D. y M. Fernández Sánchez de Bustamante. 2013.

- Reproducción del halcón plomizo (*Falco femoralis femoralis*) en las pampas de Argentina y su peculiar asociación a colonias de chimango (*Milvago chimango*). *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 136: 1-14.
- De Lucca, E. R., Fernández, M. y D. Bustamante. 2013. Nidificación de una pareja mixta (morpho normal x pálido) de halcón peregrino (*Falco peregrinus cassini*) en el litoral marítimo de la Península Valdés, Chubut, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 122: 1-6.
- De Lucca, E. R., Quaglia, A. y E. R. Bertini. 2013. Numerosas parejas de Aguilucho Común (*Buteo polyosoma*) nidificando en postes de electricidad en el norte patagónico, Argentina. *Faunísticas (segunda serie)* 120: 1-10.
- De Lucca, E. R., Borsellino, L., Albornoz, L. y M. Bertini. 2015. Nuevos aportes sobre la reproducción de una población de halcones peregrinos sudamericanos (*Falco peregrinus cassini*) del norte de la Patagonia, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 185: 1-12.
- De Maio, F. A. 2014. E67567, *Gallinula galeata* (Lichtenstein, 1818). www.ecoregistros.org/67567 (acceso 22/02/2015)
- De Mársico, M. C. y J. C. Reboreda. 2010. Brood parasitism increases mortality of Bay-winged Cowbird nests. *Condor* 112: 407-417.
- De Mársico, M. C. y J. C. Reboreda. 2014. Adaptaciones y contraadaptaciones entre el Tordo Pico Corto (*Molothrus rufoaxillaris*) y el Tordo Músico (*Agelaioides badius*). *Hornero* 29: 1-12.
- De Marsico, M.C., Mahler, B. y J. C. Reboreda. 2010. Reproductive success and nestling growth of Bay-winged cowbirds parasitized by Screaming and Shiny Cowbirds. *Wilson J. Ornith.* 122: 417-431.
- De Marsico, M.C., Gantchoff, M. G. y J. C. Reboreda. 2012. Host-parasite coevolution beyond the nestling stage? Mimicry of host fledglings by the specialist screaming cowbird. *Proc. Royal Soc. B* 279: 3401-3408.
- Derlindati, E. J., Moschione, F. N. y N. N. Cruz. 2010. Nuevas colonias de nidificación de la parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*) en el noroeste de la Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 56: 1-5.
- Devillers, P. 1977. Observations at a breeding colony of *Larus (belcheri) atlanticus*. *Le Gerfaut* 67: 22-43.
- Devillers, P. y J. A. Terschuren. 1978. Relationships between the Blue-eyes Shags of south America. *Le Gerfaut* 68: 53-86.
- De Volder, L. C. 2015. E80412, *Eudromia elegans* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832). www.ecoregistros.org/80412 (acceso 19/02/2015)
- De Volder, L. C. 2015. E80500, *Phalacrocorax brasiliensis* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/80500 (acceso 18/01/2016)
- Díaz, A., Luczywo, A., Peralta, G., Schaaf, A. y S. I. Peluc. 2015. Cambios en rasgos comportamentales reproductivos del Pepitero de Collar (*Saltator aurantiirostris*) a lo largo de la temporada reproductiva en el Chaco Serrano. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Díaz, S. 2009. *Enicognathus ferrugineus* (Aves, Psittacidae) dietary, reproductive and hábitat selection aspects in Araucaria araucana forest. *Proyecto Cachaña, Ruffor Small Grants Fund*.
- Díaz, S. y T. Kitzberger. 2013. Nest habitat selection by the Austral parakeet in north-western Patagonia. *Austral Ecology* 38: 268-278.
- Dieser, J. A. 2014. E64716, *Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/64716 (acceso 20/02/2015)
- Di Fiore, E. 2013. E21908, *Ardea cocoi* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/21908 (acceso 21/02/2015)
- Di Fiore, E. 2013. E16187, *Stephanoxis loddigesii* (Gould, 1831). www.ecoregistros.org/16187 (acceso 21/02/2015)
- Di Giacomo, A. G. 1988. Nidificación del Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Salto, Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 13: 1-7.
- Di Giacomo, A. G. 1992. Descripción de los nidos de *Knipolegus cyanirostris* y *Pseudocolopteryx sclateri*. *Hornero* 13: 244-245.

- Di Giacomo, A. G. 1997. Hallazgo de un nido de *Botaurus pinnatus* en Argentina. *Hornero* 14: 262-263.
- Di Giacomo, A. G. 1998a. Descripción del nido y huevos de *Emberizoides ypiranganus*, y presencia de la especie en Formosa, Argentina. *Hornero* 15: 51-52.
- Di Giacomo, A. G. 1998b. Nidificación de *Thamnophilus doliatus* en Argentina. *Hornero* 15: 53-57.
- Di Giacomo, A. G. 2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en el chaco oriental argentino. *Hornero* 15: 135-139.
- Di Giacomo, A. G. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. En Di Giacomo, A. G. y S. F. Krapovickas (Eds.). *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo*. Temas de Naturaleza y Conservación 4: 203-465. Aves Argentinas/AOP. Buenos Aires.
- Di Giacomo, A. G. 2011. Nidificación de la Bandurria Mora (*Theristicus caerulescens*) en el Chaco Argentino. Resúmenes, XIV Reunión Argentina de Ornitología, Formosa.
- Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar. 1986. Descripción de un nido de Monterita Castaña. *Nuestras Aves* 10: 29-30.
- Di Giacomo, A. G. y H. A. Aguilar. 1987. Sobre un nuevo hospedante para la Argentina del Renegrido *Molothrus bonariensis* (Aves: Icteridae). *Nótulas Faunísticas* 4: 1-2.
- Di Giacomo A. G. y A. S. Di Giacomo. 2008. Primer registro de nidificación que involucra a híbridos de *Dryocopus schulzi* y *D. lineatus*. Resúmenes, XII Reunión Argentina de Ornitología. Neuquén.
- Di Giacomo, A. G. y A. S. Di Giacomo. 2013. Biología reproductiva del Verdón (*Embernagra platensis*) en pastizales subtropicales de Formosa, Argentina. Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Di Giacomo, A. G. y J. Lieberman. 2000. Descripción del pichón de *Xenopsaris albinucha*. *Hornero* 15: 129-130.
- Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. *Hornero* 15: 29-38.
- Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *Hornero* 15: 131-134.
- Di Giacomo, A. G. y J. C. Reboreda. 2014. Reproductive success of the specialist brood parasite Screaming Cowbird in an alternative host, the Chopi Blackbird. *Auk* 132: 16-24.
- Di Giacomo, A. G., Di Giacomo, A. S. y J. C. Reboreda. 2009. Reproducción del Tachurí Coludo (*Culicivora caudata*), en la Reserva El Bagual, Formosa. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitología, Tucumán.
- Di Giacomo, A. G., Di Giacomo, A. S. y J. C. Reboreda. 2011a. Effects of grassland burning on reproductive success of globally threatened Strange-tailed Tyrants, *Alectrurus risora*. *Bird Cons. Int.* 21: 411-422.
- Di Giacomo, A. G., Di Giacomo, A. S. y J. C. Reboreda. 2011b. Male and female reproductive success in a threatened polygynous species: the Strange-tailed Tyrant, *Alectrurus risora*. *Condor* 113: 619-628.
- Di Giacomo, A. G., Mahler B. y J. C. Reboreda. 2010. Screaming Cowbird parasitism of nests of Solitary Caciques and Cattle Tyrants. *Wilson Jour. Ornith.* 122: 795-799.
- Di Iorio, O., Turienzo, P., Massello, J. y D. L. Carpintero. 2010. Insects found in birds' nests from Argentina. *Cyanoliseus patagonus* (Vieillot, 1818) [Aves: Psittacidae], with the description of *Cyanolicimex patagonicus*, gen. n., sp. n., and a key to the genera of Haematosiphoninae (Hemiptera: Cimicidae). *Zootaxa* 2728: 1-22.
- Di Iorio, O., Turienzo, P., Bragagnolo, L., Santillán, M. A. y J. M. Grande. 2013. New family host and records of *Acanthocrios furnarii* (Cordero & Vogelsang, 1928) (Hemiptera: Cimicidae) from Argentina, and implications in the transmission mechanism of cimicid bugs among birds' nests. *Zootaxa* 3630: 582-590.
- Di Iorio, O., Turienzo, P., Nava, S., Mastropaoletti, M., Mangold, A. J., González Acuña, D. y A. A. Guglielmone. 2010. *Asthenes dorbignyi* (Passeriformes: Furnariidae) host of *Argas neghmei* (Acari: Argasidae). *Exp. Appl. Acarol.* 54: 419-422.

- Dinelli, L. 1918a. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la Rep. Argentina. *Hornero* 1: 57-68.
- Dinelli, L. 1918b. Notas biológicas sobre aves del noroeste de la Argentina. *Hornero* 1: 140-147.
- Dinelli, L. 1922. Notas biológicas sobre aves del Tucumán. *Hornero* 2: 312-313.
- Dinelli, L. 1924. Notas biológicas sobre aves del noroeste de la Argentina. *Hornero* 3: 253-258.
- Dinelli, L. 1929. Notas biológicas sobre aves del noroeste argentino. *Hornero* 4: 272-277.
- Dinelli, L. 1933. El tiránido *Pseudocolopteryx dinellianus* y su nido. *Hornero* 5: 221-222.
- Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (DECB). 2011. Fauna vertebrada del Parque Natural Municipal Ribera Norte. Secretaría de Producción. Municipalidad de San Isidro.
- Di Sallo, F. G. y A. Bodrati. 2015. Nido, huevos, pichón y comportamiento reproductivo de la Saracura (*Aramides saracura*) en Argentina. *Nuestras Aves* 60: 13-15.
- Di Sallo, F. G. y A. Bodrati. 2015. Descripción del nido y comentarios sobre la nidificación del Ladrillito (*Mionectes rufiventris*) en Argentina. *Nuestras Aves* 60: 89-91.
- Di Sallo, F. G. y L. N. Segura. 2014. Nidificación del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en un nido de Leñatero (*Anumbius annumbi*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 59: 13-15.
- Doello Jurado, M. 1915. Anotaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. *Physis* 2: 44-48.
- Doello Jurado, M. 1917. Sobre aves de Puerto Deseado (Patagonia). *Hornero* 1: 8-16.
- Doering, A. 1881. *Informe oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia) en 1879*. Parte Zoología.
- Doiny Cabré, P. C. 2006. Aves nuevas o poco registradas para Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 52: 21-23.
- Dolsan, M. F. 2014. E73359, *Sublegatus modestus* (Wied, 1831). www.ecoregistros.org/73359 (acceso 7/11/2015)
- Dolsan, M. F. 2015. E79089, *Rhea americana* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/79089 (acceso 19/02/2015)
- Dolsan, M. F. 2015. E123730, *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/123730 (acceso 19/12/2015)
- Dolsan, M. F. 2015. E79835, *Netta peposaca* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/79835 (acceso 21/02/2015)
- Domínguez, M., Ayarragaray, M. y R. Lapido. 2015. Nidos de Cardenal Amarillo (*Gubernatrix cristata*) En la provincia de San Luis, Argentina. *Nuestras Aves* 60: 8-10.
- Domínguez, M., Reboreda, J. C. y B. Mahler. 2015. Impact of Shiny Cowbird and botfly parasitism on the reproductive success of the globally endangered Yellow Cardinal *Gubernatrix cristata*. *Bird Conservation International* 25: 294-305.
- Donázar, J. A., Travaini, A., Rodríguez, A., Ceballos, O. y F. Hiraldo. 1996. Nesting association of Raptors and Buff-necked Ibis in the Argentinean Patagonia. *Colonial Waterbirds* 19: 111-115.
- Donázar, J. A., Ceballos, O., Travaini, A., Rodríguez, A., Funes, M. y F. Hiraldo. 1994. Breeding performance in relation to nest-site substratum in a Buff-necked Ibis (*Theristicus caudatus*) population in Patagonia. *Condor* 96: 994-1002.
- Drabble, L. E. 1953. Notas sobre nidos observados en Entre Ríos. *Hornero* 10: 81.
- Dupuy, G. 2005. Jilguero Dorado (*Sicalis flaveola*) en el oeste de Neuquén, Argentina. *Nuestras Aves* 49: 32-33.
- Durán, G. F. 2014. E67372, *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/67372 (acceso 4/03/2015)
- Durford, H. 1876. Ornithological notes from the neighbourhood of Buenos Ayres. *Ibis* 1876: 157-166.
- Durford, H. 1877a. Notes on some birds observed in the Chubut valley, Patagonia, and in the neighbouring distried. *Ibis* 1877: 27-46.
- Durford, H. 1877b. Notes on the birds of the Province of Buenos Ayres. *Ibis* 1877: 166-203.

- Durford, H. 1878a. Notes on the birds of the Province of Buenos Ayres. *Ibis* 1878: 58-68.
- Durford, H. 1878b. Notes on the birds of Central Patagonia. *Ibis* 1878: 389-406.
- E**
- Earnshaw, A. 2014. E50655, *Sarcoramphus papa* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/50655 (acceso 19/02/2015)
- Earnshaw, A. 2014. E44918, *Stercorarius chilensis* (Bonaparte, 1857). www.ecoregistros.org/44918 (acceso 4/03/2015)
- Earnshaw, A., La Grotteria, J., Alvarado, H. y D. Oscar. 2011. Seguimiento y registro de la nidificación más austral de la Lavandera (*Arundinicola leucocephala*). *EcoRegistros Revista* 1 (15): 1-8.
- Eberhard, J. R. 1996. Nest adoption by Monk Parakeets. *Wilson Bull.* 108: 374-377.
- Eberhard, J. R. 1998. Breeding biology of the Monk Parakeet. *Wilson Bull.* 110: 463-473.
- eBird. 2015a. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S25949931>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 1 diciembre 2015).
- eBird. 2015b. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist?subID=S21034400>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 2 diciembre 2015).
- eBird. 2015c. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist?subID=S25975808>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 2 diciembre 2015).
- eBird. 2015d. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S25808689>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 2 diciembre 2015).
- eBird. 2015e. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist?subID=S25822421>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 4 diciembre 2015).
- eBird. 2015f. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S25906884>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 4 diciembre 2015).
- eBird. 2015g. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S26385802>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 25 diciembre 2015).
- eBird. 2016a. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/argentina/view/checklist?subID=S26641569>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 6 enero 2016).
- eBird. 2016b. eBird: An online database of bird distribution and abundance [<http://ebird.org/ebird/view/checklist?subID=S26617816>]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (Accedido: 6 enero 2016).
- Echevarría, A. D. 2014. Las aves acuáticas como indicadoras de problemas ambientales en el embalse La Angostura, Tucumán, Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 58: 44-56.
- Echevarría, A. D., Chani, J. M., Marano, C. F. y M. C. Cocimano. 2005. Nidificación de cuatro especies de *Fulica* con énfasis en *F. Ardesiaca*, en el Embalse La Angostura, Tafí del Valle, Tucumán. Resúmenes, XI Reunión Argentina de Ornitología. Buenos Aires.
- Echevarría, A. L., Cocimano, M. C., Chani, J. M., Marano, C. F. y M. C. Constanza. 2008. Nuevos registros de distribución para Gallareta Andina (*Fulica ardesiaca*), Pato Punko (*Anas puna*), Pato Zambullidor Grande (*Oxyura ferruginea*) y Cuervillo Punko (*Plegadis ridgwayi*), en el embalse La Angostura, Tafí del Valle Tucumán. *Acta Zool. Lilloana* 52: 107-110.
- Echevarría, A. L., Cocimano, M. C., Chani J. M. y C. F. Marano. 2013. Nesting biology of Coscoroba Swan *Coscoroba coscoroba* at La Angostura Dam, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. *Cotinga* 35: OL 11-14.
- Eguia, P. 2014. E71421, *Cygnus melancoryphus* (Molina, 1782).

- www.ecoregistros.org/71421 (acceso 20/02/2015)
- Eguia, P. 2014. E71420, *Chloephaga picta* (Gmelin, 1789).
www.ecoregistros.org/71420 (acceso 20/02/2015)
- Eguia, P. 2014. E49641, *Anas puna* (Tschudi, 1844). www.ecoregistros.org/49641 (acceso 20/02/2015)
- Eguia, P. 2014. E71405, *Tachyeres patachonicus* (King, 1828).
www.ecoregistros.org/71405 (acceso 21/02/2015)
- Eguia, P. 2014. E68989, *Gallinula galeata* (Lichtenstein, 1818).
www.ecoregistros.org/68989 (acceso 22/02/2015)
- Eguia, P. 2014. E49632, *Fulica gigantea* (Eydoux & Souleyet, 1841).
www.ecoregistros.org/49632 (acceso 4/01/2015)
- Eguia, P. 2015. E129172, *Chroicocephalus serranus*. www.ecoregistros.org/129172 (acceso 4/01/2016)
- Eguia, P. 2016. E132478, *Pachyramphus validus* (Lichtenstein, 1823).
www.ecoregistros.org/132478 (acceso 5/01/2016)
- Eguia, P. 2016. E141914, *Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829).
www.ecoregistros.org/141914 (acceso 9/03/2016)
- Eguia, P. 2016. E142045, *Elaenia strepera* (Cabanis, 1883).
www.ecoregistros.org/142045 (acceso 10/03/2016)
- Ellis, D. H. y C. Peres Garat. 1983. The Pallid Falcon *Falco kreyenborgi* is a color phase of the Austral Peregrine Falcon (*Falco peregrinus cassini*). *Auk* 100: 269-271.
- Erize, F. 1972. The Guanay Cormorant *Phalacrocorax bougainvillii* nesting on the Atlantic coast of South America. *Bull. B.O.C.* 92: 117-118.
- Erize, F. 1983. Observaciones sobre el macá tobiano. *Hornero Número extraor.*: 256-268.
- Escobar, F. 2006. Zonificación Preliminar Parque Provincial Puerto Península. Tesis, Facultad Ciencias Forestales, Univ. Nac. Santiago del Estero.
- Esteban, J. G. 1948. Contribución al conocimiento de los dendrocoláptidos argentinos. *Act. Zool. Lilloana* 5: 325-436.
- F**
- Facchinetti, C., Di Giacomo, A. G. y J. C. Reboreda. 2008. Parental care in Tawny-billed (*Sporophila hypoxantha*) and Rusty-collared (*S. collaris*) Seedeaters. *Wilson Bull.* 120: 879-883.
- Falabella, V., Campagna, C. y J. Croxall (edit.). 2009. *Atlas del Mar Patagónico. Especies y espacios*. Buenos Aires, Wildlife Conservation Society y BirdLife International.
- Fandiño, B. y A. A. Pautasso. 2011. Avifauna del AVP La Salamandra. Pp: 62-105. En A. A. Pautasso (ed.). *La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales. Ediciones Biológica*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5.
- Fandiño, B., Pautasso, A. A. y J. M. Mastropao. 2011. Hallazgo de un nido de Carpintero Negro (*Dryocopus schulzi*, Aves: Picidae) en bosques del chaco seco santafesino. *Biológica* 14:79-80.
- Fava, G. A., Fava, G. A. y J. C. Acosta. 2012. Nidificación del Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la precordillera de Barreal, San Juan, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 14-16.
- Favero, M., Avero, Coria, N. R. y M. P. Beron. 2000. The status of breeding birds at Cierva Point and surroundings, Danco Coast, Antarctic Peninsula. *Polish Polar Res.* 21: 181-187.
- Fernandes d’Oliveira, G. y H. Rodríguez Moulin. 1997. Hallazgo de un nido de Chorlito de Vincha (*Phegornis mitchelli*) en Mendoza, Argentina. *Hornero* 14: 255-256.
- Fernández, G. J. y N. M. Duré Ruiz. 2007. Éxito reproductivo y productividad del Chingolo (*Zonotrichia capensis*) en un área de monte de la provincia de Buenos Aires (Argentina). *Ornit. Neotr.* 18: 481-492.
- Fernández, G. J. y M. E. Mermoz. 2000. Effects of predation and cowbird parasitism on the nesting success of two sympatric neotropical marshbirds. *Wilson Bull.* 112: 354-364.
- Fernández, G. J. y J. C. Reboreda. 1995. Adjacent nesting and egg stealing between males of the Greater Rhea, *Rhea americana*. *J. Avian Biol.* 26: 321-324.
- Fernández, G. J. y J. C. Reboreda. 1998. Effects of clutch size and timing of breeding on

- reproductive success of Greater Rheas. *Auk* 115: 340-348.
- Fernández, G. J. y J. C. Reboreda. 2000. Egg losses and nest desertion in Greater Rheas. *Ibis*: 142: 29-34.
- Fernández, G. J. y J. C. Reboreda. 2002. Nest site selection by male Greater Rheas. *J. Field Ornith.* 73: 166-173.
- Fernández, G. J. y J. C. Reboreda. 2003. Male parental care in Greater Rheas (*Rhea americana*) in Argentina. *Auk* 120: 418-428.
- Fernández, G. J. y J. C. Reboreda. 2007. Cost of large communal clutches for male and female Greater Rheas *Rhea americana*. *Ibis* 149: 215-222.
- Fernández, G. J., Mermoz, M. E., Llambias, P. E. y E. M. Pujol. 2007. Life history and breeding success of the Scarlet-headed Blackbird (*Amblyranphus holosericeus*) in the argentinean pampas. *Ornit. Neotr.* 18: 407-419.
- Fernández, H. B. 2013. E29165, *Melanerpes candidus* (Otto, 1796). www.ecoregistros.org/29165 (acceso 4/03/2015)
- Fernández, H. B. 2014. E36298, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/36298 (acceso 4/03/2015)
- Fernández, M. 1920. Los pichones de nuestra cigüeña *Euxenura maguari* (Gm.). *Hornero* 2: 35-38.
- Fernández Campos, L. 2015. E127112, *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824). www.ecoregistros.org/127112 (acceso 14/12/2015)
- Fernández Campos, L. 2015. E113411, *Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790). www.ecoregistros.org/113411 (acceso 12/12/2015)
- Fernández Campos, L. 2015. E127111, *Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817). www.ecoregistros.org/127111 (acceso 14/12/2015)
- Fernández Campos, L. 2016. E132568, *Cinclodes albiventris* (Philippi & Landbeck, 1861). www.ecoregistros.org/132568 (acceso 7/01/2016)
- Fernández Guaraz, J. L. 2011. E1973, *Chloephaga poliocephala* (Sclater, 1857). www.ecoregistros.org/1973 (acceso 20/02/2015)
- Fernández Juricic, E., Martella, M. B. y E. V. Álvarez. 1998. Situación actual de la Amazona Frentiazul (*Amazona aestiva*) en una Reserva al límite sur de su distribución. *Ardeola* 45: 77-82.
- Ferrada, J. 2012. E16776, *Ardea cocoi* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/16776 (acceso 21/02/2015)
- Ferrari, S., Albrieu, C., Imberti, S. y C. Lishman. 2008. Estado actual del conocimiento de un chorlo endémico de la Patagonia austral, el Chorlito Ceniciente (*Pluvianellus socialis*): reuniendo las piezas de un rompecabezas. *Ornit. Neotr.* 19 (Suppl.): 433-443.
- Ferreira, S., Flores, L., Gatica, E. y C. López Herrera. 2005. Nidificación de *Troglodytes solstitialis* (Troglodytidae) en cajas nidos (Provincia de Salta). Resúmenes, XI Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires, pp.: 97.
- Ferrer, D. G., Lardelli, U. y R. Olivera. 2011. Propuesta para declarar al sitio Aica al Parque Provincial Aconcagua y al Monumento Natural Puente del Inca, Las Heras, Mendoza, Argentina. *Biológica* 14: 71-75.
- Ferrer, D. G., Lardelli, U., Olivera, R. y D. Cucchiara. 2013. Observaciones sobre la presencia y reproducción del Chorlito de Vincha (*Phegornis mitchellii*) en el Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 116: 1-12.
- Ferrer, D. G., Martínez, F., Lardelli, U. y A. Zalazar. 2014. Descripción y comentarios sobre el género *Muscisaxicola* en el Parque Provincial Aconcagua, Las Heras, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 144: 1-9.
- Fiameni, M. A. 2001. Nuevos registros de nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en la Argentina. *Nuestras Aves* 42: 13.
- Fiora, A. 1939. Distribución geográfica de las especies de aves capturadas en la provincia de Jujuy y zonas limítrofes. *Physis* 16: 272-289.
- Fiorini, V. D. y F. L. Rabuffetti. 2003. Cuidado paternal en el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*): contribución relativa del macho y la hembra. *Hornero* 18: 31-35.

- Fiorini, V. D. y J. C. Reboreda. 2006. Cues used by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*) to locate and parasitise Chalk-browed Mockingbird (*Mimus saturninus*) nest. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 60: 379-385.
- Fiorini, V. D., Tuero, D. T. y J.C. Reboreda. 2012. Dense canopy cover over House Wren (*Troglodytes aedon*) nests increases latency of brood parasitism by Shiny Cowbirds (*Molothrus bonariensis*). *Emu* 112: 55-59.
- Fiorini, V. D., Astié, A. A., Tuero, D. T. y J. C. Reboreda. 2005. Éxito reproductivo del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en hospedadores de distinto tamaño corporal. *Hornero* 20: 173-182.
- Forcelli, D. O., Osciglia, A. J., Silva Crome, M. A. y A. E. Taborda. 1988. Acerca del hallazgo del primer nido de Harpía, *Harpia harpyja* Linnaeus, 1758, en la provincial de Misiones. Pp. 4-5 (en Ornit. Argentina-Paraguay, Edit. J. R. Contreras).
- Fraga, R. M. 1972. Cooperative breeding and a case of successive polyandry in the Bay-Winged Cowbird. *Auk* 89: 447-449.
- Fraca, R. M. 1977. Notas sobre la reproducción del Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*). *Hornero* 11: 380-383.
- Fraca, R. M. 1978. The Rufous-collared Sparrow as a host of the Shiny Cowbird. *Wilson Bull.* 91: 151-154.
- Fraca, R. M. 1979a. Differences between nestlings and fledglings of Screaming and Bay-winged Cowbirds. *Wilson Bull.* 90: 271-284.
- Fraca, R. M. 1979b. Helpers at the nest in Passeriformes from Buenos Aires Province, Argentina. *Auk* 96: 606-608.
- Fraca, R. M. 1980. The breeding of the Rufous Hornero (*Furnarius rufus*). *Condor* 82: 58-68.
- Fraca, R. M. 1983a. Parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre el Chingolo (*Zonotrichia capensis*): nuevas observaciones y conclusiones. *Hornero Número Extraordinario*: 145-255.
- Fraca, R. M. 1983b. Conducta vocal y reproductiva de la Yerutí Común (*Leptotila verreauxii*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 12: 89-95.
- Fraca, R. M. 1983c. Notas sobre la conducta y nidificación de la Mosqueta *Myiophobus fasciatus* en Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 12: 96-106.
- Fraca, R. M. 1983d. The eggs of the parasitic Screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*) and its host, the Bay-winged Cowbird (*M. badius*): is there evidence for mimicry?. *J. Ornith.* 124: 187-193.
- Fraca, R. M. 1984a. Aspectos de la biología reproductiva del Picaflor Verde Común (*Chlorostilbon aureoventris*). *Hornero* 12: 156-158.
- Fraca, R. M. 1984b. Casos de nidificación otoño-invernal en algunos rapaces (*Tyto alba*, *Asio clamator*, *Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. *Hornero* 12: 193-195.
- Fraca, R. M. 1984c. Bay-winged Cowbird (*Molothrus badius*) remove ectoparasites from their brood parasites, the Screaming Cowbird (*M. rufoaxillaris*). *Biotropica* 16: 223-226.
- Fraca, R. M. 1985. Host-parasite interactions between Chalk-browed Mocking-birds and Shiny Cowbird. *Neotropical Ornithology* 36: 829-844.
- Fraca, R. M. 1988. Nest sites and breeding success of Bay-winged Cowbirds (*Molothrus badius*). *J. Ornith.* 129: 175-183.
- Fraca, R. M. 1991. The social system of a communal breeder, the Bay-winged Cowbird *Molothrus badius*. *Ethology* 89: 195-210.
- Fraca, R. M. 1996. Further evidence of parasitism of Chopi Blackbird (*Gnorimopsar chopi*) by the specialized Screaming Cowbird (*Molothrus rufoaxillaris*). *Condor* 98: 866-867.
- Fraca, R. M. 2001. The avifauna of Estancia San Juan Porahú, Iberá Marshes, Argentina. *Cotinga* 16: 81-86.
- Fraca, R. M. 2003. Distribution, natural history and conservation of the Black-and-White Monjita (*Heteroxolmis dominicana*) in Argentina, a species vulnerable to extinction. *Ornit. Neotr.* 14: 145-156.
- Fraca, R. M. 2005. The Brown-backed Mockingbird (*Mimus dorsalis*) as a Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) host. *Ornit. Neotr.* 16: 435-436.
- Fraca, R. M. 2008. Notes on the nesting of Chopi Blackbirds (*Gnorimopsar chopi*) in Argentina and Paraguat, Whith data on cooperative breeding and Broad parasitism by Screaming Cowbirds (*Molothrus rufoaxillaris*). *Ornit. Neotr.* 19: 299-304.

- Fraga, R. M. 2011a. Giant Cawbird (*Molothrus oryzivorus*) parasitism of Red-rumped Cacique (*Cacicus haemorrhouss*) in the Atlantic Forest, northeastern Argentina. *Wilson Bull.* 123: 277-282.
- Fraga, R. M. 2011b. Variable Oriole (*Icterus pyrrhogaster*) breeding in abandoned nests of Red-rumped Cacique (*Cacicus haemorrhouss*) in Misiones, Argentina. *Ornit. Neotr.* 22: 313-315.
- Fraga, R. M. y A. G. Di Giacomo. 2004. Cooperative breeding of the Yellow-rumped Marshbird (Icteridae) in Argentina and Paraguay. *Condor* 106: 671-673.
- Fraga, R. M. y S. Narosky. 1985. *Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae)*. Asoc. Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- Fraga, R. M. y S. A. Salvador. 1986. Biología reproductiva del Chimango (*Polyborus chimango*). *Hornero* 12: 223-229.
- Fraga, R. M., Casañas, H. y G. Pugnalis. 1998. Natural history and conservation of the endangered Saffron-cowled Blacbird *Xanthopsar flavus* in Argentina. *Bird Cons. Int.* 8: 255-267.
- Fraga, R. M., Narosky, S. y H. Rodríguez Moulin. 1984. Hallazgo de un nido de *Phaetornis petrei*. *Hornero* 12: 189-192.
- Frere, E. y P. Gandini. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Santa Cruz. Parte II: de Bahía Laura a Punta Dungeness. Pp.153-177 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Frere, E. y P. Gandini. 2001. Aspects of the breeding biology of the Red-legged Cormorant *Phalacrocorax gaimardi* on the Atlantic coast of South America. *Marine Ornith.* 29: 67-70.
- Frere, E., Gandini, P. y P. D. Boesma. 1992. Effects of nest type and location on reproductive success of the Magellanic Penguin *Spheniscus magellanicus*. *Marine Ornith.* 20: 1-6.
- Frere, E., Gandini, P. y P. D. Boesma. 1996. Aspectos particulares de la biología de reproducción y tendencia poblacional del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en la colonia de Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina. *Hornero* 14: 50-59.
- Frere, E., Gandini, P. A. y T. M. Holik. 1992. Nidificación de *Theristicus melanopis* en la provincia de Santa Cruz. *Hornero* 13: 247-248.
- Frere, E., Gandini, M., Gandini, P. A., Holik, T., Lichtschein, V. y M. Oliva Day. 1993. Variación anual en el número de adultos reproductivos en una nueva colonia de Pingüino Penacho Amarillo *Eudyptes crestatus* (Spheniscidae) en Isla Pingüino (Santa Cruz, Argentina). *Hornero* 13: 293-294.
- Friedmann, H. 1927. Notes on some Argentine Birds. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 68: 139-236.
- Friedmann, H. 1929. *The Cowbirds*. C. C. Thomas. Springfield.
- Friedmann, H. 1931. Additions to the list of birds known to be parasitized by Cowbirds. *Auk* 48: 52-65.
- Friedmann, H. 1938. Additional host of the parasitic Cowbirds. *Auk* 55: 41-50.
- Friedmann, H. 1963. Host relations of the parasitic Cowbirds. *U.S. Nat. Mus. Bull.* 233: 1-276.
- Friedmann, H. 1971. Further informations on the host relations of the parasitic Cowbirds. *Auk* 88: 239-255.
- Friedmann, H. y L. F. Kiff. 1985. The parasitic cwbirds and their host. *Proc. West. Fund. Vert. Zool.* 2: 225-304.
- Friedmann, H., H., Kiff, L. F. y S. I. Rothstein. 1977. A further contribution to the knowledge of the host relations of the parasitic cowbirds. *Smithson. Contr. Zoology* 235: 1-7.
- Frixione, M. G. 2010. The Imperial Shag (*Phalacrocorax atriceps*) in the Nahuel Huapi Lake (northwestern Patagonia, Argentina): distribution, abundance, and potential threats from scavenging birds. *Hornero* 25: 61-65.
- Frixione, M. C., Casaux, R., Villanueva, C. y P. A. E. Alarcón. 2012. Recently established Kelp Gull colony in a freshwater environment supported by an inland refuse dump in Patagonia. *Emu* 112: 174-178.
- Furman, C. y D. Bastías. 2012. Lista de Aves de Lagos de Lugano y alrededores. Buenos Aires.

G

- Galigniana, O. R. 2014. E35892, *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824). www.ecoregistros.org/35892 (acceso 21/02/2015)
- Gallardo, L. M. y J. M. Gallardo. 1984. Observaciones realizadas sobre el comportamiento de *Otus choliba* (Vieillot) (Aves: Strigiformes) en libertad. *Com. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 4: 109-114.
- Gallegos Luque, D. 1984. Aspectos de la biología reproductiva del Tero Común *Vanellus chilensis* (Gmelin). I: Comportamiento y territorialidad. *Hornero* 12: 150-155.
- Galmes, M. A. y J. H. Sarasola. 2011. División de roles durante la reproducción y cuidado parental en el Águila Coronada. Resúmenes, XIV Reunión Argentina de Ornitología, Formosa.
- Gandini, P. y E. Frere. 1995. Distribución, abundancia y ciclo reproductivo del Cormorán Gris *Phalacrocorax gaimardi* en la costa patagónica, Argentina. *Hornero* 14: 57-60.
- Gandini, P. y E. Frere. 1998. Distribución y abundancia de las aves marinas de Santa Cruz. Parte I: La Lobería a Islote del Cabo. Pp. 119–151 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Gandini, P., Frere, E. y D. Boersma. 1997. Efectos de la calidad de habitat sobre el éxito reproductivo del Pigüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, Argentina. *Ornit. Neotr.* 8: 37-48.
- Gandini, P., Frere, E. y D. Boersma. 1999. Nest concealment and its relationship to predation and reproductive success in the Magellanic Penguin at its southern-most continental colony. *Ornit. Neotr.* 10: 145-150.
- García, F. 2013. E31117, *Aramides cajaneus* (Müller, 1776). www.ecoregistros.org/31117 (acceso 22/02/2015)
- García, G. 2012. E16669, *Coragyps atratus* (Bechstein, 1783). www.ecoregistros.org/16669 (acceso 19/02/2015)
- García, C. H. 2012a. E12495, *Haematopus palliatus* (Temminck, 1820). www.ecoregistros.org/12495 (acceso 4/03/2015)
- García, C. H. 2012b. E12494, *Haematopus palliatus* (Temminck, 1820). www.ecoregistros.org/12494 (acceso 4/03/2015)
- García, G. O., Bó, M. S. y P. Yorio. 2014. Prey composition of Peregrine Falcons (*Falco peregrinus cassini*) preying upon a mixed-species seabird colony in Argentine Patagonia. *Ornit. Neotr.* 25: 231-235.
- García, J. 2011. E3177, *Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/3177 (acceso 21/02/2015)
- García, J. 2011. E4059, *Pardirallus sanguinolentus* (Swainson, 1838). www.ecoregistros.org/4059 (acceso 22/02/2015)
- García, M. 1952. Las especies argentinas del género *Philornis* Mein., con descripción de especies nuevas (Dipt. Anthom.). *Rev. Soc. Entomológica Argentina* 15: 277-293.
- García Allievi, J. 2013. E22941, *Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/22941 (acceso 7/11/2015)
- García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2004a. Habitat requirements and selection by Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) in central and northern Patagonia, Argentina. *Auk* 121: 243-252.
- García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2004b. Microhabitat selection by Kelp Gulls, *Larus dominicanus*, in Patagonia, Argentina. *Emu* 104: 241-249.
- García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2007. Breeding habitat requirements and selection by Olrog's Gull (*Larus atlanticus*), a threatened species. *Auk* 124:1201-1212.
- García Borboroglu, P., Yorio, P., Boesma, P. D., Del Valle, H. y M. Bertellotti. 2002. Habitat use and breeding distribution of Magellanic Penguins in northern San Jose Gulf, Chubut, Patagonia, Argentina. *Auk* 119: 233-239.
- García Esponda, C. M., Coria, N. R y D. Montalti. 2000. Breeding birds at Halfmoon Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1995/96. *Marine Ornith.* 28: 59-62.
- Garrido Coria, P. S., Jefferies, M. M., Ciocco, N. F. y P. E. Llambías. 2015. Descripción de

- la Biología Reproductiva del Gorrión Común en una población de Uspallata, Mendoza. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitológia, La Pata, Buenos Aires.
- García Peña, G. E., Hernández, M. A. y L. O. Bala. 2008. Ecología reproductiva del Chorlo Doble Collar (*Charadrius falklandicus*) en Península Valdés, Argentina. *Ornit. Neotr.* 19: 445-452.
- Gavio, H. 1944. Una excursión a los cañadones de la estancia Cari-Lauquen en Santo Domingo. *Hornero* 8: 494-511.
- Gelain, M. A. 1988. El género *Muscisaxicola* en el departamento Bariloche, Pcia. Río Negro. *Gargancho* 6: 7-8.
- Gelain, M. A. 2009. Aporte al conocimiento de la biología reproductiva del Chimango *Milvago chimango* Vieillot 1816 (Aves: Falconiformes). *Xolmis* 4: 13-16.
- Gelain, M. A. 2011. Registro de un nido de Picaflor Común *Chlorostilbon aureoventris* en la Provincia de San Juan. *Xolmis* 2: 1-3.
- Gelain, M. A. 2012a. Segundo nido descripto para San Juan del Picaflor Común *Chlorostilbon aureoventris* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1838). *Xolmis* 12: 1-3.
- Gelain, M. A. 2012b. Aves; provincia de Río Negro, Argentina. Aves de Carri-Laupquen y adyacencias. II. Lista Comentada. *Xolmis* 14: 1-35.
- Gelain, M. A. 2012c. Nidificación del Halconcito Colorado *Falco sparverius* en la provincia de San Juan, Argentina (Aves: Falconidae). *Xolmis* 16: 1-5.
- Gelain, M. A. 2012d. Observaciones urbanas. Utilización de árboles por aves en Villa del Salvador, San Juan. *Xolmis* 21: 1-4.
- Gelain, M. A. 2013. Registros del Carpintero Real *Colaptes melanochloros* en San Juan, República Argentina. *Xolmis* 25: 1-5.
- Gelain, M. A. 2013. Nido de Dormilona *Muscisaxicola albifrons*, Lafresnaye, 1855 área Tronador, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río Negro, Argentina (Aves, Tyrannidae). *Xolmis* 42: 1-5.
- Gelain, M. A. y M. Diez Peña. 2005. Nidificación de la Ratona Aperdizada (*Cistothorus platensis*) en el oeste de Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 49: 24-25.
- Gelain, M. A. y M. Diez Peña. 2007. Notas nidobiología de aves del nordeste de la Patagonia Argentina. Acerca del nido del Sobrepuesto Común *Lessonia rufa* (Gmelin, 1789) en el oeste de Río Negro (Aves: Tyrannidae). *Xolmis* 2: 1-3.
- Geain, M. y L. Sympson. 2007. Acerca del área reproductiva de *Agriornis murina* (d'Orbigny y Lafresnaye, 1837) (Aves: Tyrannidae). *Xolmis* 2: 4-6.
- Gelain, M., Diez Peña, M. y G. Ignazi. 2006. Hallazgo del primer nido del Junquero *Phleocryptes melanops melanops* (Vieillot, 1817) en el oeste de Río Negro. *Xolmis* 1: 5-6.
- Gelain, M. A., Ojeda, V., Trejo, A., Sympson, L., Amico G. y R. Vidal Russell. 2001. Nuevos registros de distribución y nidificación del Aguilucho andino (*Buteo albogularis*) en la patagonia argentina. *Hornero* 16: 85-88.
- Germain, N. 2013. E18377, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/18377 (acceso 4/03/2015)
- Ghys, M. I., Raya Rey, A. y A. Schiavini. 2008. Population Trend and Breeding Biology of Gentoo Penguin in Martillo Island, Tierra Del Fuego, Argentina. *Waterbirds* 31: 625-631.
- Giacomelli, E. 1905. Notes systematiques et biologiques sur les colibris de la province de La Rioja (Republique Argentine). *Annal. Soc. Cient. Argent.* 59: 97-112.
- Giai, A. G. 1950. Notas de viajes. *Hornero* 9: 121-164.
- Giai, A. G. 1952-1953. *Diccionario ilustrado de las aves argentinas*. Mundo Agrario. Ed. Haynes SA.
- Giai, A. G. 1977. El Ñandú *Rhea americana* en el chaco boreal y austral. *Hornero* 11: 420-422.
- Gibson, E. 1879. Ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Buenos Ayres. *Ibis* 1879: 405-424.
- Gibson, E. 1880. Ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Buenos Ayres. *Ibis* 1880: 1-38, 153-169.
- Gibson, E. 1918. Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Part I. Passeres. *Ibis* 10: 363-415.
- Gibson, E. 1920. Further ornithological notes from the neighbourhood of Cape San Antonio, Province of Buenos Ayres. Part III. Phoenicopteridae-Rheidae. *Ibis* 12: 1-97.

- Giovanelli, S. 2014. E37125, *Stercorarius chilensis* (Bonaparte, 1857).
www.ecoregistros.org/37125 (acceso 4/03/2015)
- Girard, P. 1918. Nidos y huevos de Vencejos. *Hornero* 1: 193.
- Girard, P. 1932. Parasitismo del Tiránido, *Legatus leucophaeius*. *Hornero* 5: 64-65.
- Girard, P. 1933. Notas sobre algunas aves de Tucumán. *Hornero* 5: 223-225.
- Giraudo, A. R., Brunello, D. y G. Broggini. 1993. Nidificación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. *Nuestras Aves* 28: 24-25.
- Gochfeld, M. 1979a. Brood parasite an host coevolution: interactions between Shiny Cowbird and two species of Meadowlarks. *Amer. Nat.* 113: 855-870.
- Gochfeld, M. 1979b. Begging by nestling Shiny Cowbird: Adaptive or maladaptive?. *Living Bird* 17: 41-50.
- Gochfeld, M. 1980. Timing of breeding and chick mortality in central and peripheral nests of Magellanic Penguin. *Auk* 97: 191-193.
- Godoy I., Suazo Lara, F., Guerrero, E. L., Rivero, P., González, B., Alegre, M., Godoy, A., Kain, C., Sesto F. y N. R. Chimento. 2012. Relevamiento biótico de la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina). Parte II: Aves. *Historia Natural (Tercera serie)* 2: 57-94.
- Goldstein, M. I. 2000. Nest-site characteristics of Crested Caracaras in La Pampa, Argentina. *J. Raptor Res.* 34: 330-333.
- Gomes, V. 2014. Puna Tinamou (*Tinamotis pentlandii*), Neotropical Birds Online (T. S. Schulenberg, Editor). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology; retrieved from Neotropical Birds Online: http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=63476
- Gómez, D. A. y E. Massoia. 1987. Restos de batracios y pequeños mamíferos en un nido de Leñatero (*Anumbius annumbi*). *Nuestras Aves* 13: 17-19.
- Gómez, N. 2011. E8406, *Podiceps major* (Boddaert, 1783).
www.ecoregistros.org/8406 (acceso 19/02/2015)
- Gómez, S. 2014. E67370, *Anas cyanoptera* (Vieillot, 1816).
- www.ecoregistros.org/67370 (acceso 20/02/2015)
- Gómez, S. 2014. E71642, *Anas bahamensis* (Linnaeus, 1758).
www.ecoregistros.org/71642 (acceso 21/02/2015)
- Gómez, S. 2014. E67223, *Gallinula melanops* (Vieillot, 1819).
www.ecoregistros.org/67223 (acceso 22/02/2015)
- Gómez Umpierrez, W. L. 2014. E35254, *Aramides cajaneus* (Müller, 1776).
www.ecoregistros.org/35254 (acceso 22/02/2015)
- Gómez Umpierrez, W. L. 2015. E81018, *Anas sibilatrix* (Poeppig, 1829).
www.ecoregistros.org/81018 (acceso 20/02/2015)
- Gómez Umpierrez, W. L. 2015. E81291, *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758).
www.ecoregistros.org/81291 (acceso 19/02/2015)
- González, P., Bertellotti, M., Giaccardi, M., Lini, R., Lizurume, M. E. y P. Yorio. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Río Negro. Pp. 29-37 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- González del Solar, R. 1987. Nidificación de *Hymenops perspicillata andina* en la provincia de Córdoba. *Nuestras Aves* 12: 15.
- Goodall, J. M. 1923. Remarks on the eggs of some Argentine Cuckoos and Argentine and Canadian Cowbirds. *Bull. B.O.C.* 43: 63-68.
- Gorosito, C. A. y V. R. Cueto. 2015. Biología reproductiva de *Elaenia albiceps chilensis* en los bosques andino-patagónicos Resúmenes, XVI Reunión de Ornitología. La Plata, Buenos Aires.
- Grande, J. M., Santillán, M. A., Orozco, P. M., Liébana, M. L., Reyes, M. M., Galmes, M. A. y J. Cereghetti. 2015. Barn Swallows keep expanding their breeding range in South America. *Emu* 115: 256-260.
- Grant, C. H. B. 1911. List of the birds collected in Argentina, Paraguay, Bolivia and southern Brazil, with field-notes. Part I y II. *Ibis* 1911: 80-137, 317-350, 459-478.

- Grant, C. H. B. 1912. Notes on some South-American birds. *Ibis* 1: 273-280.
- Graña Grilli, M. y D. Montalti. 2014. Relación entre la estructura y la ubicación del nido del Varillero Ala Amarilla (*Agelasticus thilius*). *Hornero* 29: 37-40.
- Grassini, C. M. 2012. E17757, *Elaenia spectabilis* (Pelzeln, 1868). www.ecoregistros.org/17757 (acceso 21/03/2015)
- Grassini, C. M. 2013. E18565, *Eudromia elegans* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832). www.ecoregistros.org/18565 (acceso 19/02/2015)
- Grassini, C. M. 2013. E21176, *Cairina moschata* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/21176 (acceso 23/09/2015)
- Grassini, C. M. 2015. E125476, *Gallinago paraguaiae* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/125476 (acceso 23/12/2015)
- Grasso, M. B. 2012. E11025, *Tachyeres pteneres* (Forster, 1844). www.ecoregistros.org/11025 (acceso 21/02/2015)
- Gavensky, M. 2015. E75492, *Campephilus melanoleucus* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org/75492 (acceso 4/03/2015)
- Grilli, P. y J. J. Areta. 2003. Nuevo registro de Anambé Verdoso (*Pachyramphus viridis*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 46: 28.
- Grilli, P. G., Pagano, L. G., Juárez, M. C. y G. Marateo. 2013. Nidificación del halcón montés grande (*Micrastur semitorquatus*: Falconiformes: Falconidae) en Argentina y un nuevo caso de usurpación de nido de Guacamayo. *Acta Zool. Lilloana* 57: 235-239.
- Guaraz, J. L. F. 2014. E67867, *Turdus leucomelas* (Vieillot, 1818). www.ecoregistros.org/67867 (acceso 10/03/2015)
- Güller, R., Di Santo, H. y R. Lejarraga. 2004. Nido de Cachirla Pálida (*Anthus hellmayri*) en la Reserva Natural Otamendi, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 48: 12.
- Gusano, S. 2014. E70550, *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/70550 (acceso 20/02/2015)
- Gusano, S. 2014. E70956, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/70956 (acceso 20/02/2015)
- Gusano, S. 2014. E61679, *Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/61679 (acceso 20/02/2015)
- Gusano, S. 2015. E80830, *Gallinula galeata* (Lichtenstein, 1818). www.ecoregistros.org/80830 (acceso 22/02/2015)
- H**
- Haene, E. H., Krapovickas, S. F., Mosquione, F. y D. Gómez. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. *Hornero* 14: 48-52.
- Haene, E., Montañez, A., Carrizo, A., Bodrati, G., Bono, J., Kraus, G., Mérida, E., Nardini, C., Rodríguez, R., Jones, J. y A. Pérez. 2001. Primer inventario de los animales vertebrados del Parque Nacional San Guillermo (provincia de San Juan, república Argentina). *Bol. Soc. Biol. Concepción, Chile* 72: 59-67.
- Handford, P. 1980. Aspects of the annual cycle in highland populations of the Rufous-collared Sparrow, *Zonotrichia capensis*. *Auk* 97: 400-403.
- Handford, P. T. 1983. Breves notas sobre las aves del Valle de Tafí, provincia de Tucumán. *Neotrópica* 29: 97-105.
- Haro, J. G. y M. Gutiérrez. 1992. La avifauna de una forestación de pinos en Río de los Sauces, Córdoba. *Hornero* 13: 214-218.
- Harper, E. C. 1935. Notas sobre algunas aves de Pradere (F.C.O.). *Hornero* 6: 91-94.
- Harper, E. C. y L. Drabble. 1936. Sobre la nidificación de los flamencos (*Phoenicopterus ruber chilensis* Mol.). *Hornero* 6: 249-253.
- Harris, G. 2008. *Guía de aves y mamíferos de la costa patagónica*. Ed. El Ateneo.
- Hartert, E. y S. Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.* 16: 159-267.
- Heredia, A. 2012. E11181, *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin, 1789).

- www.ecoregistros.org/11181 (acceso 21/02/2015)
- Heredia, A. 2012. E17663, *Amazilia versicolor* (Vieillot, 1818).
www.ecoregistros.org/17663 (acceso 21/02/2015)
- Heredia, A. 2016. E138680, *Tachybaptus dominicus* (Linnaeus, 1766).
www.ecoregistros.org/138680 (acceso 19/02/2016)
- Heredia, J. 2009. Sobre dos nidos de Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la provincia de Córdoba Argentina. *Nuestras Aves* 54: 52-53.
- Heredia, J. 2013. Sobre el Carpintero Negro (*Dryocopus schulzii*) en las Sierras de la provincia de Córdoba, Argentina. *Nótaulas Faunísticas (Segunda serie)* 115: 1-7.
- Heredia, J. y J. Piedrabuena. 2010. Registros de nidificación del Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) en las Sierras Grandes de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 55: 37-39.
- Heredia, J. y S. A. Salvador. 2014. Comportamiento ecológico y primer descripción del nido del Arañero Corona Rojiza (*Myioborus brunniceps*) en el centro de Argentina. *Historia Natural* 4 (1): 55-62.
- Heredia, J., Klavins, J. y P. Nieto. 1999. Primera descripción de la nidificación del Carpintero Negro (*Dryocopus schulzii*). *Nuestras Aves* 40: 3.
- Herrera, G., Punta, G. y P. Yorio. 2006. Diet specialization of the threatened Olrog's Gull *Larus atlanticus* during the breeding season at Golfo San Jorge, Argentina. *Bird Cons. Int.* 15:89-97.
- Hevia, G. D. 2013. E25306, *Charadrius falklandicus* (Latham, 1790).
www.ecoregistros.org/25306 (acceso 4/03/2015)
- Hiraldo, F., Donázar, J. A., Ceballos, O., Travaini, A., Bustamante, J. y M. Funes. 1995. Breeding biology of a Grey Eagle-Buzzard population in Patagonia. *Wilson Bull.* 107: 675-685.
- Höhn, E. O. 1975. Notes on Black-Headed Ducks, Painted Snipe and Spotted Tinamous. *Auk* 92: 566-575.
- Holland, A. H. 1890. On some birds of the Argentine Republic. Wiht Notes by P. L. Sclater. *Ibis* 1890: 424-428.
- Holland, A. H. 1891. Further notes on the birds of the Argentine Republic. With Remark by P. L. Sclater. *Ibis* 1891: 16-20.
- Holland, A. H. 1892. Short notes on the birds of the Estancia Espartilla, Argentine Republic. *Ibis* 1892: 193-214.
- Holland, A. H. 1893. Field-Notes on the birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. With Remarks by P. L. Sclater. *Ibis* 1893: 483-488.
- Holland, A. H. 1895. Field-Notes on the birds of the Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. With Remarks by P. L. Sclate Hudson r. *Ibis* 1895: 213-217.
- Holland, A. H. 1896. Field-Notes on the birds of the Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. Part III. With Remarks by P. L. Sclater. *Ibis* 1896: 315-318.
- Holland, A. H. 1897. Field-Notes on the bierds of the Estancia Sta. Elena, Argentina Republic. Part IV. With Remarks by P. L. Sclater. *Ibis* 1897: 166-169.
- Horvath, L. y G. Topal. 1963. The zoological re-sults of Gy. Topal"s collectings in South Argentina. Aves. *Annal. Hist. Nat. Mus. Nat. Hungarici Zool.* 55: 531-542
- Hoy, G. 1967. The eggs and nesting ground of the Puna Plover. *Auk* 84: 130-131.
- Hoy, G. 1968. Über brutbiologie und eier einiger vögel aus Nordwest-Argentinien. *J. Ornith.* 109: 425-433.
- Hoy, G. 1969. Addenda a la avifauna salteña. *Hornero* 11: 53-56.
- Hoy, G. 1971. Über brutbiologie und eier einiger vögel aus Nordwest-Argentinien. II. *J. Ornith.* 112: 158-163.
- Hoy, G. 1975. Le nid et les oeufs de *Triophaga punensis* (Berlepsch et Stolzmann); (Furnariidé). *L' Oiseau* 45: 189-191.
- Hoy, G. 1976a. Notas nidológicas del noroeste argentino. *Physis* 35: 205-209.
- Hoy, G. 1976b. Le nid et les oeufs de *Pseudoseisura gutturalis* (D'Orb. et Lafr.) (Furnariidé). *L' Oiseau* 46: 71-73.
- Hoy, G. 1980a. Notas nidobiológicas del noroeste argentino. II. *Physis* 39: 63-66.
- Hoy, G. 1980b. Notas sobre la nidobiología de la "Dormilona Cenicienta" *Muscisaxicola cinerea argentina* Hellmayr (aves, Tyrannidae). *Hist. Nat.* 1: 180.

- Hoy, G. y J. Ottow. 1964. Biological and oological studies of the Molotrine Cowbirds (Icteridae) of Argentina. *Auk* 81: 186-203.
- Hudson, W. H. 1870a. First letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870: 87-89.
- Hudson, W. H. 1870b. Thrid letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870: 158-160.
- Hudson, W. H. 1870c. Sixth letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870: 545-547.
- Hudson, W. H. 1870d. A seventh letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870: 671-673.
- Hudson, W. H. 1870e. Eighter letter on the ornithologi of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870: 748-750.
- Hudson, W. H. 1870f. Ninth letter on the ornithologii of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1870: 798-802.
- Hudson, W. H. 1871a. Tenth letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1871: 4-7.
- Hudson, W. H. 1871b. Twelfth letter on the ornithology of Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1871: 326-329.
- Hudson, W. H. 1872a. On the birds of the Río Negro of Patagonia. With notes by P. L. Sclater. *Proc. Zool. Soc. London* 1872: 534-550.
- Hudson, W. H. 1872b. On the habits of the Swallows of the Genus *Progne* met whit in the Argentina Republic. With notes by P. L. Sclater. *Proc. Zool. Soc. London* 1872: 605-609.
- Hudson, W. H. 1872c. Notes on the habits of the Churrinche (*Pyrocephalus rubineus*). *Proc. Zool. Soc. London* 1872: 808-810.
- Hudson, W. H. 1873. Notes on the habits of the Pipit of the Argentina Republic. *Proc. Zool. Soc. London* 1873: 771-772.
- Hudson, W. H. 1874a. Notes on the procreant instinct of the three species of *Molothrus* in Buenos Ayres. *Proc. Zool. Soc. London* 1874: 153-174.
- Hudson, W. H. 1874b. On the habits of the Burrowing Owl (*Pholeoptynx cunicularia*). *Proc. Zool. Soc. London* 1874: 308-311.
- Hudson, W. H. 1876. Notes on the Rails of the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London* 1876: 102-109.
- Hudson, W. H. 1885. Notes on the Birds of the Genus *Homorus* observed in the Argentine Republic. *Ibis* 1885: 83-286.
- Humphrey, P. S. y B. C. Livezey. 1985. Nest, eggs, and downy young of the White-headed Flightless Steamer-Duck. *Ornithological Monographs* 36: 945-953.
- Humphrey, P. S. y R. T. Peterson. 1978. Nesting behavior and affinities of Monk Parakeets of southern Buenos Aires province, Argentina. *Wilson Bull.* 90: 544-552.
- Humphrey, P. S., Bridge, D., Reynolds, P. W. y R. T. Peterson. 1970. *Birds Isla Grande (Tierra del Fuego)*. Univ. Kansas Mus. Nat. Hist. Washington.
- Hussey, R. F. 1916. Notes on some spring birds of La Plata. *Auk* 33: 384-399.
- I**
- Ianiro, J. L. 2015. E112583, *Turdus falcklandii* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org/112583 (acceso 20/12/2015)
- Ibañez, L. M., Girini, J. M., Palacio, F. X. y D. Montalti. 2014. Nidificación y alimentación de psittácidos introducidos en el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 29: 13-22.
- Ibañez, L., del Huerto, M., Fiorini, V. D. y D. Montalti. 2011. Reproducción del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*), una especie exótica, en Buenos Aires. Resúmenes XIV Reunión Argentina de Ornitología, Formosa.
- Idoeta, F. M., Roda, M. A. y I. Roesler. 2010. La Golondrina Tijerita *Hirundo rustica* sigue expandiendo su área de nidificación en Argentina. *Cotinga* 33: OL 58-60.
- Ignazi, G. O. 2015. Ground Nesting by Black-chested Buzzard-Eagles (*Geranoaetus melanoleucus*). *J. Raptor Res.* 49:101-103.
- Ilincheta, A. 2011. E9917, *Chordeiles nacunda* (Vieillot, 1817). www.ecoregistros.org/9917 (acceso 4/03/2015)
- Imberti, S. 2003. Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. *Cotinga* 19: 15-24.
- Imberti, S. 2005. *Aves de Los Glaciares. Inventario ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Aves Argentinas y Ad. Parques Nacionales*.

- Imberti, S. y C. Albrieu. 2001. *Lista de las Aves de Laguna Nimez*. Univ. Nac. Patagonia Austral.
- Imberti, S., Amorós, C. D. y S. A. Cadierno. 2007. Presencia y nidificación del Cauquén colorado *Chloephaga rubidiceps* en la provincia de Santa Cruz, Argentina. *Hornero* 22: 17-22.
- Isola, P. 2015. E115674, *Coragyps atratus* (Bechstein, 1783). www.ecoregistros.org/115674 (acceso 21/12/2015)
- Isola, P. 2016. E134229, *Thinocorus orbignyanus* (Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831). www.ecoregistros.org/134229 (acceso 21/01/2016)
- J**
- Jahn, A. E., Tuero, D. T., Mamani, A. M., Bejarano, V., Masson, D. A. y E. Aguilar. 2014. Drivers of clutch-size in Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus savana*) at temperate and tropical latitudes in South America. *Emu* 114: 337-342.
- Jehl, J. R. Jr. 1975. *Pluvianellus socialis*: biology, ecology and relationships of an enigmatic Patagonian shorebirds. *Trans. San Diego Soc. Nat. Hist.* 18: 29-73.
- Jehl, J. R. 1978. A new hybrid Oystercatcher from South America, *Haematopus leucopodus* X *H. ater*. *Condor* 80: 344-346.
- Jehl, J. R. y M. A. E. Rumboll. 1976. Notes on the avifauna of Isla Grande and Patagonia, Argentina. *Trans. San Diego Soc. Nat. Hist.* 18: 145-154.
- Jenny, J. 1997. Unusual breeding behavior of the Guira Cuckoo *Guira guira*. *Cotinga* 7: 18.
- Jordan E. A. y A. E. Frutos. 2015. Nidificación de la Choca Listada *Thamnophilus doliatus* en el sur del río Paraná. Resúmes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Jordan, E., Pagano, L. e I. Roesler. 2013. Primera descripción del nido y pichones del Milano de Corbata (*Harpagus diodon*) en Argentina. *Nuestras Aves* 58: 44-45.
- Josens, M. L., Pretelli, M. G. y A. H. Escalante. 2009. Censos de aves acuáticas en sus colonias reproductivas en lagunas del sudeste de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 24: 7-12.
- Juárez, M. C., Marateo, G., Grilli, P., Pagano, L., Rumi, M. y M. Silva Croome. 2011. Observaciones sobre la nidificación del Guacamayo Verde (*Ara militaris*: Psittaciformes: Psittacidae) en Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 55: 272-277.
- Juárez, M. C., Marateo, G., Grilli, P., Pagano, L., Rumi, M. y M. Silva Croome. 2012. Estado del conocimiento y nuevos aportes sobre la historia natural del Guacamayo Verde (*Ara militaris*). *Hornero* 27: 5-16.
- Juliano, R. 2014. E57232, *Tachyeres patachonicus* (King, 1828). www.ecoregistros.org/57232 (acceso 21/02/2015)
- Juliano, R. 2014. E73447, *Anas sibilatrix* (Poeppig, 1829). www.ecoregistros.org/73447 (acceso 20/02/2015)
- Juliano, R. 2014. E64922, *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org/64922 (acceso 19/02/2015)
- Juszczuk, D. 2014. E65007, *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). www.ecoregistros.org/65007 (acceso 19/02/2015)
- Juszczuk, D. 2014. E32485, *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764). www.ecoregistros.org/32485 (acceso 30/10/2015)
- K**
- Kahl, M. P. 1971. Observations on the Jabiru and Maguari Storks in Argentina, 1969. *Condor* 73: 220-229.
- Keith, A. R. 1970. Bird observations from Tierra del Fuego. *Condor* 72: 361-363.
- Kerr, J. G. 1892. On the Avifauna of the Lower Pilcomayo. *Ibis* (1892): 120-152.
- Keve, A. y A. Kovács. 1971. Notas taxonómicas sobre el Chingolo (*Zonotrichia capensis*) del sud-oeste Argentino. *Hornero* 11: 83-92.
- King, J. R. 1973. Reproductive relationships of the Rofous-Collared Sparrow an the Shiny Cowbird. *Auk* 90: 19-34.
- Kirwan, G. M., Bodrati, A. y K. Cockle. 2010. The nest of the Bay-ringed Tyrannulet (*Phylloscartes sylviolus*), a little-known Atlantic forest endemic, supports a close

- relationship between *Phylloscartes* and *Pogonotriccus*. *Ornit. Neotr.* 21: 397-408.
- Klavins, J. y D. Álvarez. 2012. El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 27-29.
- Klimaitis, J. F. 1973. Estudio descriptivo de una colonia de Tordos Varilleros (*Agelaius ruficapillus*). *Hornero* 11: 193-202.
- Klimaitis, J. F. 1975. Observaciones ornitológicas. *Hornero* 11: 325-327.
- Klimaitis, J. F. 1984. Nota sobre el nido de la mosqueta Vientre Amarillo (*Phylloscartes ventralis*) en Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 12: 203-204.
- Klimaitis, J. F. 1984. Hallazgo del Tordo de Cabeza Amarilla en la provincia de Entre Ríos. *Nuestras Aves* 4: 7-8.
- Klimaitis, J. F. 1986a. Un nido dentro de una flor. *Nuestras Aves* 11: 24-25.
- Klimaitis, J. F. 1986b. Observaciones sobre el Varillero Amarillo *Xanthopsar flavus* en la provincia de Entre Ríos, Argentina. *Gargancho* 1: 1-4.
- Klimaitis, J. F. y S. M. Borba. 2016. Nidificación del Chorlito de Collar *Charadrius collaris* en Berisso, provincia de Buenos Aires. *Gargancho (Nueva serie)* 8: 1-11.
- Klimaitis, J. F. y F. Moschione. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada en *Charadrius collaris*, *Sterna superciliaris* y *Rynchops nigra* en el Río Uruguay, Entre Ríos, Argentina. *Hornero* 12: 197-202.
- Klimaitis, J. F. y F. Moschione. 1987. *Aves de la Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara y sus alrededores*. Minist. Econ. Buenos Aires.
- Klimaitis, J. F., Milat, J. A. y S. M. Borba. 2014. Biología reproductiva, comportamiento y generalidades del Chotoy *Schoeniophylax phryganophilus* (Fam. Furnariidae) en Berisso, Buenos Aires, Argentina. *Gargancho (Nueva serie)* 6: 1-44.
- Koehler, W. 2014. E44079, *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org/44079 (acceso 19/02/2015)
- Konter, A. 2012. The Falkland Islands' White-tufted Grebe *Rollandia rolland rolland* (Quoy & Gaimard 1824). *Ferretia* 67: 75-120.
- Korschewski, P. 1969a. El Pingüino de Magallánico (*Spheniscus magellanicus*), observaciones sobre su nidificación, costumbres y comportamiento. *Hornero* 11: 20-26.
- Korschewski, P. 1969b. Observaciones sobre aves del Litoral Patagónico. *Hornero* 11: 48-52.
- Krause, L. O. 2015. E73303, *Sporophila iberaensis*. www.ecoregistros.org/73303 (acceso 14/01/2016)
- Krauzuk, E. R. 2000. Presencia de *Chordeiles pusillus* como nidificante en la provincia de Misiones, Argentina. *Ornit. Neotr.* 11: 85-86.
- Krauzuk, E. R. 2013. Algunos aspectos de la biología de *Chordeiles pusillus* en Misiones Argentina y apuntes sobre otros Caprimulgiformes. *Atualidades Ornitológicas* 73: 58-68.
- L**
- Lago, N. 2012. E16372, *Charadrius falklandicus* (Latham, 1790). www.ecoregistros.org/16372 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E324, *Elanus leucurus* (Vieillot, 1818). www.ecoregistros.org/324 (acceso 21/02/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E762, *Accipiter bicolor* (Vieillot, 1817). www.ecoregistros.org/762 (acceso 21/02/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E828, *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org/828 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E824, *Hydropsalis torquata* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/824 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E350, *Cacicus solitarius* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/350 (acceso 6/03/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E951, *Phrygilus carbonarius* (Lafresnaye & D'Orbigny, 1837). www.ecoregistros.org/951 (acceso 7/11/2015)
- La Grotteria, J. 2010. E456, *Sporophila collaris* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/456 (acceso 7/11/2015)
- La Grotteria, J. 2011. E967, *Oxyura vittata* (Philippi, 1860). www.ecoregistros.org/967 (acceso 20/02/2015)

- La Grotteria, J. 2011. E1140, *Campephilus magellanicus* (King, 1828).
www.ecoregistros.org/1140 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2012. E15998, *Anas flavirostris* (Vieillot, 1816).
www.ecoregistros.org/15998 (acceso 21/02/2015)
- La Gratteria, J. 2012. E11883, *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758).
www.ecoregistros.org/11883 (acceso 21/02/2015)
- La Grotteria, J. 2012. E15719, *Fulica gigantea* (Eydoux & Souleyet, 1841).
www.ecoregistros.org/15719 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2012. E16401, *Arundinicola leucocephala* (Linnaeus, 1764).
www.ecoregistros.org/16401 (acceso 30/10/2015)
- La Grotteria, J. 2013. E19254, *Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1819).
www.ecoregistros.org/19254 (acceso 21/02/2015)
- La Grotteria, J. 2013. E29557, *Pseudoscops clamator* (Vieillot, 1807).
www.ecoregistros.org/29557 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2013. E30446,
Campylorhynchus turdinus (Wied, 1821).
www.ecoregistros.org/30446 (acceso 10/03/2015)
- La Grotteria, J. 2013. E30345, *Cacicus chrysopterus* (Vigors, 1825).
www.ecoregistros.org/30345 (acceso 6/03/2015)
- La Grotteria, J. 2014. E70512, *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819).
www.ecoregistros.org/70512 (acceso 19/02/2015)
- La Grotteria, J. 2014. E71058, *Asio stygius* (Wagler, 1832).
www.ecoregistros.org/71058 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2014. E45549, *Enicognathus ferrugineus* (Müller, 1776).
www.ecoregistros.org/45549 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2014. E37873, *Phytotoma rara* (Molina, 1782).
www.ecoregistros.org/37873 (acceso 4/03/2015)
- La Grotteria, J. 2014. E 122953, *Pachyramphus validus* (Lichtenstein, 1823).
www.ecoregistros.org/122953 (acceso 4/12/2015)
- Lambertucci, S. A. y O. A. Mastranduoni. 2008. Breeding behavior of a pair of free-living Andean Condors. *J. Field Ornith.* 79: 147-151.
- Lambertucci, S. A., Barbar, F., Cabrera C y M. Bertini. 2009. Comentarios sobre las aves de la Sierra de Pailemán, Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 81-87.
- Lamela, J. L. 2012a. E15689, *Chauna torquata* (Oken, 1816). www.ecoregistros.org/15689 (acceso 19/02/2015)
- Lamela, J. L. 2012b. E15692, *Chauna torquata* (Oken, 1816). www.ecoregistros.org/15692 (acceso 19/02/2015)
- Lammertink, M. y J. Klavins. 2012. Nest and fledgling of the Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*). *Ornit. Neotr.* 23: 455-460.
- Lancaster, D. A. 1964. Biology of the Brushlaid Tinamou, *Nothoprocta cinerascens*. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist. New York* 127: 271-314.
- Lancelotti, J. L., Pozzi, L. M., Márquez, F., Yorio, P. y M. A. Pascual. 2009. Waterbird occurrence and abundance in the Strobel Plateau, Patagonia, Argentina. *Hornero* 24: 13-20.
- Lange, C.E. 1981. Una temporada de observaciones sobre *Podiceps gallardoi* (Aves, Podicipedidae). *Neotrópica* 27: 39-56.
- Lanyon, W. E. 1978. Revision of the *Myiarchus* Flycatcher of South America. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 161: 429-627.
- Laredo, C. D. 1987. Nota sobre la nidificación de *Anas cyanoptera* Vieillot, en el oeste de Tucumán. Resúmenes VI RAO: 19. Tucumán.
- Laredo, C. D. 1996. Observations on migratory and resident shorebirds in lakes in the highlands of north-western Argentina. *Int. Wader Stud.* 8: 103-111.
- Larracoechea, G., Durán, H. y C. D'Acunto. 2012. Nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en el Balneario arroyo Pareja, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 1-19.
- Laramendy, R. 2014. E53052, *Syrigma sibilatrix* (Temminck, 1824).

- www.ecoregistros.org/53052 (acceso 21/02/2015)
- La Sala, L. F., Pérez, A., Martorelli, S. y J. Smits. 2011. Breeding biology of Olrog's Gull in Bahía Blanca estuary, Argentina. *Wilson Jour. Ornith.* 123: 243-250.
- Las Heras, M. 2015. E80394, *Melanerpes cactorum* (D'Orbigny, 1840). www.ecoregistros.org/80394 (acceso 4/03/2015)
- Laterra, P. 1977. Nidificación de *Asio flammeus* en la zona ribereña de la Capital Federal. *Hornero* 11: 436.
- Leiva, L. A., Verón, S. M. y M. D. Acosta. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina. *Serie Catálogo* Nº 18: 1-68.
- Leveque, R. 1979. Nidification du tyran bentevi *Pitangus sulphuratus* dans le Chubut (Argentine). *Alauda* 47: 116.
- Libenson, L. 1997. Aspectos de la biología reproductiva de *Phalacrocorax magellanicus* y *P. albiventer* en el puerto de Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina). *Neotrópica* 43: 73-77.
- Lichtenstein, G. 1998. Parasitism by Shiny Cowbird of Rufous-Bellied Thrushes. *Condor* 100: 680-687.
- Lichtenstein, G. 2001a. Low success of Shiny Cowbird chicks parasitizing Rufous-bellied Thrushes: chick-chick competition or parental discrimination?. *Anim. Behav.* 61: 401-413.
- Lichtenstein, G. 2001b. Selfish begging by Screaming Cowbirds a mimetic brood parasite of the Bay-winged Cowbird. *Anim. Behav.* 61: 1151-1158.
- Liddle, G. M. 1994. Interannual variation in the breeding biology of the Antarctic prion *Pachyptila desolata* at Bird Island, South Georgia. *J. Zool. Lond.* 234: 125-139.
- Liébana, M. S. 2015. Ecología del Halcón Plomizo (*Falco femoralis*) en groecosistemas pampeanos. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
- Liébana, S., Sarasola, J. H. y S. Bó. 2009. Parental care and behavior of breeding American Kestrels (*Falco sparverius*) in central Argentina. *J. Raptor Res.* 43: 338-344.
- Liébana, M. L., Sarasola, J. H. y M. A. Santillán. 2013. Nest-box occupancy by Neotropical raptors in a native forest of central Argentina. *J. Raptor Res.* 47: 208-213.
- Liljeström, C., Schiavini, A. y J. C. Reboreda. 2009. Chilean Swallows (*Tachycineta meyeri*) adjust the number of feathers added to the nest with time of breeding. *Wilson Jour. Ornith.* 121: 783-788.
- Liljeström, C., Schiavini, A. y J. C. Reboreda. 2012. Time of breeding and female condition affect chick-growth in the Chilean Swallow (*Tachycineta meyeri*). *Emu* 112: 157-161.
- Liljeström, M., Laura Fasola, L., Valenzuela, A., Raya Rey, A. y A. Schiavini. 2014. Nest Predators of Flightless Steamer-Ducks (*Tachyeres pteneres*) and Flying Steamer-Ducks (*Tachyeres patachonicus*). *Waterbirds* 37: 210-214.
- Liljeström, M., Schiavini, A., Sáenz Samaniego, R. A., Laura Fasola, L. y A. Raya Rey. 2013. Kelp Geese (*Chloephaga hybrida*) and Flightless Steamer-Ducks (*Tachyeres pteneres*) in the Beagle Channel: the importance of islands in providing nesting habitat. *Wilson J. Ornith.* 125: 583-591.
- Lishman, C. y E. Nol. 2012. Ecology and hábitat selection of the Magellanic Plover (*Pluvianellus socialis*): A Little-known patagonian shorbird. *Wilson J. Ornith.* 124: 487-496.
- Lisnizer, N., García-Borboroglu, P. y P. Yorio. 2014. Demographic and breeding performance of a new Kelp Gull *Larus dominicanus* colony in Patagonia, Argentina. *Ardeola* 61: 3-14.
- Lizurume, M. E., Yorio, P. y M. Giaccardi. 1995. Biología reproductiva de la Gavita Capucho Café *Larus maculipennis* en Trelew, Patagonia. *Hornero* 14: 27-32.
- Llambías, P. E. 2012. How do Southern House Wrens *Troglodytes aedon musculus* achieve polygyny? An experimental approach. *J. Ornithol.* 153: 571-578.
- Llambías, P. E. y G. J. Fernández. 2009. Effects of nestboxes on the breeding biology of southern House Wrens *Troglodytes aedon bonariae* in the southern temperate zone. *Ibis* 151: 113-121.

- Llambías, P. E. y V. Ferretti. 2003. Parental care in the Great Kiskadee. *Wilson Bull.* 115: 214-216.
- Llambías, P. E., Ferratti, V., Cardoni, D. A. y J. E. Maldonado. 2009. Breeding success and social mating system of the Bay-capped Wren-Spinetail (*Spartonoica maluroides*). *Wilson J. Ornith.* 121: 803-807.
- Llambías, P. E., Garrido, P. S., Jefferies, M. M. y G. J. Fernández. 2015a. Divergencia en el sistema social y los patrones de cuidado parental entre *Cistothorus platensis platensis* y *Cistothorus platensis stellaris*. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Llambías, P. E., Jefferies, M. M., Garrido Coria, P. S. y D. A. Cáceres. 2015b. Biología reproductiva de la Ratona Aperdizada (*Cistothorus platensis platensis*) en Mendoza, Argentina: un contraste con *C. platensis stellaris* en el norte templado. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Llanos, F. A., Failla, M., García, G. J., Giovine, P. M., Carbajal, M., González, P. M., Paz Barreto, D., Quillfeldt, P. y J. F. Masello. 2011. Birds from the endangered Monte, the Steppes and Coastal biomes of the province of Río Negro, northern Patagonia, Argentina. *Check List* 7: 782-797.
- Lobo Allende, R. y P. Caplonch. 2016. Notas ecológicas sobre la Marineta Chaqueña (*Eudromia formosa*). *Historia Natural (Tercera serie)* 6 (1): 25-39.
- Lobo Allende, I. R., Echeverría, A. L. y M. D. Juri. 2010. Distribución y abundancia de cuatro especies de aves endémicas del monte, en Catamarca y La Rioja, Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 54: 129-138.
- Lomáscolo, S. B., Monmany, A. C., Malizia, A. y T. E. Martin. 2010. Flexibility in Nest-Site Choice and Nesting Success of *Turdus rufiventris* (Turdidae) in a Montane Forest in Northwestern Argentina. *Wilson J. Ornith.* 122: 674-680.
- Lönnberg, E. 1903. On a collection of birds from northwestern Argentina and the Bolivian Chaco. *Ibis* 1903: 441-471.
- López, L. O. 2014. E69319, *Pardirallus sanguinolentus* (Swainson, 1838). www.ecoregistros.org/69319 (acceso 22/02/2015)
- López Lanús, B. 1997. *Inventario de las aves del Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, Argentina*. Monografía Especial. L.O.L.A. Buenos Aires.
- López Lanús, B. y H. Rodríguez Goñi. 2004. Arasarí Banana (*Baillonius bailloni*) muerto al depredar un nido de Carpintero Oliva Manchado (*Veniliornis spilogaster*). *Nuestras Aves* 47: 16-17.
- López Lanús, B. y M. A. Roda. 1987. Nidificación de Anhinga en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 12: 13-14.
- López Lanús, B., Di Giacomo, A. G. y M. Babarskas. 1999. Estudios sobre la ecología y comportamiento de la Pajonalera Pico Recto *Limnoctites rectirostris* en la Reserva Otamendi, Buenos Aires, Argentina. *Cotinga* 12: 61-63.
- López Lanús, B., Raggio, J. M. y C. D'acunto. 2008. El doradito sin nombre. Resúmenes, XII Reunión Argentina de Ornitología. Neuquén.
- López Lanús, B., Güller, R., Veiga, J. O., Amoros, P., Melo, O., García, G., Ragonesi, M., Bodrati, G. y P. Güller. 2012. Descripción del pichón del Burrito Negruzco (*Porzana spiloptera*). *Hornero* 27: 195-198.
- Lorenzo, L. E. 2011. E28165, *Bubo virginianus* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org/28165 (acceso 4/03/2015)
- Lorenzo, 2013. E23016, *Stercorarius chilensis* (Bonaparte, 1857). www.ecoregistros.org/23016 (acceso 4/03/2015)
- Lorenzo, L. E. 2014. E42098, *Tityra inquisitor* (Lichtenstein, 1823). www.ecoregistros.org/42098 (acceso 10/03/2015)
- Lorenzón, R. E. y M. A. Quiroga. 2012. Breeding biology of the White-rumped Swallow (*Tachycineta leucorrhoa*; Hirundinidae) in a wetland: a comparative approach. *Avian Biol. Res.* 5: 47-53.
- Lowe, P. R. 1934. On the evidence for the existence of two species of steamer duck (*Tachyeres*) and primary and secondary flightless-ness in birds. *Ibis* 4: 467-495.
- Lucero, F. 2009. Aves nuevas, raras o con pocos registros para las provincias de Mendoza y San Juan. *Nuestras Aves* 54: 57-62.
- Lucero, F. 2012. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución de las aves

- en la provincia de La Rioja. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 112: 1-6.
- Lucero, F. 2013. Nueva variante en la vocalización del burrito negruzco (*Porzana spiloptera*) y el hallazgo de indicios de su reproducción en la provincia de San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 132: 1-7.
- Lucero, F. 2014. Descripción del nido y posturas de la viudita chica (*Knipolegus hudsoni*) en la provincia de San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 160: 1-5.
- Lucero, F. y F. Izasa. 2015. Primeros registros, nuevas localidades, observación de aves con documentación escasa y evidencias de nidificación para las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, Argentina. *EcoRegistros Revista 5* (8): 18-48.
- Luciano, D. 1988. Observaciones sobre un nido de Azor Común *Accipiter striatus*. *Gargancho 5*: 10.
- Luczywo, A., Sánchez, J. M., Chorolque, E., Fernández, N. y S. Peluc. 2013. Biología reproductiva del Pepitero de Collar (*Saltator aurantirostris*) en el bosque chaqueño de Córdoba. Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Lyon, B. E. 1997. Spatial patterns of Shiny Cowbird brood parasitism on Chestnut-capped Blackbird. *Anim. Behav.* 54: 927-939.
- Lyon, B. E. y J. M. A. Eadie. 2004. An obligate brood parasite trapped in the intraspecific arms race of its hosts. *Nature* 432: 390-393.
- Lyon, B. E. y J. M. A. Eadie. 2013. Patterns of host use by a precocial obligate brood parasite, the Black-headed Duck: ecological and evolutionary considerations. *Chinise Birds* 4: 71-85.
- M**
- Macaida, G. 2015. E76958, *Aramus guarauna* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/76958 (acceso 22/02/2015)
- Mac Donagh, E. J. 1933. Observaciones sobre el nido del “Junquero” (*Phleocryptes melanops*). *Hornero* 5: 199-204.
- Mac Donagh, E. J. 1944. Comportamiento diferencial de Gaviotas y Cuervillos en la colonia mixta de nidos flotantes. *Mus. La Plata* 9: 591-625.
- Maceda, J. J. 2007a. Jagüel del Monte. En Di Giacomo, A. S., De Francesco, M. V. y E. G. Conquier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 245-247. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Maceda, J. J. 2007b. Biología y conservación del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en Argentina. *Hornero* 22: 159-171.
- Maceda, J. J. 2009. Nidificación del Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis* Sclater y Salvin 1873) y presencia del Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri* Oustalet 1892) (Aves: Tyrannidae) en la provincia de La Pampa, Argentina. *Xolmis* 4: 9-12.
- Maceda, J. J. y M. S. Kin. 2001. Lista de las aves de la Facultad de Agronomía de Santa Rosa (La Pampa) y sus alrededores. *Rev. Fac. Agronomía UNLPam.* 12: 21-30.
- Maceda, J. J., Mero, M. I., Riesco, H. y M. Dolsan. 2001. Lista de las aves de la Reserva Parque Luro, La Pampa. *Rev. Fac. Agronomía UNLPam* 12: 47-59.
- Maclean, G. L. 1969a. The nest and eggs of the Chocolate Tyrant, *Neoxolmis rufiventris*. *Auk* 86: 134.
- Maclean, G. L. 1969b. A study of seedsnipe in southern South America. *Living Bird* 8: 33-80.
- Mac Nutt, J. W. 1984. A Peregrine Falcon polymorph: observations of the reproductive behavior of *Falco kreyenborgi*. *Condor* 86: 378-382.
- Mac Cracken, K. G., Alza, L. A., Mac Cracken, T. G. y M. M. Smith. 2012. Parasitism and joint incubation of upland Goose (*Chloephaga picta*) nest by Yellow-billed Pintail (*Anas georgica*). *Ornit. Neotr.* 23: 287-290.
- Mac Kinney, F. y G. Brewer. 1989. Parental attendance and brood care in four Argentine dabbling ducks. *Condor* 91: 131-138.
- Maders, C. J. y V. Matuchaka. 2011. Descripción de nido, huevos y pichones de

- la Tovaca Común (*Chamaea campanisona tshororo*). *Nuestras Aves* 56: 10-11.
- Madroño Ñieto, A. M. Pearman. 1993. Distribution, status and taxonomy of the near-threatened Black-bodies Woodpecker *Dryocopus schulzi*. *Bird Cons. Int.* 2: 253-271.
- Mahler, B., Lovette, I., Confalonieri, V. y J. C. Reboreda. 2007. Partial host fidelity in nest selection by the shiny cowbird (*Molothrus bonariensis*), a highly generalist avian brood parasite. *J. Evolut. Biol.* 20: 1918-1923.
- Mahler, B., Sarquis Adamson, Y., Di Giacomo, A.G., Confalonieri, V.A. y J.C. Reboreda. 2009. Utilization of a new host in the host-specialist brood parasite *Molothrus rufoaxillaris*: host switch or host acquisition?. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 63: 1603-1608.
- Malacalza, V. E. 1984. Biología reproductiva de *Phalacrocorax albiventer*. I. Nidificación en Punta Tombo. *Cont. Centro Nac. Patagónico* 98: 1-13.
- Malacalza, V. E. 1987. Aspectos de la biología reproductiva de la Gaviota Cocinera, *Larus dominicanus*, en Punta León, Argentina. *Physis* 45: 11-17.
- Malacalza, V. E. 1995. Aportes al conocimiento de la biología reproductiva de *Phalacrocorax magellanicus* (Aves: Phalacrocoracidae). *Neotrópica* 41: 27-30.
- Malacalza, V. E. y J. R. Navas. 1996. Biología y ecología reproductiva de *Phalacrocorax albiventer* (Aves: Phalacrocoracidae) en Punta León, Chubut, Argentina. *Ornit. Neotr.* 7: 53-61.
- Mallet, J., Santillán, M. A., Liébana, M. S. y J. M. Grande. 2013. Reocupación de nidos por el Carancho: posible efecto de un área protegida. Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Manassero, M. y H. Luna. 2012. Registros documentados y evidencia actual para aves en el nordeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. *Biológica* 15: 94-100.
- Manrique, R. E. 1988. Etología reproductiva de la Gaviota Austral (*Leucophaeus scoresbii*) en Punta Tombo, Chubut, Argentina (Aves: Laridae). Pp. 10 (en *Ornit. Argentina-Paraguay*, Edit. J. R. Contreras).
- Maragliano, R. y D. Montalti. 1997. Estatus de residencia, categorización trófica y abundancia de aves en el Zoológico de La Plata, Argentina. *Doñana* 24: 103-114.
- Marateo, G., Povedano H. y J. Alonso. 2008. Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. *Cotinga* 31: 47-60.
- Marateo, M. M. 1977. Notas sobre nidos de Junquero (*Phleocryptes melanops*). *Hornero* 11: 434-435.
- Marcaida, G. 2014. E66939, *Lophonetta specularioides* (King, 1828). www.ecoregistros.org/66939 (acceso 21/02/2015)
- Marcaida, G. 2014. E66940, *Colaptes rupicola* (d'Orbigny, 1840). www.ecoregistros.org/66940 (acceso 4/03/2015)
- Marcaida, G. 2014. E66577, *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769). www.ecoregistros.org/66577 (acceso 6/03/2015)
- Marcaida, G. 2015. E81736, *Nomonyx dominicus* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/81736 (acceso 20/02/2015)
- Marcaida, G. 2015. E121363, *Phacellodomus maculipectus* (Cabanis, 1883). www.ecoregistros.org/121363 (acceso 20/12/2015)
- Marconi, P. 2010. *Manual de Técnicas de Monitoreo de Condiciones Ecológicas para el Manejo Integrado de la Red de Humedales de Importancia para la Conservación de Flamencos Altoandinos*. Fundación YUCHAN, Salta.
- Marconi, P. y R. Clark. 2011. First confirmed of Andean Flamingo *Phoenicoparrus andinus* in Catamarca, Argentina, and remarks on its breeding ecology. *Cotinga* 33: 150-151.
- Marinao, C., Suárez, N. y P. Yorio. 2015. Influencia de factores ambientales en la alimentación de pichones de Gaviotín Real y Pico Amarillo en Bahía San Blas, Buenos Aires. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitología, La Plata, Buenos Aires.
- Marinero, N. V. y R. O. Cortez. 2012. Registro de nidificación del canastero pálido *Asthenes modesta* (Furnariidae) en la ecorregión de los Altos Andes, San Juan (Argentina). *Multequina* 21: 51-54.
- Maron, C., Bulfon, M. y N. Bee de Speroni. 2012. Aspectos histomorfométricos y cuantitativos del ovario de *Patagioenas*

- maculosa* (Aves, Columbidae). *Rev. Peru. Biol.* 19: 43-49.
- Márquez, C. G. 2001. Observaciones sobre un nido de Picaflor Rubí (*Sephanoides galeritus*) en el Parque Nacional Lanín, Neuquén, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 12-13.
- Márquez, J. A., Ávalos, M. A., Carelli, A. y P. G. Brandolín. 2010. Avifauna de las Sierras de las Peñas, Córdoba, Argentina. Resúmenes, IV Reunión Binacional de Ecología, Buenos Aires.
- Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1984. Nesting of the Spot-winged Falconet in Monk Parakeet nests. *Auk* 101: 614-615.
- Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1993. Estructura del nido y comportamiento de nidificación de la cotorra *Myiopsitta monachus*. *Bol. Soc. Zool. Urug.* 8: 211-217.
- Martella, M. B., Navarro, J. L. y E. H. Bucher. 1985. Vertebrados asociados a los nidos de la Cotorra *Myiopsitta monachus* en Córdoba y La Rioja. *Physis* 43: 49-51.
- Martella, M. B., Navarro, J. L., Sahade, R., Tatián, M. y A. Burgos. 1994. Breeding system of Greater Rhea (*Rhea americana*). *J. Ornith.* 135: 123.
- Martín, E., Blendinger, P. G. y V. Piriz Carillo. 2009. Preferencias de hábitat y de sitios de nidificación de *Coryphistera alaudina* (Furnariidae) en el Chaco semiárido. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitología. Tucumán.
- Martín, S., Robledo, C. y H. Sosa, 2011. Evaluación sobre la situación poblacional del pepitero de collar o “siete cuchillos” (*Saltator aurantiirostris nasica*), en la Reserva Natural Villavicencio, Mendoza, Argentina. *Nótaulas Faunísticas (Segunda serie)* 64: 1-6.
- Martínez, G. D. 2016. Registro de ejemplares adultos y juveniles de águila crestada negra (*Spizaetus tyrannus tyrannus*) en zona periurbana del departamento Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. *Nótaulas Faunísticas (Segunda serie)* 189: 1-7.
- Martínez, M. M. 1983. Nidificación de *Hirundo rustica erythrogaster* en la Argentina (Aves, Hirundinidae). *Neotrópica* 29: 83-86.
- Martínez, M. M. 2001. Avifauna de Mar Chiquita. Pp. 227-247, en Iribarne, O. (ed.) *Reserva de Biósfera Mar Chiquita:* características físicas, biológicas y ecológicas. Editorial Martí. Mar del Plata.
- Martínez, M. M. y M. S. Bó. 1993. Aspectos de la biología reproductiva de *Circus cinereus*, *Circus buffoni* y *Milvago chimango* en la Reserva Municipal “Parque Atlántico Mar Chiquito”, prov. Buenos Aires. Resúmenes, VIII Reunión Argentina de Ornitología, VI Encuentro Argentino-Paraguayo de Ornitología.
- Martinez, M., Darrieu, C. y G. Soave. 1997. The avifauna of Laguna Llancanelo (Mendoza, Argentina), a South American wetland of international importance. *Freshwater Forum* 9: 33-45.
- Martínez, M. M., Isacch, J. P. y F. Donatti. 1996. Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornit. Neotr.* 7: 157-161.
- Mascitti, V. y G. Nicolossi. 1992. Nidificación del Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*), en la Laguna de Pozuelos, Puna de Jujuy. *Hornero* 13: 240-242.
- Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2002. Chick growth and breeding success of the Burrowing Parrot. *Condor* 104: 574-586.
- Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2004. Consequences of La Niña of ENSO for the survival and growth of nestling Burrowing Parrots on the Atlantic coast of South America. *Emu* 104: 337-346.
- Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2005. La colonia de Loros Barranqueros en la costa rionegrina de El Cóndor. Un patrimonio mundial. Pp.: 351-371, en Masera, R. F., Lew, J. y G. Serra Peirano (eds.). *Las mesetas patagónicas que caen al mar, costa rionegrina*. Gobierno de Río Negro.
- Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2012. ¿Cómo reproducirse exitosamente ante un ambiente cambiante? Biología reproductiva del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en el noreste de la Patagonia. *Hornero* 27: 73-88.
- Masello, J. F., Sommer, C. y P. Quillfeldt. 2006a. Full house the Burrowing Parrots of Patagonia. *PsittaScense* 18: 3-7.
- Masello, J. F., Pagnossini, M. L., Sommer, C. y P. Quillfeldt. 2006b. Population size, provisioning frequency, flock size and foraging range at the largest known colony of Psittaciformes: the Burrowing Parrots of

- the north-eastern Patagonia coastal cliffs. *Emu* 106: 69-79.
- Masello, J. F., Wikelski, M., Voigt, C. C. y P. Quillfeldt. 2013. Distribution patterns predict individual specialization in the Diet of Dolphin Gulls. *PLOS ONE* 8: 1-10.
- Mason, P. 1985. The nesting biology of somes passerines of Buenos Aires, Argentina. *Neotropical Ornithology* 36:954-972.
- Mason, P. y S. I. Rothstein. 1986. Coevolution and avian brood parasitism: cowbird eggs show evolutionary response to host discrimination. *Evolution* 40: 1207-1214.
- Massoni, V. y J. C. Reboreda. 1999. Egg puncture allows Shiny Cowbirds to assess host egg development and suitability for parasitism. *Proc. R. Soc. Lond.* 266: 1871-1874.
- Massoni, V. y J. C. Reboreda. 2001. Number of close spatial and temporal neighbors decreases. The probability of nest failure and Shiny Cowbird parasitism in colonial Yellow-winded Blackbird. *Condor* 103: 521-529.
- Massoni, V., Bulit, F. y J. C. Reboreda. 2007. Breeding biology of the White-rumped Swallow *Tachycineta leucorrhoa* in Buenos Aires province, Argentina. *Ibis* 149: 10-17.
- Massoni, V., Winkler, D. W. y J. C. Reboreda. 2006. Brood parasitism of White-rumped Swallows by Shiny Cowbird. *J. Field Ornith.* 77: 80-84.
- Mastropaoletti, M., Turienzo, P., Di Iorio, O., Nava, S., Venzal, J. M., Guglielmone A. A. y A. J. Mangold. 2011. Distribution and 16S rDNA sequences of *Argas monachus* (Acari: Argasidae), a soft tick parasite of *Myiopsitta monachus* (Aves: Psittacidae). *Exp. Appl. Acarol.* 55: 283-291.
- Masramón, D. O. 1962. Nidificación de algunas aves de San Luis. *Nuestras Aves* 1: 8-10.
- Masramón, D. O. 1969. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero* 11: 33-45.
- Masramón, D. O. 1971. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero* 11: 113-123.
- Masramón, D. O. 1975. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero* 11: 309-311.
- Masramón, D. O. 1977. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero* 11: 413-416.
- Masramón, D. O. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero* 12: 59-68.
- Masramón, D. O. 1984. Actitudes del Cortarrama Común. *Nuestras Aves* 4: 25.
- Massoni, V., Bulit, F. y J. C. Reboreda. 2007. Breeding biology of the White-rumped Swallow *Tachycineta leucorrhoa* in Buenos Aires province, Argentina. *Ibis* 149: 10-17.
- Massoni, V., Reboreda, J. C., López, G. L. y F. Aldatz. 2012. High coordination and egalitarian parental effort in the Rufous Hornero. *Condor* 114: 564-570.
- Mata, A. B. 1927. Nota sobre dos rapaces de la Prov. de Buenos Aires. *Hornero* 4: 64-66.
- Matarasso, H. F. y Seró López, 2008. La Tenca (*Mimus thenca*) en la provincia de Neuquén: una nueva especie para Argentina. *Hornero* 23: 41-43.
- Mateleur, G. A., Rozzati, J. C. y R. C. Lajmanovich. 1995. Duración del período reproductivo de *Netta peposaca* (Aves: Anatidae) en la provincia de Santa Fe, Argentina. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 26: 15-20.
- Mattos, E., Cozzani, N. y S. Zalba. 2009. Biología reproductiva del Pico de Plata, *Hymenops perspicillata*, en el Parque Provincial Ernesto Torquist (Sierra de la Ventana). Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitología, Tucumán.
- Mauco, L., Paterlini, C., Isaldo, D., Quintero Blanco, S. A. y M. Navarro. 2007. Primer registro de reproducción de la Gaviota Cociñera (*Larus dominicanus*) en la Bahía Samborombón, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 22: 47-50.
- Maugeri, F. G. 2003. Citas de aves nuevas o poco frecuentes del partido de Adolfo Alsina, Buenos aires, Argentina. *Neotrópica* 49: 62-68.
- Maugeri, F. G. 2005. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial del Gaviotín chico común (*Sterna superciliaris*) para la provincia de Buenos Aires y nueva evidencia de su nidificación asociada con el Chorlito de collar (*Charadrius collaris*). *Ornit. Neotr.* 16: 117-121.
- Maugeri, F. G. 2006a. Ampliación del rango de distribución y descripción de aspectos reproductivos de cuatro especies de aves en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Cotinga* 25: 43-46.

- Maugeri, F. G. 2006b. Nota sobre la nidificación de la Dormilona Canela (*Muscisaxicola capistratus*: Tyrannidae) en el norte de la Patagonia, Argentina. *Ornit. Neotr.* 17: 155-158.
- Maugeri, F. G. 2007. Usurpación de un nido de Chorlito Doble Collar (*Charadrius falklandicus*) por el Tero común (*Vanellus chilensis*). *Ornit. Neotr.* 18: 121-125.
- Maugeri, F. G. 2009. Registros de nidadas de cuatro huevos para el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 65-68.
- Maugeri, F. G. 2014a. Descripción del nido y del huevo de la Viudita Chica (*Knipolegus hudsoni*: Passeriformes: Tyrannidae) para la provincia de Neuquén y primera evidencia de su reproducción en Catamarca, Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 58: 147-156.
- Maugeri, F. G. 2014b. Nuevo registro del nido y de los huevos de la tovaca común (*Chamaea campanisona*: Passeriformes: Formicariidae) para la provincia de Misiones, Argentina. *Acta Zool. Lilloana* 58: 241-247.
- Maugeri, F. G. y H. O. Drozd. 2006. Primer registro de nidificación del Matico (*Icterus croconotus strictifrons*) para la Argentina. *Ornit. Neotr.* 17: 301-305.
- Maugeri, F. G., Rey, L. y A Raparo. 2009. Laguna La Picaza, Santa Fe como sitio de importancia para la nidificación de *Phoenicopterus chilensis*. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitológía, Tucumán.
- Mayor, A. 2015. E79587, *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister, 1860). www.ecoregistros.org/79587 (acceso 19/02/2015)
- Mazar Barnett, J., Clark, R., Bodrati, A., Bodrati, G., Pugnali, G. y M. Della Seta. 1998. Natural history notes on some little known birds in north-west Argentina. *Cotinga* 9: 64-75.
- Mazar Barnett, J., Pugnali, G. D., Pearman Morrison, M., Bodrati, A., Moschione, F., Clark, R., Roesler, I., Monteleone, D., Casañas, H., Burgos Gallardo, F., Segovia, S., Pagano, L., Povedano, H. y J. Areta. 2014. The Andean Swallow (*Orochelidon andecola*) in Argentina. *Rev. Bras. Ornit.* 22: 172-179.
- Méndez, C. 2011. E3828, *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/3828 (acceso 21/02/2015)
- Mercolli, C. 1993. Observaciones ecológicas sobre el ñandú común (*Rhea americana Rothschildi*) (Aves: Rheidae) en la Reserva Ecológica El Bagual, provincia de Formosa. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
- Mercolli, C. y A. A. Yanosky. 2001. Greater Rhea predation in the Eastern Chaco of Argentina. *Ararajuba* 9: 139-141.
- Mérida, E. y A. Bodrati. 2004. Nidificación del Cachudito Pico Amarillo (*Anairetes flavirostris*) y el Cachudito Pico Negro (*Anairetes parulus*) en el Parque Nacional El Leoncito, provincia de San Juan, Argentina. *Nuestras Aves* 48: 35-36.
- Mérida, E. y A. Bodrati. 2006. Consideraciones sobre la conservación de los talares de barranca del nordeste de Buenos Aires y descripción de las características de un relicto en Baradero. Pp: 71-82, en Mérida, E. y J. Athor (eds.). *Talares bonaerenses y su conservación*. Fundaciónde Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires, Argentina.
- Merlino, B. 2013. E29017, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/29017 (acceso 4/03/2015)
- Merlino, V. 2013. E29870, *Cacicus solitarius* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/29870 (acceso 6/03/2015)
- Merlino, V. 2014. E65007, *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). www.ecoregistros.org/65007 (acceso 19/02/2015)
- Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1994. Brood parasitism of the Shiny Cowbird, *Molothrus bonariensis*, on the Brown-and-Yellow Marshbird, *Pseudoleistes virescens*. *Condor* 96: 716-721.
- Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1996. New host for a specialized brood parasite, the Screaming Cowbird. *Condor* 98: 630-632.
- Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1998. Nesting success in Brown-and-Yellow Marshbirds: Efets of timing, nest site, and brood parasitism. *Auk* 115: 871-878.
- Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 1999. Egg laying behavior by Shiny Cowbirds

- parasitizing Brown-and-yellow Marshbirds. *Anim. Behav.* 58: 873-882.
- Mermoz, M. E. y J. C. Reboreda. 2003. Reproductive success of Shiny Cowbird (*Molothrus bonariensis*) parasiting the Larger Brown-and-Yellow (*Pseudoleistes virescens*) in Argentina. *Auk* 120: 1128-1139.
- Mezquida, E. T. 2000. Ecología reproductiva de un ensamble de aves del desierto del Monte Central, Argentina. Tesis Doctoral. Univ. Autónoma de Madrid.
- Mezquida, E. T. 2001a. Aspects of the breeding biology of the Crested Gallito. *Wilson Bull.* 113: 104-108.
- Mezquida, E. T. 2001b. La reproducción de algunas especies de Dendrocopidae y Furnariidae en el desierto del monte central, Argentina. *Hornero* 16: 23-30.
- Mezquida, E. T. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza. *Hornero* 17: 31-40.
- Mezquida, E. T. 2003. La reproducción de cinco especies de Emberizidae y Fringillidae en la Reserva Ñacuñán, Argentina. *Hornero* 18: 13-20.
- Mezquida, E. T. 2004. Nest site selection and nesting success of five species of passerines in a South American open *Prosopis* woodland. *J. Ornithol.* 145: 16-22.
- Mezquida, E. T. y L. Marone. 2000. Breeding biology of Grey Tyrannulet in Monte Desert, Argentina. *Condor* 102: 205-210.
- Mezquida, E. T. y L. Marone. 2001. Factors affecting nesting success of a bird assembly in the central Monte Desert, Argentina. *J. Avian. Biol.* 32: 287-296.
- Mezquida, E. T. y L. Marone. 2003. Comparison of the reproductive biology of two *Poospiza* Warbling-finches of Argentina in wet and dry years. *Ardea* 91: 251-262.
- Miatello, R. 2007. Sierras del Norte Cordobés. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 133-134. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Miatello, R., Cobos, V. y C. Rosacher. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. *Historia Natural* 8: 1-6.
- Miatello, R., Baldo, J., Biancucci, L. y V. Cobos. 2003. Nuevos registros de aves poco citadas para Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 15-21.
- Miatello, R., Baldo, J., Ordano, M., Rosacher, C. y L. Biancucci. 1999. *Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala, Córdoba, Argentina*. Secret. Agric. Ganad. Rec. Renov. Córdoba.
- Milat, J. A. y J. F. Klimaitis. 1993. Nidificación y comportamiento reproductivo del Pitiayumi (*Parula pitiayumi*) en Magdalena, Buenos Aires. *Mus. Ornit. Mun. Berisso Publ.* 5: 1-11.
- Milat, J. A. y J. F. Klimaitis. 2015. Nidificación y comportamiento reproductivo del Pitiayumi (*Parula pitiayumi*) en Magdalena, Buenos Aires. *Mus. Ornit. Mun. Berisso*, pp.: 1-15.
- Milesi, F. A., Marone, L., Lopez de Casenave, J., Cueto, V. R. y E. T. Mezquida. 2002. Gremios de manejo como indicadores de las condiciones del ambiente: un estudio de caso con aves y perturbaciones del hábitat en el Monte central, Argentina. *Ecología Austral* 12: 149-161.
- Militello, E. 2014. E49716, *Podiceps gallardoi* (Rumboll, 1974). www.ecoregistros.org/49716 (acceso 19/02/2015)
- Militello, E. 2015. E81054, *Chloephaga poliocephala* (Sclater, 1857). www.ecoregistros.org/81054 (acceso 20/02/2015)
- Militello, E. 2015. E80619, *Podiceps gallardoi* (Rumboll, 1974). www.ecoregistros.org/80619 (acceso 19/02/2015)
- Militello, E. 2015. E80619, *Podiceps occipitalis* (Garnot, 1826). www.ecoregistros.org/80619 (acceso 19/02/2015)
- Militello, E. 2015. E79304, *Anas flavirostris* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/79304 (acceso 21/02/2015)
- Militello, E. 2015. E81075, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/81075 (acceso 4/03/2015)

- Militello, E. R. y R. Castillo. 2005. Nidificación del Picaflor Esmeralda (*Agyrtria versicolor*) en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 49: 30-31.
- Miller, A. 2015. E78304, *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/78304 (acceso 19/02/2015)
- Miller, L. E. 1917. Field notes on *Molothrus bonariensis* and *Molothrus badius*. *Bull. Am. Mus Nat. Hist.* 37: 579-592.
- Millones, A., Frere, E. y P. Gandini. 2008. Breeding Habitat Use by the Red-Legged Cormorant (*Phalacrocorax gaimardi*) in Patagonia, Argentina. *Waterbirds* 31: 656-660.
- Millones, A., Frere, E. y P. Gandini. 2010. Availability and use of breeding habitat by the Red-legged Cormorant (*Phalacrocorax gaimardi*): evidence for habitat selection. *Emu* 110: 155-159.
- Miquel, S. E., Paola Turienzo, P. y O. R. Di Iorio. 2015. Gastropod species found in birds' nests from Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., n.s.* 17: 87-96.
- Moffett, G. M. 1969. A study of nesting Torrent Ducks in the Andes. *Living Bird* 9: 5-27.
- Mogensen, J. 1927. Nota sobre el parasitismo del "Crespín" (*Tapera naevia*). *Hornero* 4: 68-70.
- Molli, A. F. 1985. Nido de Doradito Tucumano. *Nuestras Aves* 8: 12.
- Molli, A. F. 1986. Nido de Anambé Chico. *Nuestras Aves* 11: 24.
- Moller Jensen, R. 2015. E323749, *Fluvicola nengeta* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/323749 (acceso 3/10/2015)
- Montaldo, N. H. y J. A. Claver. 1986. Guía de las Aves Silvestres de las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. *Rev. Fac. Agron.* 7: 191-216.
- Montalti, D. y G. E. Soave. 2002. The birds of Seymour Island, Antarctica. *Ornit. Neotr.* 13: 267-271.
- Montalti, D., Ibañez, L. y V. Fiorini. 2013. Composición de los nidos de Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Montalvo, C. I., Fernandez, F. J., Galmes, M. A., Santillan, M. A. y J. Cereghetti. 2015. Crowned solitary eagle (*Buteogallus coronatus*) as accumulator of armadillo osteoderms in the archaeological record? An actualistic taphonomic study for central Argentina. *Quaternary International* 391: 90-99.
- Montefinale, D. 2014. E41939, *Ammodramus humeralis* (Bosc, 1792). www.ecoregistros.org/41939 (acceso 13/03/2015)
- Mora, C. 2013. E30316, *Thinocorus orbignyanus* (Geoffroy Saint-Hilaire & Lesson, 1831). www.ecoregistros.org/30316 (acceso 4/03/2015)
- Morici, A. 1992. Observaciones de *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816) (Aves: Anseriformes: Anatidae) en el noreste de la provincia de Buenos Aires. *APRONA. Boletín científico* 22: 14-20.
- Morici, A. 2009. Nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) en el partido de Puán, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 35-36.
- Morici A. 2012a. Primeros registros de nidificación de la golondrina tijerita (*Hirundo rustica*) en la provincia de la Pampa, Argentina. *Nótaulas Faunísticas (segunda serie)* 96: 1-7.
- Morici A. 2012b. Las aves del área natural protegida "Dique Roggero" (Buenos Aires, Argentina). *Biológica* 15: 24-36.
- Moroni, M. y S. A. Salvador. 2014. Nidificación del Pato Zambullidor Grande (*Oxyura jamaicensis ferruginea*) en la provincia de Santa Cruz, Argentina. *Biológica* 17: 69-70.
- Moroni, M. y S. A. Salvador. 2014. Nido del Jote Cabeza Roja (*Cathartes aura*) en la provincia de Chubut, Argentina. *Nuestras Aves* 59: 51-52.
- Moroni M. y S. A. Salvador. En prensa. Reproducción de una población asilvestrada de Ganso Común (*Anser anser*) en Santa Cruz, Argentina. *Nuestras Aves*
- Moroni, M. y S. A. Salvador. 2016. Descripción del nido, huevo y pichón de la Gallineta Chica (*Rallus antarcticus*). *Historia Natural (Tercera serie)* 6 (1): 5-12.
- Moschione, F., Spitznagel, O. y M. González. 2013. *Lista de Aves de Salta (Birds Checklist)*. Ministerio de Cultura y Turismo. Salta.

- Mosqueira, M. E., Albeza, M. V. y G. M. De Gonzo. 1987. Biología reproductiva de *Phalacrocorax olivaceus* (Humboldt, 1805) en el valle de Lerma, Salta. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 18: 167-173.
- Mosso, E. D. y A. H. Beltzer. 1992. Nuevos aportes a la biología reproductiva de la Garcita Azulada *Butorides striatus* (Aves: Ardeidae). *Hornero* 13: 236-237.
- Motta, L. M., Paritsis, J. y P. A. E. Alarcón. 2015. Flying Streamer-Duck (*Tachyeres patachonicus*) egg found in a Kelp Gull (*Larus dominicanus*) nest in northwestern Patagonia. *Ornit. Neotr.* 26: 113-116.
- Müller, H. 1920a. El huevo de la perdiz *Tinamotis ingoufi*. *Hornero* 2:134.
- Müller, H. 1920b. Sobre nidificación del flamenco, *Phoenicopterus chilensis*. *Hornero* 2:134-135.
- Muñiz, E. 2015. E76809, *Chloephaga picta* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/76809 (acceso 20/02/2015)
- Murphy, R. C. 1916. Anatidae of South Georgia. *Auk* 33: 270-277.
- Murphy, R. C. 1923. Notes sur *Anthus antarcticus*. *Hornero* 3: 56-59.
- Murton, R. K., Bucher, E. H., Nores, M., Gómez, E. y J. Reartes. 1974. The ecology of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) in Argentina. *Condor* 76: 80-88.
- Myers, J. P. y L. P. Myers. 1979. Shorebirds of coastal Buenos Aires Province, Argentina. *Ibis* 121: 186-200.
- N**
- Narosky, S. 1969. Nidificación de algunas aves en la región central de la Pcia. de Buenos Aires. *Hornero* 11: 27-32.
- Narosky, S. 1973a. Una nueva especie de *Sporophila* para la avifauna argentina. *Hornero* 11: 169-171.
- Narosky, S. 1973b. Primeros nidos de la Garcita Bueyera en la Argentina. *Hornero* 11: 225-226.
- Narosky, S. 1973c. Observations on the nesting of *Spartonoica maluroides*. *Ibis* 115: 412-413.
- Narosky, S. 1975. Notas caliológicas. *Hornero* 11: 285-290.
- Narosky, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero* 12: 122-126.
- Narosky, T. y A. Di Giacomo. 1993. *Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Status*. A.O.P., Vazquez Mazzini Eds., L.O.L.A., Buenos Aires.
- Narosky, T. y L. M. Lozzia. 1988. Aves de la reserva El Bagual. *Nuestras Aves* 15: 7-9.
- Narosky, T. y A. Martelli. 1995. Una nueva visita al este de Formosa. *Nuestras Aves* 31: 28-29.
- Narosky, S. y S. A. Salvador. 1985. Information of the genera *Sporophila*. *ICBP Londres* Pp: 1-20.
- Narosky, T. y S. Salvador. 1998. *Nidificación de las Aves Argentinas (Tyrannidae)*. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- Narosky, S. y D. Yzurieta. 1973a. Nidificación de dos círcidos en la zona de San Vicente (Prov. de Buenos Aires). *Hornero* 11: 172-176.
- Narosky, S. y D. Yzurieta. 1973b. Nidificación de la Gaviota de cabeza gris (*Larus cirrocephalus*). *Hornero* 11: 217-219.
- Narosky, T., Babarskas; M. y B. López Lanús. 1992. Hallazgo del primer nido de Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en Buenos Aires. *Hornero* 13: 246-247.
- Narosky, S., Di Giacomo, A. G. y B. López Lanús. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. *Hornero* 13: 173-178.
- Narosky, S., Fraga, R. y M. de la Peña. 1983. *Nidificación de las Aves Argentinas (Dendrocolaptidae a Furnariidae)*. Asoc. Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- Narosky, S., Salvador, S. A. y C. A. Saibene. 1984. Especies nuevas o poco citadas para la provincia de Buenos Aires: *Asthenes modesta*, *Agriornis montana*, *Catamenia analis* y *Sicalis lebruni*. *Hornero* 12: 209-211.
- Navarro, J. L. y E. H. Bucher. 1990. Growth of Monk Parakeets. *Wilson Bull.* 102: 520-525.
- Navarro, J. L. y E. H. Bucher. 1992. Annual variation in the timing of breeding of the Monk Parakeet in relation to climate factors. *Wilson Bull.* 104: 545-549.
- Navarro, J. L., Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1992. Breeding season and productivity of Monk Parakeets in Córdoba, Argentina. *Wilson Bull.* 104: 413-424.
- Navarro, J. L., Martella, M. B. y E. H. Bucher. 1995. Effects of laying date, clutch size, and

- communal nest of Monk Parrakeets. *Wilson Bull.* 107: 742-746.
- Navarro, J. L., Martella, M. B. y M. B. Cabrera. 1998. Fertility of Greater Rhea orphan eggs: conservations and management implications. *J. Field Ornith.* 69: 117-120.
- Navarro, J. L. 2013. E31120, *Eudromia elegans* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832). www.ecoregistros.org/31120 (acceso 19/02/2015)
- Navarro, J. L. 2013. E19455, *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/19455 (acceso 4/03/2015)
- Navarro, J. L. 2013. E100199, *Myiodynastes maculatus* (Müller, 1776). www.ecoregistros.org/100199 (acceso 4/09/2015)
- Navarro, J. L. 2016. E151407, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/151407 (acceso 29/05/2016)
- Navas, J. R. 1965. Nuevos aportes para *Oreotrochilus leucopleurus*. *Hornero* 10: 283-285.
- Navas, J. R. 1970a. Nuevos registros de aves para la patagonia. *Neotrópica* 16: 11-16.
- Navas, J. R. 1970b. La identidad de los cormoranes del Lago Nahuel Huapi (Aves, Phalacrocoracidae). *Neotrópica* 16: 140-144.
- Navas, J. R. 1971a. Estudio sobre la avifauna andinopatagónica. I. Géneros "Upucerthia, Ochetorhynchus y Eremobius" (Furnariidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 7: 267-304.
- Navas, J. R. 1971b. Notas sobre aves del Parque Nacional Nahuel Huapi. *Neotrópica* 17: 153-156.
- Navas, J. R. 2002. La distribución geográfica de *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. *Hornero* 17: 45-48.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1982. La posición taxonómica de "Tripophaga sclateri" y "T. punensis" (Aves, Furnariidae). *Com. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 4: 85-93.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987a. Notas sobre Furnariidae argentinos. (Aves, Passeriformes). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 14: 55-86.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1987b. Nuevos aportes a la distribución geográfica de *Diuca diuca* (Aves, Emberizidae) en la Argentina. *Neotrópica* 33: 97-104.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991a. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 15: 95-106.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991b. Anotaciones taxonómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves, Passeriformes). *Rev. Mus. La Plata* 14: 119-134.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1994. Apuntes sobre distribución y cría de algunas especies de los géneros *Agriornis*, *Xolmis*, *Neoxolmis* y *Muscisaxicola* (Aves, Tyrannidae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 16: 81-96.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1997. Sobre la distribución geográfica de las razas de *Thinocorus rumicivorus* y *T. orbignyanus* en la provincia de San Juan y Mendoza, República Argentina. *Hornero* 14: 277-279.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1998. La distribución geográfica de las razas de *Lophonetta specularoides* y *Merganetta armata* (Anatidae) en las provincias de Mendoza y San Juan, Argentina. *Hornero* 15: 57-59.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 2000. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Primera parte. (Aves: Phytotomidae, Mimidae, Troglodytidae, Motacillidae, Emberizidae Y Fringillidae). *Hornero* 15: 123-127.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 2001. Aportes al conocimiento de la distribución, la cría y el peso de las aves de las provincias de Mendoza y San Juan, República Argentina. Segunda parte. (Aves: Falconidae, Scolopacidae, Thinocoridae, Columbidae, Psittacidae, Strigidae, Caprimulgidae, Apodidae, Furnariidae, Rhyncryptidae y Tyrannidae). *Hornero* 16: 31-37.
- Nellar, M. M. 1991. Notas sobre la nidificación de Halcón Peregrino en la provincia de San Luis. *Nuestras Aves* 25: 26-27.
- Nellar Ramonella, M. M. 1993. *Aves de la provincia de San Luis. Lista y distribución*. Ed. Mus. Priv. Cienc. Nat. Inv. Ornith. "G. E. Hudson". San Luis.
- Nol, E. 1984. *Reproductive strategies of the oystercatchers*. Tesis doctoral, Universidad de Toronto, Toronto.
- Nores, A. I. 1995. Batfly ectoparasitism of the Brown Cacholote and Firewood-Gatherer. *Wilson Bull.* 107: 734-738.

- Nores, A. I. y M. Gutiérrez. 1986. Nidificación de *Tyto alba* en Córdoba, Argentina. *Hornero* 12: 242-249.
- Nores, M. 1996. Avifauna de la Provincia de Córdoba. Pp. 255-337 en Di Tada, I. E. y E. H. Bucher (Eds.). Biodiversidad de la Provincia de Córdoba. Fauna Vol. 1. Univ. Río Cuarto. Río Cuarto.
- Nores, A. I. y M. Nores. 1994. Nest building and nesting behavior of the Brown Cacholote. *Wilson Bull.* 106: 106-120.
- Nores, M. y M. M. Cerana. 2010. Contemporary colonisation by waterbirds of a small dam lake in central Argentina. *Avian Biology Res.* 3: 31-34.
- Nores, M. y S. A. Salvador. 1991. Descripción del nido y huevos del Gaucho Chico (*Agriornis murina*). *Hornero* 13: 161-162.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1975. Sobre aves de la Provincia de Córdoba. *Hornero* 11: 312-314.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1977. Comportamiento sexual del Macá Plateado Común (*Podiceps occipitalis occipitalis*). *Hornero* 11: 377-379.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1979a. Una nueva especie y dos nuevas subespecies de aves (Passeriformes). *Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 61: 4-8.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1979b. Nidificación del Gaviotín Pico Grueso (*Gelochelidon nilotica grönvoldi* Matheus) en Córdoba, Argentina. *Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 61: 9-11.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1979c. Aves costeras marinas y de ambientes continentales, nuevas para la provincia de Córdoba. *Hornero* 12: 45-52.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Historia Natural* 2: 101-104.
- Nores, M., Yzurieta, D. y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 59: 157-196.
- Norris, A. R., Cockle, K. L. y K. Martin. 2010. Evidence for tolerance of parasitism in a tropical cavity-nesting bird, Planato Woodcreeper (*Dendrocolaptes platyrostris*), in northern Argentina. *J. Trop. Ecol.* 26: 619-626.
- Nuechterlein, G. L. y A. Johnson. 1981. The downy young of the Hooded Grebe. *Living Bird* 19: 68-71.
- Ñ
- Núñez Chas, J. M. 1992. Hallazgo de un nido de *Leucochloris albicollis* en Mar del Plata. *Nuestras Aves* 27: 32-33.
- Núñez Montellano, M. G., Rotta, G. y C. Carballo. 2009. Primer registro de nidificación de la Mosqueta Pico Pala *Todirostrum cinereum* en Argentina. *Cotinga* 31: 83-84.
- Núñez Montellano, M. G., Rotta, G. y P. D. Cano. 2009. Nidificación del Surucuá Amarillo (*Trogon rufus chrysochloros*) en Argentina. *Nuestras Aves* 54: 8-11.
- Núñez Montellano, M. G., Rotta, G. y C. Caballo. 2009. Primer registro de nidificación de la Mosqueta Pico Pala *Todirostrum cinereum* en Argentina. *Cotinga* 31: 83-84.
- O
- Ojeda, V. 2004. Breeding biology and social behaviour of Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*) in Argentine Patagonia. *Europ. Jour. Wildl. Res.* 50: 18-24.
- Ojeda, V. S. y M. L. Chazarreta. 2006. Provisioning of Magellanic Woodpecker (*Campephilus magellanicus*) nestlings with vertebrate prey. *Wilson Bull.* 118: 251-254.
- Ojeda, V. y A. Trejo. 2002. Primeros registros de nidificación en cavidades de aves del bosque andino patagónico. *Hornero* 17: 85-89.
- Ojeda, V., Bechard, M. J. y A. Lanusse. 2004. Primer registro de nidificación del Peuquito (*Accipiter chilensis*) en Argentina. *Hornero* 19: 41-43.
- Ojeda, V., Suarez, L. y T. Kitzberger. 2007. Crown dieback events as key processes creating cavity habitat for Magellanic Woodpeckers. *Austral Ecology* 32:436-445.
- Ojeda, V., Chazarreta, L., Giménez, J. y A. Trejo. 2013. Presencia y nidificación del Lechuzón de Campo (*Asio flammeus*) en el bosque Andino-Patagónico: muchas lauchas por aquí, mucha ceniza por allá. *Nuestras Aves* 58: 37-40.
- Ojeda, V., Gelain, M., Sympson, L. y A. Trejo. 2003. Desarrollo morfológico y conductual de pollos del Aguilucho Chico *Buteo albigula* (Aves: Accipitridae) en el noreste

- de la Patagonia argentina. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 76: 451-457.
- Olejnik, N. 2011. E6447, *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/6447 (acceso 21/02/2015)
- Olejnik, N. 2011. E5236, *Dendrocygna autumnalis* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/5236 (acceso 20/02/2015)
- Olejnik, N. 2011. E6438, *Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/6438 (acceso 20/02/2015)
- Olejnik, N. 2012. E11381, *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/11381 (acceso 19/02/2015)
- Olejnik, N. 2013. E26879, *Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/26879 (acceso 10/03/2015)
- Olejnik, N. 2013. E27083, *Pachyramphus castaneus* (Jardine & Selby, 1827). www.ecoregistros.org/27083 (acceso 10/03/2015)
- Olejnik, N. 2014. E33403, *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/33403 (acceso 19/02/2015)
- Olivieri Bornand, S. E. 2015. E111916, *Pheucticus aureoventris* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837). www.ecoregistros.org/111916 (acceso 9/12/2015)
- Olguín, P., Beltzer, A., Giraudo, A., Regner, S., Juani, M., Vianco, M., Mariano, E., Lorenzón, R. y E. Leon. 2015. Reproductive Biology of Striated Heron (*Butorides striata*) in Argentina. *Waterbirds* 38: 396-400.
- Olrog, C. C. 1948. Observaciones sobre la avifauna de Tierra del Fuego y Chile. *Acta Zool. Lilloana* 5: 437-531.
- Olrog, C. C. 1949. Breves notas sobre la avifauna del Aconquija. *Acta Zool. Lilloana* 7: 139-159.
- Olrog, C. C. 1950. Notas sobre mamíferos y aves del Archipiélago de Cabo de Hornos. *Acta Zool. Lilloana* 9: 505-532.
- Olrog, C. C. 1956. Un Águila nueva para la Argentina. *Hornero* 10: 172-173.
- Olrog, C. C. 1958. Notas ornitológicas del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). *Acta Zool. Lilloana* 16: 83-90.
- Olrog, C. C. 1965. Diferencias en el ciclo sexual de algunas aves. *Hornero* 10: 269-272.
- Olrog, C. C. 1967. Breeding of the Band-tailed Gull (*Larus belcheri*) on the Atlantic coast of Argentina. *Condor* 69: 42-48.
- Olrog, C.C. 1985. Status of wet forest raptors in northern Argentina. Pp.191-197 En Newton, I. y R. D. Chancellor (eds.), Conservation studies on raptors. *Int. Council Bird Pres. Techn. Publ.* No. 5.
- Olveira, L. 2001. Esparvero Común (*Accipiter erytronemius*) en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 41: 34.
- Orgeira, J. L. 1997. Nidificación y hábitat del petrel de Wilson (*Oceanites oceanicus*) en Punta Cierva, Costa de Danco, Península Antártica. *Ornit. Neotr.* 8: 49-56.
- Orians, G. H., Orians, C. E. y K. J. Orians. 1977. Helpers at the nest in some Argentine blackbirds. Pp. 137-151. In Stonehouse, B. y C. Perrins (Eds.). *Evolutionary ecology*. London.
- Ortiz, D. y P. Caplonch. 2007. *Guía de los Rapaces de la provincia de Tucumán*. Tucumán.
- Ortiz, D., Aráoz, R. y P. Caplonch. 2006. Registros novedosos de Doraditos (*Pseudocolopteryx*) en la provincia de Tucumán. *Nuestras Aves* 52: 24-25.
- Ortiz, D., Ferro, I. y C. Barrionuevo. 2012. Primer descripción del nido y movimientos estacionales del Birro Chico (*Pyrrhomylia c. cinnamomea*) en Argentina. *Nuestras Aves* 57: 8-9.
- Oscar, D. 2011. E1160, *Anas bahamensis* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/1160 (acceso 21/02/2015)
- Oscar, D. 2011. E1024, *Buteogallus meridionalis* (Latham, 1790). www.ecoregistros.org/1024 (acceso 21/02/2015)
- Oscar, D. 2012. E11618, *Lophonetta specularioides* (King, 1828). www.ecoregistros.org/11618 (acceso 21/02/2015)
- Oscar, D. 2012. E13200, *Geranoaetus melanoleucus* (Vieillot, 1819).

- www.ecoregistros.org/13200 (acceso 21/02/2015)
- Oscar, D. 2012. E15301, *Momotus momota* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/15301 (acceso 4/03/2015)
- Oscar, D. 2012. E17128, *Cacicus chrysopterus* (Vigors, 1825). www.ecoregistros.org/17128 (acceso 6/03/2015)
- Oscar, D. 2014. E1546, *Jabiru mycteria* (Lichtenstein, 1819). www.ecoregistros.org/154665007 (acceso 19/02/2015)
- Oscar, D. 2014. E70581, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/70581 (acceso 20/02/2015)
- Oscar, D. 2014. E135377, *Pteroptochos tarnii* (King, 1831). www.ecoregistros.org/135377 (acceso 29/01/2016)
- Oscar, D. 2016. E62885, *Anas georgica* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/62885 (acceso 21/02/2015)
- Oscar, D. E. y J. La Grotteria. 2013. Registro de nidificación del Churrín Andino (*Scytalopus magellanicus*) en la provincia de Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 58: 56-58.
- Ortiz, S. G., Acosta, J. C. y F. Murúa. 2003. Fauna de vertebrados y actividad minera: estudio de línea de base en la cuenca del Río Castaño, San Juan, Argentina. *Multequina* 12: 23-35.
- Ospina, E. A., Cooper, C. B., Liljesthröm, M., Ardia D. R. y D. W. Winkler. 2015. Biparental nest-attendance in Chilean Swallows (*Tachycineta meyeni*) breeding in Ushuaia, Argentina. *Emu* 115: 76-79.
- Otley, H., Munro, G., Clausen, A. y B. Ingham. 2008. Falkland Islands State of the Environment Report 2008. *Falkland Islands Government and Falklands Conservation, Stanley*.
- P**
- Padín, O. A. y N. R. Iriart. 1996. Ecología energética de una colonia de nidificación de la Garcita Bueyera *Bubulcus ibis*, en la laguna Sauce Grande (prov. Buenos Aires). Resúmenes, IX Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires.
- Pagano, L. G. y E. Mérida. 2009. Aves del Parque Costero del Sur. En Athor, J. (ed.). Parque Costero del Sur – Naturaleza, conservación y patrimonio cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires, Argentina.
- Pagano, L. G., Jordan, E. A., Areta, J. I., Jensen, R. F. e I. Roesler. 2012. Aves de la Reserva Natural Punta Lara. En Roesler, I. y M. G. Agostini (eds). *Inventario de los Vertebrados de la Reserva Natural Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación, Monografía de Aves Argentinas No 8. Buenos Aires, Argentina.
- Palmerio, A. G. y V. Massoni. 2009. Reproductive biology of female Saffron Finches does not differ by the plumage of the mate. *Condor* 111: 715-721.
- Palmerio, A. G. y V. Massoni. 2011. Parental care does not vary with age-dependent plumage in male Saffron Finches *Sicalis flaveola*. *Ibis* 153: 421-424.
- Passeggi, J. M. 2011. First description of the breeding chronology of the White-collared Swift (*Streptoprogne zonaris*) in Argentina. *Wilson Jour. Ornith.* 123: 613-618.
- Parera, A. F. 1988. Nueva localidades para el Maca Chico. *Nuestras Aves* 17: 8-10.
- Parera, A. y A. Bosso. 1996. Descripción de una colonia mixta de aves acuáticas en Laguna Ibera, Corrientes, Argentina. *Hornero* 14: 81-84.
- Parmelee, D. F. y S. D. Mc Donald. 1975. Recent observations on the birds of Isla Contramaestre and Isla Magdalena, Straits of Magellan. *Condor* 77: 218-220.
- Parmelee, D. F. y P. C. Rasmuseen. 1994. Status of birds in Ushuaia Bay, Argentine Tierra del Fuego, in spring and summer. *Occas. Papers Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 168: 1-24.
- Partridge, W. 1953. Observaciones sobre aves de Córdoba y San Luis. *Hornero* 10: 23-73.
- Partridge, W. H. 1954. Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. *Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. Zool.* 3: 85-153.
- Partridge, W. H. 1956a. Notes on the Brazilian merganser in Argentina. *Auk* 73: 473-488.
- Partridge, W. H. 1956b. Un nuevo dormilón para la fauna de Argentina y Paraguay. *Hornero* 10: 169-170.

- Partridge, W. H. 1961. Aves de Misiones nuevas para Argentina. *Neotrópica* 7: 25-28.
- Patterson, D. L., Woehler, E. J., Croxall, J. P., Cooper, J., Poncet, S., Peter, H. U., Hunter, S. y W. R. Fraser. 2008. Breeding distribution and population status of the Northern Giant Petrel *Macronectes halli* and Southern Giant Petrel *M. giganteus*. *Marine Ornith.* 36: 115-124.
- Pautasso, A. A. 2000. Catálogo del Material Oológico del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Santa Fe, Argentina. (Reptiles y Aves). *Mus. Prov. Cienc. Nat. "F. Ameghino"*. Serie Catálogos Nº 8
- Pautasso, A. A. 2002. Aves de la Reserva Urbana de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", Santa Fe Argentina. *Com. Mus. Prov. Cs. Naturales "Florentino Ameghino"* 8: 1-12.
- Pautasso, A. A. 2006. Notas sobre la nidificación del Arañero Cara Negra (*Geothlypis aequinoctialis*) en el este de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 52: 11-13.
- Pautasso, A. A. 2011. *La fauna y su conservación en los Bajos Submeridionales*. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad Nº 5.
- Pautasso, A. A. y J. Cazenave. 2002. Observaciones sobre la nidificación del Atajacaminos Tijera *Hydropsalis torquata* en el este de la provincia de Santa Fe, Argentina. *Hornero* 17: 99-104.
- Pautasso, A. A. y M. R. de la Peña. 2001. Observaciones sobre la biología reproductiva de *Asio clamator* en el centro de Argentina. *Hornero* 16: 43-46.
- Payne, M. R. y P. A. Prince. 1979. Identification and breeding biology of the diving petrels *Pelecanoides georgicus* and *P. urinatrix exsul* at South Georgia. *New Zealand J. Zool.* 6: 299-318.
- Paz, D. 1992a. Gaviotín Sudamericano (*Sterna hirundinacea*) nidificando en Río Negro. *Nuestras Aves* 26: 22-23.
- Paz, D. 1992b. Águila Mora y Halcón Peregrino predando en Punta Bermeja, Río Negro. *Nuestras Aves* 27: 35.
- Paz Barreto, D. 1997. Sobre la biología reproductiva del petrel damero (*Daption capense*) en la Isla Laurie, Orcadas del Sur. *Hornero* 14: 179-183.
- Pereyra, J. A. 1923. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 3: 159-174.
- Pereyra, J. A. 1927a. Segunda lista de las aves colectadas en la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 4: 23-34.
- Pereyra, J. A. 1927b. Nota sobre los nidos de *Synallaxis spixi* y *Pachyramphus polychropterus*. *Hornero* 4: 79.
- Pereyra, J. A. 1927e. Lista de aves colectadas en otras regiones (continuación). *Hornero* 4: 28-34.
- Pereyra, J. A. 1927d. Notas Ornitológicas. *Hornero* 4: 80.
- Pereyra, J. A. 1928. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 4: 199-202.
- Pereyra, J. A. 1931a. La familia de los Estrígidos. *Hornero* 4: 392-397.
- Pereyra, J. A. 1931b. Los Cresciscus (Gallinetas Enanas). *Hornero* 4: 414-415.
- Pereyra, J. A. 1931c. El Picaflor (*Chlorostilbon aureoventris*). *Hornero* 4: 419.
- Pereyra, J. A. 1932a. Los Caprimulgidos (dormilonas, golondrinas nocturnas o ataja caminos). *Hornero* 5: 41-46.
- Pereyra, J. A. 1932b. Los Martines Pescadores. *Hornero* 5: 51-53.
- Pereyra, J. A. 1932c. Notas ornitológicas del mes de diciembre de 1931. *Hornero* 5: 65-69.
- Pereyra, J. A. 1933a. Nuestros tordos de baño del género *Agelaius*. *Hornero* 5: 189-192.
- Pereyra, J. A. 1933b. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 5: 215-219.
- Pereyra, J. A. 1934a. Sobre dos Charadridos de los géneros *Rostratula* y *Gallinago*. *Hornero* 5: 366-371.
- Pereyra, J. A. 1934b. El nido del Federal *Amblyrhampus holosericeus*. *Hornero* 5: 384-386.
- Pereyra, J. A. 1934c. Curiosa nidificación del tiránido *Myiodynastes solitarius*. *Hornero* 5: 402-404.
- Pereyra, J. A. 1935. Sobre la Perdiz Copetona *Eudromia elegans*. *Hornero* 6: 74-76.
- Pereyra, J. A. 1937a. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. *Mem. Jard. Zool. La Plata* 7: 197-326.
- Pereyra, J. A. 1937b. Viaje al paraíso de nuestras aves acuáticas. *Hornero* 6: 466-476.

- Pereyra, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña noreste de la provincia de Buenos Aires. *Mem. Jard. Zool. La Plata* 9: 1-304.
- Pereyra, J. A. 1942. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). *Mem. Jard. Zool. La Plata* 10: 1-104.
- Pereyra, J. A. 1950. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). *Hornero* 9: 178-241.
- Pereyra, J. A. 1951. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). *Hornero* 9: 291-347.
- Pereyra, J. A. 1956. Notas biológicas sobre el Corbatita Común. *Hornero* 10: 140-142.
- Pereyra Lobos, R. 2002. Observaciones sobre aves del Parque Provincial Aconcagua, provincia de Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 43: 25.
- Pereyra Lobos, R. 2003. Notas sobre el Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) y el Picabuey (*Machetornis rixosus*) en Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 35.
- Pereyra Lobos, R. y F. Jara, 2013. Primer registro de nidificación de lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*) en la provincia de Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 133: 1-6.
- Pergolani de Costa, M. J. 1950. El pájaro denominado "Varillero" o "Congo" *Agelaius ruficapillus ruficapillus* Vieillot como plaga en los arrozales en Santa Fe. *Min. Agric. Ganad.* 16: 1-14.
- Pérez, C. y P. Petracci. 1997. Nidificación del Tuquito Gris (*Empidonax aurantioatrocristatus*) en la provincia de Río Negro. *Nuestras Aves* 36: 6.
- Pérez, C. H. F., Delhey, K. y P. F. Petracci. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la Patagonia Argentina. *Nuestras Aves* 52: 25-29.
- Pérez, E. M. 2014. E55700, *Chauna torquata* (Oken, 1816). www.ecoregistros.org/55700 (acceso 19/02/2015)
- Pérez, E. M. 2014. E44225, *Patagona gigas* (Vieillot, 1824). www.ecoregistros.org/44225 (acceso 4/03/2015)
- Pérez, E. M. 2014. E44224, *Sappho sparganurus* (Shaw, 1812). www.ecoregistros.org/44224 (acceso 4/03/2015)
- Pérez, E. M. 2014. E70109, *Anairetes flavirostris* (Slater & Salvin, 1876).
- www.ecoregistros.org/70109 (acceso 6/11/2015)
- Pérez, E. M. 2015. E80524, *Oreopholus ruficollis* (Wagler, 1829). www.ecoregistros.org/80524 (acceso 4/03/2015)
- Peris, S. J. 1997. Notes on the breeding biology and population density of the Tucuman Mountain-Finch (*Poospiza baeri*; Aves: Emberizidae) in Argentina, with description of nest and eggs. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 70: 221-224.
- Peris, S. J. y A. M. Aramburú. 1995. Reproductive phenology and breeding success of the Monk Parakeet (*Myiopsitta monachus monachus*) in Argentina. *Stud. Neotr. Fauna Envir.* 30: 115-119.
- Pearman, M., Areta, J.I., Roesler, I. y A. Bodrati. 2010. Confirmation of Sooty Swift (*Cypseloides fumigatus*) in Argentina with notes on its nest placement, seasonality, and distribution. *Ornit. Neotr.* 21: 351-359.
- Peters, J. L. 1923. Notes on some summer birds of northern Patagonia. *Bull. Mus. Comp. Zool.* 65:277-337.
- Petracci, P. F. y D. Basanta. 2002. Efectos positivos de la nidificación del Macá Común (*Rollandia rolland*) en una colonia de Caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*). *Ornit. Neotr.* 13: 113-119.
- Petracci, P. F. y K. Delhey. 2004. Nesting attempts of the Cliff Swallow *Petrochelidon pyrrhonota* in Buenos Aires province, Argentina. *Ibis* 146: 522-525.
- Petracci, P. y C. H. F. Pérez. 1997. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial (Río Negro- Argentina) del Gaviotín Sudamericano *Sterna hirundinacea*. *Hornero* 14: 267-268.
- Petracci, P. y C. H. F. Pérez. 1999. Nuevos aportes sobre el área de distribución del Pato Vapor Volador (*Tachyeres patachonicus*). *Nuestras Aves* 40: 10-11.
- Petracci, P. F., La Sala, L. F., Aguerre, G., Pérez, C. H., Acosta, N., Sotelo, M. y C. Pamparana. 2004. Dieta de la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*) durante el período reproductivo en el estuario de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 19: 23-28.
- Petracci, P. F., Delhey, K. J. V., Pérez, C. H. F., Basanta, D., Massola, M. V., Zamorano, M. y M. Fosatti. 2004. Nuevos aportes al

- conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. *Nuestras Aves* 48: 25-31.
- Pretelli, M. G., Isacch, J. P. y D. A. Cardoni. 2016. Variation in parental care in the spectacled tyrant *Hymenops perspicillatus* is associated with increased nest predation in grassland fragments. *J. Ornithol* 157: 451-460.
- Petrelli, M. G., Jossens, M. L. y A. H. Escalante. 2009. Selección de micro hábitat y temporalidad de la Gaviota Capuchón Café (*Larus maculipennis*) y la Gaviota Capuchón Gris (*Larus cirrocephalus*) en una colonia. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitológía, Tucumán.
- Piacentini, H. 1999. Observaciones sobre el Gavilán Ceniciente (*Circus cinereus*) en el norte de la Patagonia. *Nuestras Aves* 40: 14-15.
- Piacentini, H. y P. Acerbo. 1998. Precencia del Alicucu Común (*Otus choliba*) en la provincia de Río Negro, Argentina. *Nuestras Aves* 38: 12.
- Pietraroja, E. 2014. E42474, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/42474 (acceso 20/02/2015)
- Pietraroja, E. 2014. E45487, *Gallinula melanops* (Vieillot, 1819). www.ecoregistros.org/45487 (acceso 22/02/2015)
- Pintos, P. D., Lacoretz, M. V. y G. F. Fernández. 2015. Caracterización del sitio de nidificación de las principales especies de furnáridos de los talares del SE de la Provincia de Buenos Aires. Resúmenes, XVI Reunión Argentina de Ornitológía, La Plata, Buenos Aires.
- Plotnick, R. 1953. Algunas costumbres de la Cachirla de Uña Corta. *Hornero* 10: 18-22.
- Plotnick, R. 1956. Original comportamiento de un Caburé. *Hornero* 10: 171-172.
- Polverini, E. 2013. E19843, *Podiceps occipitalis* (Garnot, 1826). www.ecoregistros.org/19843 (acceso 19/02/2015)
- Port, J. L. 1998. Long-term pair bands and male parental care in Speckled Teal *Anas flavirostris* in Eastern Argentina. *Wildfowl* 49: 139-141.
- Port, J. L. y G. L. Brewer. 2004. Use of Monk Parakeet (*Myiopsitta monachus*) nest by Speckled teal (*Anas flavirostris*) in eastern Argentina. *Ornit. Neotr.* 15: 209-218.
- Port, J. L. y F. McKinney. 2001. Behavioral adaptations for breeding in arboreal-nesting Speckled Teal. *Wilson Bull.* 113: 177-188.
- Povedano, H. 1999. Nidificación del Gaviotín Chico Común (*Sterna superciliaris*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 39: 11-12.
- Pozzi, A. 1923. La Perdiz de Santa Cruz (Patagonia) *Tinamotis ingoufi* Oust. *Hornero* 3: 180-184.
- Pozzi, A. 1934. Nidos y pichones de Tero Belanopterus chilensis. *Hornero* 5: 404-407.
- Pozzi, L. M., Borboroglu, P. G., Boersma, P. D. y M. A. Pascual. 2015. Population Regulation in Magellanic Penguins: What Determines Changes in Colony Size?. *Plos One* 10: 1-16.
- Prado, W. 2013. E20345, *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/20345 (acceso 4/03/2015)
- Prado, W. 2013. E122048, *Chlorostilbon lucidus* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838). www.ecoregistros.org/122048 (acceso 14/12/2015)
- Prancetti, E. G. 2011. E3281, *Ciconia maguari* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/3281 (acceso 19/02/2015)
- Prancetti, G. E. 2014. E36029, *Podiceps major* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/36029 (acceso 19/02/2015)
- Preiz, S. 2013. E29707, *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/29707 (acceso 19/02/2015)
- Pretelli, M. G., Jossens, M. L. y A. H. Escalante. 2012. Breeding biology at a mixed-species colony of Great Egret and Cocoi Heron in a Pampas wetland of Argentina. *Waterbirds* 35: 35-43.
- Pretelli, M. G. y J. P. Isacch. 2013. Breeding biology of Spectacled Tyrant (*Hymenops perspicillatus*) In the Southeastern Pampas Region, Argentina. *Wilson J. Ornith.* 125: 275-279.
- Prince, P. A. y J. P. Croxall. 1990. The birds of South Georgia. *Bull. Brit. Orn. Club* 116: 81-104.

- Protomastro, J. J. 2000. Notes on the nesting of Variegated Antpitta *Grallaria varia*. *Cotinga* 14: 39-41.
- Protomastro, J. J. 2001. Nesting of Rufous-capped Motmot *Baryphthengus ruficapillus* in a tatu burrow. *Cotinga* 15: 19-20.
- Protomastro, J. J. 2002. Notes on the nesting of White-shouldered Fire-eye *Pyriglena leucoptera*. *Cotinga* 17: 73-75.
- Puente, G. 2014. E43435, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/43435 (acceso 20/02/2015)
- Puente, G. 2014. E58143, *Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/58143 (acceso 21/02/2015)
- Punta, G. y J. Saravia. 1991. A newly discovered of Southern Giant Petrels *Macronectes giganteus* on isla Gran Rodeo, Chubut province, Argentina. *Marine Ornith.* 19: 131-133.
- Punta, G. y J. Saravia. 1993. Distribución, abundancia y aspectos de la biología reproductiva del Cormorán Cuello Negro (*Phalacrocorax magellanicus*) en la provincia de Chubut, Argentina. *Hornero* 13: 295-298.
- Punta, G., Herrera, G. y J. Saravia. 1995. Aspectos de la biología reproductiva del Ostrero Negro *Haematopus ater* en las Islas Isabel, Bahía Bustamante, Chubut. *Hornero* 14: 42-44.
- Punta, G., Yorio, P., Herrera, G. y J. Saravia. 2003. Biología reproductiva de los Cormoranes Imperial (*Phalacrocorax atriceps*) y Cuello Negro (*P. magellanicus*) en el Golfo San José, Chubut, Argentina. *Hornero* 18: 103-111.
- Punta, G., Yorio, P., Saravia, J. y P. García Borboroglu. 2003. Breeding habitat requirements of the Imperial Cormorant and Rock Shag in Central Patagonia, Argentina. *Waterbirds* 26: 176-183.
- Q**
- Quillfeldt, P., Masello, J. F. y I. J. Strange. 2003. Breeding biology of the thin-billed prion *Pachyptila belcheri* at New Island, Falland Islands: egg desertion, breeding success and chick provisioning in the poor season 2002–2003. *Polar Biol.* 26: 746-752.
- Quintana, F. y P. Yorio. 1997a. Cleptoparasitismo intra e interespecífico en una colonia mixta de Gaviotines Real (*Sterna maxima*) y Pico Amarillo (*S. eurygnatha*). *Hornero* 14: 256-259.
- Quintana, F. y P. Yorio. 1997b. Breeding biology of Royal and Cayenne Terns at a mixed-species colony in Patagonia. *Wilson Bull.* 109: 650-662.
- Quintana, F. y P. Yorio. 1998a. Competition for nest sites between Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) and Terns (*Sterna maxima* and *S. eurygnata*) in Patagonia. *Auk* 115: 1068-1071.
- Quintana, F. y P. Yorio. 1998b. Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) predation on an Imperial Cormorant *Phalacrocorax atriceps* colony in Patagonia. *Marine Ornith.* 26: 84-85.
- Quintana, F., Yorio, P. y P. García Borboroglu. 2002. Aspects of the breeding biology of the Neotropic Cormorant *Phalacrocorax olivaceus* at Golfo San Jorge, Argentina. *Marine Ornith.* 30: 25-29.
- Quintana, R. D. 2001. Nest-site characteristics of a Gentoo Penguin *Pygoscelis papua* colony at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Marine Ornith.* 29: 109-112.
- Quintana, R. D. y V. Cirelli. 2000. Breeding dynamics of a Gentoo Penguin *Pygoscelis papua* population at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Marine Ornith.* 28: 29-35.
- Quintana, R. D. y A. Travaini. 2000. Characteristics of nest sites of skuas and Kelp Gull in the Antarctic Peninsula. *J. Field Ornith.* 71: 236-249.
- Quintana, R. D., Cirelli, V. y O. Benitez. 2001. Nest materials of skuas and Kelp Gulls at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Notornis* 48: 235-241.
- Quintana, R. D., Cirelli, V. y J. L. Orgeira. 2000. Abundance and spatial distribution of bird populations at Cierva Point, Antarctic Peninsula. *Marine Ornith.* 28: 21-27.
- Quiroga, M. A. y J. C. Reboreda. 2012. Lethal and sublethal effects of botfly (*Philornis seguryi*) parasitism on House Wren nestlings. *Condor* 114:197–202.
- Quiroga, M., Del Barco, O. y F. Agostinelli. 2003. First aproaches to the reproductive biology of *Sicalis flaveola* (Birds: Emberizidae) at the alluvial valley of Paraná river, Argentina. *FAVE* 2: 35-40.

Quiroga, O. B. 2014. Aportes a la distribución y nidificación del Chiricote (*Aramides cajaneus*) en Santiago del Estero, Argentina. *Biológica* 17: 58-59.

R

- Rábano, D., García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2002. Nueva colonia de reproducción de la Gaviota de Olrog (*Larus atlanticus*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 17: 105-107.
- Rabuffetti, F. L. y J. C. Reboreda. 2007. Early infestation by botflies (*Philornis seguyi*) decreases chick survival and nesting success in Chalk-browed Mockingbirds (*Mimus saturninus*). *Auk* 124:898-906.
- Radboone, S. 1935. Notas sobre algunas aves del Lago San Martín (Santa Cruz). *Hornero* 6: 99-101.
- Ramírez, R. 2014. E33669, *Gallinula melanops* (Vieillot, 1819). www.ecoregistros.org/33669 (acceso 22/02/2015)
- Ramírez-Llorens, P. y M. I. Bellocq. 2007. New records clarify the southern distribution of the Spectacled Owl (*Pulsatrix perspicillata*). *J. Raptor Res.* 41: 268-276.
- Ramírez Llorens, P., White, E. E. y M. Rotundo. 2003. Sobre algunas aves de la Estancia Guaycolec, provincia de Formosa, Argentina. *Nuestras Aves* 46: 36-40.
- Rasmussen, P. C. 1985. A juvenal specimen of *Muscisaxicola m. macloviana* (d'Orbigny and Lafresnaye) from coastal Chubut, Argentina. *Historia Natural* 5: 267-268.
- Rasmusser, P. C. 1991. Relationships between coastal south American King and Blue-eyed Shags. *Condor* 93: 825-839.
- Rasmussen, P. C., Humphrey, P. S. y J. Muñis Saavedra. 1992. Imperial Shags and other birds of the General Vintter area, Chubut province, Argentina. *Occas. Papers Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 146: 1-16.
- Rasmussen, P. C., Iglesias, G. J., Humphrey, P. S. y E. Ramilo. 1993. Poblaciones, hábitos alimenticios, y comportamiento posreproductivo del Cormorán Imperial del Lago Nahuel Huapi, Argentina. *Occas. Papers Mus. Nat. Hist. Univ. Kansas* 158: 1-17.
- Rebollo, M. E., Bragagnolo, L. A., Santillán, M. A., López, F. G., Orozco, P. M. y M. M. Reyes. 2013. Registros de nidadas de cinco huevos y cinco pichones para el Coludito Copetón (*Leptasthenura platensis*) en cajas nidos, en la provincia de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 58: 91-94.
- Reed, C. S. 1913. Datos para la biología del *Molothrus bonariensis*. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 13: 172-179.
- Reed, C. S. 1919. Breves notas acerca de nidos y huevos de algunas aves de la cordillera de Mendoza. *Hornero* 1: 267-273.
- Reed, C. S. 1921. Las aves de caza de la provincia de Mendoza. *Rev. Chil. Hist. Nat.* 25: 203-220.
- Reid, T. A., Lecoq, M. y P. Catry. 2007. The White-chinned Petrel *Procellaria aequinoctialis* population of the Falkland Islands. *Marine Ornith.* 35: 57-60.
- Remsen, J. V., Jr., Cadena, C. D., Jaramilo, A., Nores, M., Pacheco, J. F., Pérez Emán, J., Robbins, M. B., Stiles, F. G., Stotz, D. F. y K. J. Zimmer. Versión [2016]. A classification of the bird species of South America. <<http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>>
- Renard, A. 1920. Notas sobre aves de Cañuelas (Prov. Buenos Aires). *Hornero* 2: 58-60.
- Renard, A. 1933. Observaciones sobre el parasitismo del tordo. *Hornero* 5: 219-220.
- Rey, N. 2007. Parque Provincial Urugua-í. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 280-281. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Reynolds, P. W. 1934. Apuntes sobre aves de Tierra del Fuego. *Hornero* 5: 339-352.
- Reynolds, P. W. 1935. Notes on the birds of Cape Horn. *Ibis* 5: 65-101.
- Reynolds, R. T. 1953. Sobre nidificación del Chorlo de Magallanes. *Hornero* 10: 90-92.
- Ricci, J. J. y F. Ricci. 1984. Nidificación de la Pajonalera de Pico Recto (*Limnornis rectirostris*) en Benavidez, Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 12: 205-208.
- Ripley, S.D. 1950. A small collection of birds from Argentine. Tierra del Fuego. *Postilla* 3: 1-11.

- Rivera, L. y N. Politi. 2011. El Loro pinero, símbolo de las Yungas australes: Estado de conocimiento y conservación. Jujuy, Argentina, pp. 88.
- Rivera, L., Politi, N. y E. H. Bucher. 2012a. Nesting hábitat of the Tucuman Parrot *Amazona tucumana* in an old-growth cloud-forest of Argentina. *Bird Cons. Int.* 22: 398-410.
- Rivera, L., Politi, N. y E. H. Bucher. 2012b. Ecología y conservación del Loro Alisero (*Amazona tucumana*). *Hornero* 27: 51-61.
- Rivera, L., Politi, N., Bucher, E. H. y A. Pidgeon. 2014. Nesting success and productivity of Tucuman Parrots (*Amazona tucumana*) in high-altitude forests of Argentina: do they differ from lowland Amazona parrots?. *Emu* 114: 41-49.
- Rivero, E. M., Lartigau, B., Caridad, P. H. y P. Ramírez Llorens. 1996. Registros concretos de nidificación del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la Argentina. *Nuestras Aves* 34: 46.
- Rizzo, F. 2010. Utilización de nidos de hornero (*furnarius rufus*) por el estornino pinto (*Sturnus vulgaris*). *Nuestras Aves* 55: 33-35.
- Roby, D. D. y R. E. Ricklefs. 1983. Some aspects of the breeding biology of the diving petrels *Peleneoides georgicus* and *P. urinatrix exsul* at Bird Island, South Georgia. *Br. Antarctic Surv. Bull.* 58: 29-38.
- Roda, M. A. y B. López Lanús. 2008. The range of Rufous-rumped Seedeater *Sporophila hypochroma* extends to the pampas región of Argentina, whith the first nests of the species. *Cotinga* 30: 61-62.
- Rodríguez, D. 1918a. Costumbres de un dendrocoláptido, *Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach). *Hornero* 1: 105-108.
- Rodríguez, D. 1918b. Costumbres del “Pato Picazo”. *Hornero* 1: 185-187.
- Rodríguez, E. D. 2012. *Aves del cerro San Bernardo y de las serranías del este de la ciudad de Salta*. Fondo Editorial, Salta.
- Rodríguez, E. D. 2013. Registro de nidificación de la Lechucita Canela (*Aegolius harrisii dabbenei*) en la provincia de Salta. *Nuestras Aves* 58: 61-62.
- Rodríguez, E. D. 2014. Nidificación de Coscoroba (*Coscoroba coscoroba*) en el área lacustre de La Lagunilla, provincia de Salta, Argentina. *Nórtulas Faunísticas (Segunda serie)* 157: 1-5.
- Rodríguez, E. D. 2014. Observaciones sobre la reproducción, alimentación y coloración del Pepitero Colorado ('*Saltator rufiventris*'). *Nuestras Aves* 59: 58-60.
- Rodríguez, E. N. 1983. Estructura de jerarquización en la predación de huevos y pichones en *Spheniscus magellanicus*. *Doñana Acta Vert.* 10: 210-212.
- Roesler, I. 2009. El Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su historia natural. *Cotinga* 31: 1-4.
- Roesler, I., Imberti, S., Casañas, H., Mahler, B. y J. C. Reboreda. 2012. Hooded Grebe *Podiceps gallardoi* population decreased by eighty per cent in the last twenty-five years. *Bird Cons. Int.* 22: 371-382.
- Roesler, I., Imberti, S., Casañas, H. E., Hernández, P. M., Klavins, J. M. y L. G. Pagano. 2014. Noteworthy records and natural history comments on rare and threatened bird species from Santa Cruz province, Patagonia, Argentina. *Rev. Bras. Ornit.* 22: 189-200.
- Rojas, T. N., Schaaf, A., Luczywo, A., Díaz, A. y S. I. Peluc. 2013. La predación de nidada como fuerza modeladora de la selección de sitio de nidificación del Pepitero de Collar (*Saltator aurantirostris*). Resúmenes, XV Reunión Argentina de Ornitología, La Pampa.
- Romero, I. P., Codesido, M. y D. N. Bilenca. 2015. Nest bulding by Monk Parakkets *Myopsitta monachus* in urban parks in Buenos Aires, Argentina: are tree species used randomly?. *Ardeola* 62: 323-333.
- Rozadilla S., Arancia Rolando, A. M. y M. J. Motta. 2015. Nuevos registros de águila coronada (*Buteogallus coronatus*) con evidencias de nidificación en el Parque Nacional Talampaya, provincia de La Rioja, Argentina. *Nórtulas Faunísticas (Segunda serie)* 186: 1-5.
- Rovira, M. 2015. E107440, *Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/107440 (acceso 23/09/2015)
- Ruggera, R. A., Schaaf, A. A., Vivanco, C. G., Politi, N y L. O. Rivera. 2016. Exploring nest webs in more detail to improve forest management. *Forest Ecology and Management* 372: 93-100.

- Ruggeri, A. 2014. E54151, *Coscoroba coscoroba* (Molina, 1782).
www.ecoregistros.org/54151 (acceso 20/02/2015)
- Ruggeri, A. 2014. E54132, *Podiceps major* (Boddaert, 1783).
www.ecoregistros.org/54132 (acceso 19/02/2015)
- Rumboll, M. A. E. 1967. Nidificación extra temporal en cañada las víboras Chaco santafesino. *Hornero* 10: 441-443.
- Runnacles, R. M. 1933. Notas sobre la cerceta, *Querquedula flavirostris*. *Hornero* 5: 208-209.
- S**
- Sackmann, P. y J. C. Reboreda. 2003. A comparative study of Shiny Cowbird parasitism in two large hosts: Clrkk-browed Mockingbird and Rufous-bellied Thrush. *Condor* 105: 728-736.
- Saggese, M. D. y E. R. De Lucca. 1995. Reproducción del Gavilán ceniciente *Circus cinereus* en la Patagonia Argentina. *Hornero* 14: 21-26.
- Saggese, M. D. y E. R. De Lucca. 2001. Biología reproductiva del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en la Patagonia sur, Argentina. *Hornero* 16: 77-84.
- Saggese, M. D. y E. R. De Lucca. 2004. Live mammal prey (*Zaedyus pichiy*) in a nest of the Blackcheated Buzzard-Eagle (*Geranoaetus melanoleucus*). *J. Raptor Res.* 38: 101-102.
- Saibene, C. A. 1987. Observaciones sobre la conducta reproductiva del Urutáu y la Mosqueta Amarilla en el Parque Nacional Iguazú. *Nuestras Aves* 14: 14-16.
- Saibene, C. A. 1988. Notas sobre la nidificación del Peutrén *Colorhamphus parvirostris* (Tyrannidae). *Gargancho* 5: 7-8.
- Saibene, C. 1995. Nidificación de aves en Misiones. II. *Nuestras Aves* 31: 20.
- Saibene, C. A., Castelino, M. A., Rey, N. R., Herrera, J. y J. Calo. 1996. *Inventario de las aves del Parque Nacional “Iguazú”*, Misiones, Argentina. Buenos Aires, LOLA.
- Sainz Trápaga, S. 2014. E65933, *Eudromia elegans* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1832).
www.ecoregistros.org/65933 (acceso 19/02/2015)
- Sainz Trápaga, S. 2014. E69451, *Theristicus melanopsis* (Gmelin, 1789).
www.ecoregistros.org/69451 (acceso 21/02/2015)
- Sainz Trápaga, S. 2014. E34102, *Haematopus palliatus* (Temminck, 1820).
www.ecoregistros.org/34102 (acceso 4/03/2015)
- Sainz Trápaga, S. 2014a. E65934, *Charadrius falklandicus* (Latham, 1790).
www.ecoregistros.org/65934 (acceso 4/03/2015)
- Sainz Trápaga, S. 2014b. E34577, *Charadrius falklandicus* (Latham, 1790).
www.ecoregistros.org/34577 (acceso 4/03/2015)
- Sainz Trápaga, S. 2014. E72684, *Bubo magellanicus* (Gmelin, 1788).
www.ecoregistros.org/72684 (acceso 4/03/2015)
- Sainz Trápaga, S. 2015. E96429, *Bubo magellanicus* (Gmelin, 1788).
www.ecoregistros.org/96429 (acceso 3/08/2015)
- Salvador, S. A. 1981a. Desarrollo de una nidada comunal de Pirincho *Guira guira* (Gmelin) (Aves: Cuculidae). *Historia Natural* 2: 29-31.
- Salvador, S. A. 1981b. Datos de nidificación de *Asio flammeus suinda* (Vieillot): (Aves: Strigidae). *Historia Natural* 2: 49-52.
- Salvador, S. A. 1982. Estudio de parasitismo del Crespín *Tapera naevia chochi* (Vieillot) (Aves: Cuculidae). *Historia Natural* 2: 65-70.
- Salvador, S. A. 1983. Parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en Villa María, Córdoba, Argentina (Aves: Icteridae). *Historia Natural* 3: 149-158.
- Salvador, S. A. 1984. Estudio de parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) en Calandria (*Mimus saturninus*), en Villa María, Córdoba. *Hornero* 12: 141-149.
- Salvador, S. A. 1990. Nidificación de rapaces argentinos (Falconiformes y Strigiformes). *Nuestras Aves* 23: 28-29.
- Salvador, S. A. 1991. Notas sobre la nidificación de la Pava de Monte (*Penelope obscura*). *Nuestras Aves* 24: 26.
- Salvador, S. A. 1992. Notas sobre nidificación de aves andinas, en Argentina. Parte II. *Hornero* 13: 242-244.

- Salvador, S. A. 2011a. Reproducción de la familia Podicipedidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Xolmis* 9: 1-6.
- Salvador, S. A. 2011b. Parasitismo de cría del Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Revista Biológica* 14: 49-51.
- Salvador, S. A. 2011c. Biología reproductiva de la Familia Cuculidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera serie)* 1: 101-112.
- Salvador, S. A. 2012a. Nota sobre la reproducción de la Familia Anatidae (Aves) en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Biológica* 15: 11-23.
- Salvador, S. A. 2012b. Reproducción del Lechuzón de Campo (*Asio flammeus suinda*) en Córdoba, Argentina. *Biológica*: 15: 79-83.
- Salvador, S. A. 2012c. Reproducción del Género *Fulica* (Aves, Rallidae) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Biológica*: 15: 37-41.
- Salvador, S. A. 2012d. Dieta del Gavilán Mixto (*Parabuteo u. unicinctus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 21-23.
- Salvador, S.A. 2012e. Reutilización de nidos por aves en el área central de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 91: 1-9.
- Salvador, S. A. 2012f. Víctimas del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en la República Argentina. *Historia Natural (Tercera serie)* 2: 117-138.
- Salvador, S. A. 2012g. Reproducción del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus unicinctus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera serie)* 2: 103-115.
- Salvador, S. A. 2012h. Dieta y reproducción del Halcón Aplomado (*Falco femoralis femoralis*) en Villa María, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera serie)* 2: 111-118.
- Salvador, S. A. 2013a. Reproducción del Carancho (*Caracara plancus*) en Villa María, Córdoba, Argentina. (Aves, Falconidae). *Xolmis* 27: 1-5.
- Salvador, S. A. 2013b. Reproducción de la Familia Tyrannidae en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. I. Huevos, postura y temporada de cría. *Biológica* 16: 7-13.
- Salvador, S. A. 2013c. Reproducción del Género *Colaptes* (Aves: Picidae) en Villa María, Córdoba, Argentina. *Revista Biológica* 16: 20-24.
- Salvador, S. A. 2013d. Biología del Cortarramas (*Phytotoma rutila rutila*) en el departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 58: 30-32.
- Salvador, S. A. 2013e. El Espinero Chico (*Phacellodomus sibilatrix*) un nuevo hospedante del Crespín (*Tapera naevia*). *Nuestras Aves* 58: 58-59.
- Salvador, S. A. 2013f. Reproducción de la Familia Furnariidae en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera serie)* 3: 43-67.
- Salvador, S. A. 2013g. Biología de la Tijereta (*Tyrannus s. savana*) en el departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera serie)* 3: 29-41.
- Salvador, S. A. 2014. Nidos abandonados: utilizados para criar por aves en Argentina. *Biológica* 17: 5-19.
- Salvador, S. A. 2015a. Reproducción de aves Andinas del noroeste Argentino. *Historia Natural (Tercera serie)* 5: 49-76.
- Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2011. Nuevas víctimas del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en Argentina. *Nuestras Aves* 56: 38-39.
- Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013a. Aves víctimas del parasitismo del Género *Philornis* en Argentina. *Nuestras Aves* 58: 16-21.
- Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013b. Reproducción del Atajacamino Chico (*Setopagis parvulus*) en las provincias de Córdoba y Chaco, Argentina. *Nuestra Aves* 58: 21-24.
- Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2013c. Vertebrados y huevos en la alimentación de algunos Passeriformes de Argentina. *Biológica* 16: 135-140.
- Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2014a. Observaciones sobre una colonia de cría del Boyero Cacique (*Cacicus haemorrhouss*) en Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 59: 47-49.
- Salvador, S. A. y A. Bodrati. 2014b. Actualización de las víctimas de parasitismo

- del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis bonariensis*) en la República Argentina. *Biológica* 17: 23-35.
- Salvador, S. A. y M. R. De la Peña. 2014. Nidadas anormales de Tero Común (*Vanellus chilensis*) en Argentina. *Biológica* 17: 60-61.
- Salvador, S. A. y S. Narosky. 1983. Nuevos nidos de aves argentinas, *Muscisaxicola rufiventris*, *Catamenia inornata*, *Sicalis olivascens* y *Carduelis crassirostris*. *Hornero* 12: 134-137.
- Salvador, S. A. y S. Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas, en la Argentina. *Hornero* 12: 184-188.
- Salvador, S. A. y T. Narosky. 1987. Nuevos registros para aves argentinas. *Nuestras Aves* 13: 9-11.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1984. Notas sobre hospedantes del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) (Aves: Icteridae). *Historia Natural* 4: 121-130.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1986. Nota sobre la reproducción del Misto (*Sicalis luteola*) en Córdoba, Argentina. *Hornero* 12: 274-280.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 1988. Nidificación de aves en Pampa de Achala, Córdoba. *Nuestras Aves* 16: 20-23.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2012. Reproducción de aves de Pampa de Achala, Córdoba, Argentina. *Historia Natural (Tercera Serie)* 2: 119-145.
- Salvador, S. A. y L. A. Salvador. 2014. Aves de Villa María y del departamento General San Martín, Córdoba, Argentina. *Xolmis* 36: 1-18.
- Salvador S. A., Bodrati, A. y L. A. Salvador. 2014. Aportes al conocimiento de la reproducción del Atajacamino Colorado (*Antrostomus rufus*) en Argentina. *Nuestras Aves* 59:
- Salvador, S. A., Narosky, S. y R. M. Fraga. 1984. Descripción del nido y los huevos de la Caminera Pico Largo (*Geositta tenuirostris*) (Aves: Furnariidae). *Historia Natural* 3: 224.
- Salvador, S. A., Narosky, S. y R. M. Fraga. 1986. First description of the nest and eggs of the Rufous-Throated Dipper (*Cinclus schulzii*) in Northwestern Argentina. *Le Gerfaut* 76: 63-66.
- Salvador, S. A., Narosky, T. y L. A. Salvador. 1985. Colonia de nidificación en Entre Ríos. *Nuestras Aves* 7: 11-13.
- Salvador, S. A., Pagano, L. G. y F. G. Di Sallo. En prensa. Primeros registros provinciales de reproducción de algunas aves en Argentina (Catamarca y La Rioja). *Nuestras Aves*
- Salvador, S. A., Fiorucci, M., Santillán, M. A. y M. S. Liébana. 2015. Registros de nidadas de cuatro huevos o cuatro pichones de Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Argentina. *Nuestras Aves* 60: 92-94.
- Salvador, S. A., Salvador, L. A., Gandoy, F. A y J. I. Areta. En prensa. La Golondrina Rabadilla Canela (*Petrochelidon pyrrhonota*) cría en Sudamérica. *Ornit. Neotr.*
- Salvetti, H. 1975. El Flamenco de la Laguna de Mar Chiquita. *Mus. Aníbal Montes*. Pp. 1-23.
- Sánchez, A. D. y M. J. Solis Fieg. 2012. Primer registro documentado de parasitismo de Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*). *Nuestras Aves* 57: 62-63.
- Sanchez, R., Blendiner, P. G., Moyano Wagner, E. y E. Martín. 2013. Hierarchical habitat selection and reproductive success of the Ringed Warbling-Finch in Chaco wood lands. *Condor* 115: 893-901.
- San Martín, B. L. 1927. Nidificación del siete cuchillas (*Phleocryptes melanops*). *Hornero* 4: 81.
- Santillán, M. A., Travaini, A. y J. Fernández. 2010. Dieta del Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*) en la Ría Deseado, Patagonia austral Argentina. *Bol. Chil. Ornit.* 16: 1-8.
- Santillán, M. A., Carpintero P., D.L., Galmes, M. A. y J. H. Sarasola. 2009. "Presence of cimicid bugs (Hemiptera: Cimicidae) on a crowded eagle (*Harpyhaliaetus coronatus*) nestling: a cost of using communal monk parakeet (*Myiopsitta monachus*) nests for breeding?". *J. Raptor Res.* 43: 255-256.
- Santillán, M. A., Travaini, A., Procopio, D. E., Zanón, J. I., Yaya, M., de la Cruz Martínez, J. y R. Martínez Peck. 2010. New records indicate that Austral Pygmy Owl *Glaucidium nanum* breeds in eastern Patagonia. *Cotinga* 32: OL 1-4.

- Santos Gollan, J. 1951. Un refugio de aves acuáticas. El Parque Nacional Laguna Blanca. *Hornero* 9: 280-287.
- Sapoznikow, A. y F. Quintana. 2002. Eviience for Rock Shags *Phalacrocorax magellanicus* and Imperial Cormorants *P. atriceps* leaving their nests at night. *Marine Ornith.* 30: 34-35.
- Sapoznikow, A. y F. Quintana. 2009. Asincronía de puesta y reposición de la nidada en el Cormorán Cuello Negro (*Phalacrocorax magellanicus*): ¿evidencias de las características de su fuente de alimento?. *Hornero* 24: 21-30.
- Sarasola, H., R. A. Sosa y J. J. Maceda. 2000. A case of nest predation on Turkey Vulture nesting in Argentina. *J. Raptor Res.* 34: 60.
- Sardina Aragón, P. N., Rivera, L. O. y N. Politi. 2011. Variación de la abundancia del Pato de Torrentes (*Merganetta armata*) y características del hábitat en dos ríos de montaña de la provincia de Jujuy, Argentina. *Ornit. Neotr.* 22: 589-599.
- Sardina Aragón, P. N., Politi, N. y R. M. Barquez. 2015. Nests and nest site characteristics of Rufous-Throated Dipper (*Cinclus schulzi*) in mountain rivers of northwestern Argentina. *Waterbirds* 38: 315-320.
- Sarria, R., Cozzani, N., Zalba, S. M. y L. Dispigno. 2009. Colonia reproductiva de *Circus buffoni* y *Circus cinereus* en la costa del Partido de Bahía Blanca (Buenos Aires). Resúmes XIII Reunión Argentina de Ornitología. Taff del Valle, Tucumán.
- Sauad, J. J., Garrido, J. L. y Z. M. Chorolque. 1991a. Ambientes de nidificación del Loro Hablador Amazona aestiva, Salta, Argentina. I. Composición y análisis de los patrones espaciales de la vegetación. *Manejo de Fauna* 3: 1-23.
- Sauad, J. J., Nuñez, V., Garrido, J. L., Calzón, M. E. y Z. M. Chorolque. 1991b. Ambientes de nidificación del Loro Hablador Amazona aestiva, Salta, Argentina. II. Densidad de nidos. *Manejo de Fauna* 5: 1-9.
- Sauad, J. J., Nuñez, V., Garrido, J. L., Mosa, S., Calzón, M. E. y Z. M. Chorolque. 1991c. Ambientes de nidificación del Loro Hablador Amazona aestiva, Salta, Argentina. II. Características de los árboles-nidos. *Manejo de Fauna* 4: 1-12.
- Schaaf, A., Peralta, G., Luczywo, A., Díaz, A., y S. I. Peluc. 2015. Biología reproductiva y comportamiento de cuidado parental de dos especies de Atajacaminos de Córdoba, Argentina. *Ornit. Neotr.* 26: 25-37.
- Schaaf, A. A., Luczywo, A., Díaz, A., Peralta, G. y S. Peluc. 2014. Descripción de nido, huevos, comportamiento de incubación y pichones de la charata (*Ornalis canicollis*) en el Bosque Chaqueño Serrano de Córdoba, Argentina. *Bull.Cracid Group* 36: 8-16.
- Schaaf, A. A., Peralta, G., Luczywo, A., Díaz, A. y S. Peluc. Aspectos reproductivos de siete especies de aves en el bosque chaqueño serrano, Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 60: 18-27.
- Schefski, V. D. 2014. E35037, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). www.ecoregistros.org/35037 (acceso 19/02/2015)
- Schefski, V. D. 2015. E79780, *Chloephaga picta* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/79780 (acceso 20/02/2015)
- Schefski, V. E. 2015. E82349, *Pardirallus sanguinolentus* (Swainson, 1838). www.ecoregistros.org/82349 (acceso 22/02/2015)
- Schiavini, A. y P. Yorio. 1995. Distribution and abundance of seabird colonies in the Argentine sector of the Beagle Channel, Tierra del Fuego. *Maryne Ornith.* 23: 39-46.
- Schiavini, A., Yorio, P. y E. Frere. 1998. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Isla de los Estados e Islas de Año Nuevo (Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Pp. 179-221 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Schiavini, A., Frere, E., Yorio, P. y A. Parera. 1999. Las aves marinas de la Isla de los Estados, Tierra del Fuego, Argentina: revisión histórica, estado poblacional y problemas de conservación. *Anal. Inst. Patagonia* 27: 25-40.
- Schmidt, C. 2014. E32952, *Thinocorus rumicivorus* (Eschscholtz, 1829).

- www.ecoregistros.org/32952 (acceso 24/03/2015)
- Schmidtuz, C. y C. Agulán. 1988. Nidificación del Estornino Pinto. *Nuestras Aves* 17:13.
- Schreiber, H. 2012. E17033, *Trogon surrucura* (Vieillot, 1817).
www.ecoregistros.org/17033 (acceso 4/03/2015)
- Sciosa, G., Raya Rey, A. Favero, M. y A. Schiavini. 2010. Factores que afectan el éxito reproductivo y calidad de la nidada del Pingüino Patagónico (*Spheniscus magellanicus*) en el Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. *Hornero* 25: 17-25.
- Scolaro, J. A. 1979. *La fascinante vida de un Pingüino Patagónico*. Ed. Impresora Sur.
- Scolaro, J. A. 1984. Timing of nest relief during incubation and guard atage period of chicks in Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*) (Aves: Spheniscidae). *Historia Natural* 4: 281-284.
- Scolaro, J. A. 1990. Effects of nest density on breeding success in a colony of Magellanic Penguins (*Spheniscus magellanicus*). *Colonial Waterbirds* 13: 41-49.
- Scolaro, J. A. y L. Arias de Reyna. 1984. Distribución espacial actualizada de la nidificación y tamaño de la población de *Spheniscus magellanicus* en Punta Tombo, Chubut, Argentina. (Aves: Spheniscidae). *Historia Natural* 4: 249-256.
- Scolaro, J. A., Badano, L. A. y J. A. Upton. 1984. Estimación de la población y estructura de nidificación de *Spheniscus magellanicus* en Punta Lobería, Chubut, Argentina (Aves: Spheniscidae). *Historia Natural* 4: 229-238.
- Scolaro, J. A., Laurenti, S. y H. Gallelli. 1996. The nesting and breeding biology of the South American Tern in northern Patagonia. *J. Field Ornithol.* 67: 17-24.
- Scolaro, J. A., Hall, M., Ximenez, I. M. y O. Kovacs. 1980. El Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) II. Biología y desarrollo de la incubación en la colonia de Punta Tombo, Chubut, Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 2: 103-110.
- Segovia, J. M. y K. Cockle. 2012. Conservación del Loro Vinoso (*Amazona vinacea*) en Argentina. *Hornero* 27: 27-37.
- Segovia, J. M., Cockle, K. y A. Bodrati. 2009. Biología reproductiva de cinco especies de loros de la Selva Atlántica. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitología, Tucumán.
- Segura, F. A. 2011. E6918, *Pseudoscops clamator* (Vieillot, 1807).
www.ecoregistros.org/6918 (acceso 4/03/2015)
- Segura, F. A. 2014. E41169, *Tachyeres patachonicus* (King, 1828).
www.ecoregistros.org/41169 (acceso 21/02/2015)
- Segura, F. A. 2014. E64319, *Anas sibilatrix* (Poeppig, 1829).
www.ecoregistros.org/64319 (acceso 20/02/2015)
- Segura, F. A. 2014. E41152, *Oxyura ferruginea* (Eyton, 1838). www.ecoregistros.org/41152 (acceso 20/02/2015)
- Segura, F. A. 2014. E65299, *Elanus lecurus* (Vieillot, 1818).
www.ecoregistros.org/65299 (acceso 21/02/2015)
- Segura, F. A. 2014. E69831, *Fulica ardesiaca* (Tschudi, 1843).
www.ecoregistros.org/69831 (acceso 22/02/2015)
- Segura, F. A. 2015. E78334, *Bubo magellanicus* (Gmelin, 1788).
www.ecoregistros.org/78334 (acceso 4/03/2015)
- Segura, L. N. y M. F. Arturi. 2009. Selección de sitios de nidificación del Cardenal Común (*Paroaria coronata*) en bosques naturales de Argentina. *Ornit. Neotr.* 20: 203-213.
- Segura, L. N. e I. Berkunsky. 2012. Supervivencia de nidos de Cardenal Común (*Paroaria coronata*) en un hábitat modificado en Argentina. *Ornit. Neotr.* 23: 489-498.
- Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2011. Botfly parasitism effects on nestling growth and mortality of Red-crested Cardinals. *Wilson Jour. Ornith.* 123:107–115.
- Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2012a. Nest survival rates of Red-crested Cardinals increase with nest age in south-temperate forests of Argentina. *J. Field Ornith.* 83: 343-350.
- Segura, L. N. y J. C. Reboreda. 2012b. Red-crested Cardinal defenses against shiny cowbird parasitism. *Behaviour* 149: 325-343.
- Segura, L. N., Masson, D. A. y M. G. Gantchoff. 2012. Microhabitat nest cover

- effect on nest survival of the Red-crested Cardinal. *Wilson Jour. Ornith.* 124: 506-512.
- Segura, L. N., Bogado, N., Darrieu, C. A. y D. Montalti. 2014. La colección de huevos "Pablo Girard" del Museo de La Plata. *ProBiota, Serie Técnica y Didáctica* 27: 1-15.
- Segura, L. N., Bogado, N., Darrieu, C. A. y D. Montalti. 2014. La colección de huevos "Ronald Runnacles" del Museo de La Plata: historia y material depositado. *Rev. Museo La Plata, Sección Zoología* 24: 1-9.
- Segura, L.N., Mahler, B., Berkunsky, I. y J. C. Reboreda. 2015. Nesting biology of the Red-crested Cardinal (*Paroaria coronata*) in south temperate forests of central Argentina. *Wilson Jour. Ornith.* 127: 249-258.
- Segura, L. N., Depino, E. A., Gandoy, F., Di Sallo, F. G. y M. F. Arturi. 2014. La distancia entre los parches de bosque y el tamaño de los árboles influyen en la abundancia del Cardenal Común (*Paroaria coronata*) en bosques naturales de Argentina. *Interciencia* 39: 55-59.
- Seipke, S. H. 2012. First record of Southern Caracaras (*Caracara plancus*) nesting on a human-made object. *J. Raptor Res.* 46: 228-230.
- Seipke, S. H. y G. S. Cabanne. 2008. Breeding of the Rufous-thighed Hawk (*Accipiter erythroneurus*) in Argentina y Brazil. *Ornit. Neotr.* 19: 15-29.
- Serié, P. 1919. Observaciones sobre nidos de Horneros. *Hornero* 1: 290-291.
- Serié, P. 1923a. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 3: 99-100.
- Serié, P. 1923b. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 3: 189-191.
- Serié, P. 1926. Miscelánea Ornitológica. *Hornero* 3: 417-420.
- Serié, P. y C. H. Smyth. 1923. Notas sobre Aves de Santa Elena (E. Ríos). *Hornero* 3: 37-55.
- Serur, P. 2012. E10956, *Merganetta armata* (Gould, 1842). www.ecoregistros.org/10956 (acceso 21/02/2015)
- Serur, P. 2014. E34663, *Amblyramphus holosericeus* (Scopoli, 1786). www.ecoregistros.org/34663 (acceso 6/03/2015)
- Short, L. L. 1967. Some unusual birds of southern Buenos Aires Province. *Hornero* 10: 459-460.
- Short, L. L. 1970. Notes on the habits of some Argentine and Peruvian woodpeckers (Aves, Picidae). *Am. Mus. Novitates* 2413: 1-37.
- Short, L. L. 1970. The habits and relationships of the Magellanic Woodpecker. *Wilson Bull.* 82: 115-129.
- Short, L. L. 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 9: 283-309.
- Short, L. L. 1972. Systematics and behavior of South American Flickers (Aves, *Colaptes*). *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 149: 1-110.
- Short, L. L. 1982. *Woodpeckers of the World*. Delaware Museum of Natural History, Greenville, Del.
- Sicco, F. 2012. E16829, *Larus atlanticus* (Olrog, 1958). www.ecoregistros.org/16829 (acceso 4/03/2015)
- Siegel Causey, D. 1986. Behaviour and affinities of the Magellanic Cormorant. *Notornis* 33: 249-257.
- Simonetti, P. y S. M. Fiori. 2009. Biologías reproductivas del Ostrero Pardo, *Haematopus palliatus*, en el estuario de Bahía Blanca. Resúmenes, XIII Reunión Argentina de Ornitología, Tucumán.
- Schmidt, C. 2014. E32952, *Thinocorus rumicivorus* (Eschscholtz, 1829). www.ecoregistros.org/32952 (acceso 4/03/2015)
- Smyth, C. H. 1926. Comunismo del tordo (*Molothrus badius*). *Hornero* 3: 416-417.
- Smyth, C. H. 1927. Descripción de una colección de huevos de aves argentinas. *Hornero* 4: 1-16.
- Smyth, C. H. 1928. Descripción de una colección de huevos de aves argentinas. *Hornero* 4: 125-152.
- Soave, G. E., Coria, N. R., Montalti, D. y A. Curtosi. 2000. Breeding flying birds in the region of the Fildes Peninsula, King George Island, South Shetland Islands, Antarctica, 1995/96. *Marine Ornith.* 28: 37-40.
- Solaro, C. y J. H. Sarasola. 2012. First observation of infanticide and cannibalism in nest of Chimango Caracara (*Milvago chimango*). *J. Raptor Res.* 46: 412-413.
- Solaro, C. y J. H. Sarasola. 2015. Nest-spacing, not human presence influences the breeding of Chimango Caracaras (*Milvago chimango*) in a peri-urban reserve. *Emu* 115: 72-75.

- Soria, K. 2015. Descripción del nido y los pichones de la Monterita Serrana (*Compsospiza baeri*). *Hornero* 30: 29-32.
- Soria, K., Zelaya, P., Ortiz, D. y P. Caplonch. 2012. Breve análisis de la avifauna de Pozo Hondo, Santiago del Estero, Argentina. *Nuestras Aves* 57: 3-8.
- Soriano, E. 2014. E43258, *Parabuteo unicinctus* (Temminck, 1824). www.ecoregistros.org/43258 (acceso 21/02/2015)
- Sosa, H. 1993. Situación de la avifauna acuática de Laguna Blanca “Coihue-Co”, Malargüe, Mendoza. *Multequina* 2: 243-249.
- Sosa, H. 1995. Actualización de la lista de avifauna de la Reserva Provincial Laguna Llancanelo, Malargüe, Mendoza. Presencia estacional, referencias de hábitat y nidificación. *Multequina* 4: 65-75.
- Sosa, H. 1999. Descripción del evento reproductivo del Flamenco Austral (*Phoenicopterus chilensis*) en Laguna Llancanelo, Malargüe, Mendoza. *Multequina* 8: 87-99.
- Sosa, H. 2003. Nuevos registros de aves acuáticas para la provincia de Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves* 45: 24-26.
- Sosa, H. 2005. *Aves no passeriformes de Llancanelo y zonas de influencia*. Ed. Aguirre. Mendoza.
- Sosa, H. y S. Martín. 2010. Primer registro de la parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) nidificando en la laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 42: 1-3.
- Sosa, H. y S. Martín. 2011. Descripción de la colonia de nidificación del flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en la reserva provincial Laguna Llancanelo, Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas (segunda serie)* 78: 1-10.
- Sosa, R. A. 2015. E81661, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/81661 (acceso 20/02/2015)
- Soteras, G. 2011. E3476, *Melanerpes flavifrons* (Vieillot, 1818). www.ecoregistros.org/3476 (acceso 4/03/2015)
- Soteras, G. 2011. E2659, *Psarocolius decumanus* (Pallas, 1769). www.ecoregistros.org/2659 (acceso 6/03/2015)
- Spegazzini, C. 1920. El gigante de los picaflores en La Plata. *Hornero* 2: 138.
- Spinuzza J. M., 2013. Registro de nidificación del huet-huet castaño (*Pteroptochos castaneus*) en la Argentina y algunas observaciones de la etología reproductiva. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 131: 1-5.
- Spinuzza J. M. y F. Villegas, 2013. Primer registro del boyero negro (*Cacicus solitarius*) para la reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y laguna Mar Chiquita y para la provincia de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 119: 1-5.
- Spinuzza, J. M., Alzogaray, S. y J. Giménez. 2009. Nuevos registros de nidificación del Peutré (*Colorhamphus parvirostris*) en el Parque Nacional Lanín y consideraciones sobre su comportamiento. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 30: 1-7.
- Sternberg, C. 1869. Notizen aus der Vogelwelt von Buenos-Ayres. *Journ. für Ornith.* 1869: 174-193, 257-278.
- Stiles, E. W. 1979. Nest and eggs of the White-browed Tapaculo (*Scytalopus superciliaris*). *Condor* 81: 208.
- Storer, R. W. 1981. the Hooded Grebe on Laguna de los Escarchados: Ecology and behavior. *Living Bird* 19: 51-67.
- Storer, R. W. 1982. A hybrid between the Hooded and Silver Grebes (*Podiceps gallardoi* y *P. occipitalis*). *Auk* 99: 168-169.
- Straneck, R., Ridgely, A., Rumbol, M. y J. Herrera. 1987. El nido del Atajacaminos Castaño *Lurocalis nattereri* (Temminck) (Aves, Caprimulgidae). *Com. Mus. Arg. Cienc. Nat.* 4: 133-136.
- Strange, I. J. 1968. A breeding colony of *Pachyptila turtur* in the Falkland Island. *Ibis* 110: 358-359.
- Suárez, N., Pozzi, L. y P. Yorio. 2010. Nest site selection of the Kelp Gull (*Larus dominicanus*) in the Beagle Channel, Tierra del Fuego, Argentina. *Polar Biol.* 33: 215-221.
- Suárez, N. y P. Yorio. 2005. Foraging patterns of breeding Dolphin Gulls *Larus scoresbii* at Punta Tombo, Argentina. *Ibis* 147: 544-551.
- Suárez, N., Marianoa, C., Kasinsky, T. y P. Yorio. 2014. Distribución reproductiva y abundancia de gaviotas y gavotines en el

- área natural protegida Bahía San Blas, Buenos Aires. *Hornero* 29: 29-36.
- Svagelj, W. S., Agüero, M. L. y P. García Borboroglu. 2012. Variation in the size of eggs of Chubut Steamer Ducks (*Tachyeres leucocephalus*). *Emu* 112: 167-172.
- Svagelj, W. S., Lisnizer, N., García Borboroglu, P. y P. Yorio. 2015. Variation in the size of eggs of Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) at two colonies in Patagonia, Argentina. *Waterbirds* 38: 92-98.
- T**
- Tagtachian, J. S. 2014. E41114, *Rollandia rolland* (Quoy & Gaimard, 1824). www.ecoregistros.org/41114 (acceso 19/02/2015)
- Tagtachian, J. S. 2015. E80361, *Dendrocygna bicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/80361 (acceso 20/02/2015)
- Tagtachian, J. S. 2015. E82733, *Nomonyx dominicus* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/82733 (acceso 20/02/2015)
- Tajer, L., Rizzo, F. y E. Palombarini. 2007. Relevamiento de las aves del Parque Plaza Montero, Reserva Natural Urbana de Las Flores Provincia de Buenos Aires – Argentina. Aves Argentina/AOP Pp: 1-19.
- Tejo, L. C. 2015. E117925, *Stephanoxis loddigesii* (Gould, 1831). www.ecoregistros.org/117925 (acceso 14/12/2015)
- Tella, J. L., Canale, A., Carrete, M., Petracci, P. y S. M. Zalba. 2014. Anthropogenic nesting sites allow urban breeding in Burrowing Parrots *Cyanoliseus patagonus*. *Ardeola* 61: 311-321.
- Terán, A. 2014. E49826, *Jacana jacana* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/49826 (acceso 4/03/2015)
- Terán, A. 2014. E69318, *Asio stygius* (Wagler, 1832). www.ecoregistros.org/69318 (acceso 4/03/2015)
- Terán, A. 2014. E50286, *Molothrus oryzivorus* (Gmelin, 1788). www.ecoregistros.org/50286 (acceso 24/08/2015)
- Tickell, W. L. N. y R. Pinder. 1975. Breeding biology of the Black-browed Albatross *Diomedea melanophris* and Grey-headed Albatross *D. chrysostoma* at Bird Island, South Georgia. *Ibis* 117: 433-451.
- Tittarelli, R. F. y D. Villareal. 2009a. Registro de reproducción del Lechuzón Orejudo (*Asio clamator*) en el bosque de caldén (*Prosopis caldenia*) de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 32-33.
- Tittarelli, R. F. y D. Villareal. 2009b. Alimentación piscívora de un pichón de Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en los Bañados del Atuel, La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 41-42.
- Tocce, J. 2012. E13060, *Rhea pennata* (d'Orbigny, 1834). www.ecoregistros.org/13060 (acceso 19/02/2015)
- Tocce, J. 2013. E30907, *Chloephaga poliocephala* (Sclater, 1857). www.ecoregistros.org/30907 (acceso 20/02/2015)
- Tocce, J. 2013. E27733, *Anas flavirostris* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/27733 (acceso 21/02/2015)
- Tocce, J. 2013. E29266, *Falco peregrinus* (Tunstall, 1771). www.ecoregistros.org/29266 (acceso 21/02/20)
- Tocce, J. 2013. E29267, *Veniliornis mixtus* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/29267 (acceso 4/03/2015)
- Tocce, J. 2014. E71772, *Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot, 1817). www.ecoregistros.org/71772 (acceso 4/12/2015)
- Tocce, J. 2015. E77431, *Cygnus melancoryphus* (Molina, 1782). www.ecoregistros.org/77431 (acceso 20/02/2015)
- Tolosa, H. 2011. E1430, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). www.ecoregistros.org/1430 (acceso 19/02/2015)
- Tolosa, H. 2011. E10497, *Chloephaga picta* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/10497 (acceso 20/02/2015)
- Tolosa, H. 2013. E30619, *Anas versicolor* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/30619 (acceso 20/02/2015)

- Tolosa, H. 2015. E79796, *Netta peposaca* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/79796 (acceso 21/02/2015)
- Tocce, J. 2015. E75739, *Gallinula melanops* (Vieillot, 1819). www.ecoregistros.org/75739 (acceso 22/02/2015)
- Tomo, A. P. 1971. Aves y mamíferos antárticos (guía para su reconocimiento). *Dirección Nacional del Antártico. Divulgación N° 1.*
- Torrano, F. J. Curiosa costumbre de ocultamiento de los pichones en Gallito de Agua. *Nuestras Aves* 9: 5.
- Torres, R. M. y M. Gutiérrez. 1998. Biología de la nidificación de la garcita azulada *Butorides striatus* en la Laguna Mar Chiquita (Córdoba). Resúmenes, X Reunión Argentina de Ornitología, Mar del Plata.
- Torres, R. y M. Gutiérrez. 1999. Dieta de los pichones de la Garcita Bueyera (*Bubulcus ibis*) en la Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 30: 35-41.
- Torres, R. y A. Mangeau. 2006. Factors affecting the nesting success of the Catle Egret (*Bubulcus ibis*) in Laguna Mar Chiquita, central Argentina. *Ornit. Neotr.* 17: 63-71.
- Torres, R. y P. Michelutti. 2001. Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita – Bañados del Río Dulce (provincias de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina). *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba*. 66: 61-72.
- Torres, R. M. y P. Michelutti. 2006. Aves Acuáticas. En: Bañados del río Dulce y laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (ed. Bucher E.H.), pp. 237-249 Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina).
- Torres, R., Michelutti, P., Dominino, J., León, J., Mangeaud, A., Rodríguez, A., Pozzi, C., Plencovich, G., Pagot, M. y G. Hillman. 2010. Effects of weather and water level on reproduction of colonial waterbirds in laguna Mar Chiquita - bañados del Río Dulce (central Argentina). *Ornit. Neotr.* 21: 383-396.
- Torres, S. J. 2013. E21794, *Nothura maculosa* (Temminck, 1815). www.ecoregistros.org/21794 (acceso 19/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E68389, *Anas sibilatrix* (Poeppig, 1829). www.ecoregistros.org/68389 (acceso 20/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E65644, *Podilymbus podiceps* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/65644 (acceso 19/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E63194, *Chauna torquata* (Oken, 1816). www.ecoregistros.org/63194 (acceso 19/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E34640, *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/34640 (acceso 20/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E67416, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/67416 (acceso 20/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E65950, *Anas platalea* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/65950 (acceso 20/02/2015)
- Torres, S. J. 2014. E68023, *Anas bahamensis* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/68023 (acceso 21/02/2015)
- Torres, S. J. 2015. E81885, *Rhea americana* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/81885 (acceso 19/02/2015)
- Travaini, A., Donázar, J. A., Ceballos, O., Funes, M., Rodríguez, A., Bustamante, J., Delibes, M. y F. Hiraldo. 1994. Nest-site characteristics of four raptor species in the Argentinian Patagonia. *Wilson Bull.* 106: 753-757.
- Trejo, A., Ojeda, V. y L. Sympson. 2001. First nest records of the White-throated Hawk (*Buteo albogularis*) in Argentina. *J. Raptor Res.* 35: 169-170.
- Trejo, A., Ojeda, V., Sympson, L. y M. Gelain. 2004. Breeding biology and nest characteristics of the White-throated Hawk (*Buteo albogularis*) in northwestern Argentine Patagonia. *J. Raptor Res.* 38: 1-8.
- Tuero, D. T., Fiorini, V. D. y J. C. Reboreda. 2007. Effects of Shiny Cowbird parasitism on different components of House Wren reproductive success. *Ibis* 149: 521-529.
- Tuero, D. T., Fiorini, V. D., Mahler, B. y J. C. Reboreda. 2012. Shiny Cowbird egg size and chick growth vary between two hosts

- that differ markedly in body size. *Jour. Avian Biol.* 43: 227-233.
- Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2008. Insects found in birds' nests from Argentina: *Anumbius annumbi* (Vieillot, 1817) (Aves: Furnariidae). *Zootaxa* 1871: 1-55.
- Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2010. Insects found in birds' nests from Argentina. *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788) (Aves: Furnariidae) and their inquiline birds, the true hosts of *Acanthocrios furnarii* (Cordero & Vogelseng, 1928) (Hemiptera: Heteroptera: Cimidae). *Zootaxa* 2700:1-112.
- Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2013. Insectos en nidos de aves de Argentina: *Asthenes dorbignyi* (Reichenbach, 1853) [Aves: Furnariidae]. *Idesia* 31: 87-94.
- Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2014a. Insects found in birds' nests from Argentina. *Pseudoseisura lophotes* Reichenbach, 1853 and *Anumbius annumbi* (Vieillot, 1817) (Aves: Furnariidae), hosts of *Triatoma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). *Zootaxa* 3766: 1-82.
- Turienzo, P. y O. Di Iorio. 2014b. Insects found in birds' nests from Argentina: *Coryphistera alaudina* Burmeister, 1860 (Aves: Furnariidae), their inquiline birds and mammals, new hosts for *Psammolestes coreodes* Bergroth, 1911 and *Triatoma platensis* Neiva, 1913 (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae). *Zootaxa* 3811: 151-184.
- Tyler, S. J. 1994. Yungas of Argentina: in Search of Rufous-throated Dippers, *Cinclus schulzi*. *Cotinga* 2: 38-41.
- Tyler, S. J. y L. Tyler. 1996. The Rufous-throated Dipper *Cinclus schulzi* on rivers in north-west Argentina and southern Bolivia. *Bird Conservation International* 6:103-116.
- U**
- Upton, J. A. y C. N. Beloso. 1984. Observaciones sobre la reproducción de *Egretta alba egretta* (Gmelin) en Punta Lobería, Chubut (Aves, Ardeidae). *Historia Natural* 4: 79-80.
- Uranga, M. 2016. E148408, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/148408 (acceso 3/05/2016)
- Uranga, M. 2016. E148408, *Callonetta leucophrys* (Vieillot, 1816). www.ecoregistros.org/148408 (acceso 3/05/2016)
- Uranga, M. 2016. E148492, *Sappho sparganurus* (Shaw, 1812). www.ecoregistros.org/148492 (acceso 4/05/2016)
- Uranga, M. 2016. E148494, *Pipraeidea bonariensis*. www.ecoregistros.org/148494 (acceso 4/05/2016)
- Uranga, M. 2016. E148491, *Saltator aurantiirostris* (Vieillot, 1817). www.ecoregistros.org/148491 (acceso 4/05/2016)
- Uranga, M. 2016. E148490, *Spinus magellanicus*. www.ecoregistros.org/148490 (acceso 4/05/2016)
- Utges, E. E. 1992. Crianza invernal del Chingolo (*Zonotrichia capensis*). *Nuestras Aves* 27: 35.
- V**
- Valles, T. A. 2012. E11153, *Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot, 1818). www.ecoregistros.org/11153 (acceso 4/03/2015)
- Valpredra, C. 2013. E20974, *Tigrisoma lineatum* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/20974 (acceso 21/02/2015)
- Vaňecek, R. 2014. E42864, *Chloephaga poliocephala* (Sclater, 1857). www.ecoregistros.org/42864 (acceso 20/02/2015)
- Varales, D. 2015. E77715, *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789). www.ecoregistros.org/77715 (acceso 21/02/2015)
- Vasina, W. G. y R. J. Straneck. 1984. Biological and ethological notes on *Falco peregrinus cassini* in central Argentina. *J. Raptor Res.* 18: 123-130.
- Vaurie, C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (Aves, Passeriformes). *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* Vol. 166.
- Veiga, J. O. 1993. Observaciones sobre *Cardielis uropygialis* en Neuquén. *Nuestras Aves* 29: 29.
- Veiga, J. O. y G. Dupuy. 2009. Nuevas especies y registros de aves para la provincia de

- Neuquén, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 79-81.
- Veiga, J. O., Babarskas, P. y P. E. Acerbo. 2002. Nuevas observaciones de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. *Nuestras Aves* 44: 10-11.
- Veiga, J. O., Colina, U., Güller, R., Savigny, C. y P. Rodríguez Elías. 2014. Actualizaciones sobre la presencia de algunas especies de aves no Passeriformes en las provincias de Jujuy y Salta, Argentina. *Nótulas Faunísticas (Segunda serie)* 150: 1-15.
- Vergara Tabares, D. y S. I. Peluc. 2013. Aspectos de la biología reproductiva del Zorzal Chiguancó (*Turdus chiguancó*) en el Chaco Serrano de Córdoba, Argentina. *Ornit. Neotr.* 24: 267-278.
- Vides Almonacid, R. 1988. Nota sobre el estado de las poblaciones de Gallareta Cornuda (*Fulica cornuta*) en la provincia de Tucumán, Argentina. *Hornero* 13: 34-38.
- Vides Almonacid, R. 1990. Observaciones sobre la utilización del hábitat y la diversidad de especies de aves en una laguna de la Puna Argentina. *Hornero* 13: 117-128.
- Vilches, A. y G. Berasain. 1998. Nidificación de la Gaviota Capuchón Café (*Larus maculipennis*) en la laguna Lacombe, Buenos Aires. Resúmenes, X Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires.
- Villamil, J. 2012. E16046, *Rhea pennata* (d'Orbigny, 1834). www.ecoregistros.org/16046 (acceso 19/02/2015)
- Vitale, S. y K. L. Cockle. 2012. Diademed Sandpiper-Plover *Phegornis mitchellii*. *Neotropical Birding* 10: 59-62.
- Vitale, S., Cockle, K., Bodrati, A., Ferrari, C., Roesle, I., Jordan, E. y D. Rasmussen. 2010. Nidificación y distribución de la Torcaza Alas Blancas (*Zenaida meloda*) en Argentina. *Nuestras Aves* 55: 6-8.
- Vizentin Bugini, J., Areta, J. I., Di Giacomo, A. G., Di Giacomo, A. S., Jacobs, F., Coimbra, M. A. A. y R. A. Dias. 2013. Breeding biology and conservation of the Marsh Seedeater *Sporophila palustris*. *Bird Conserv. Int.* 23: 147-158.
- Volpe, N. L. y R. M. Aramburú. 2011. Preferencias de nidificación de la Cotorra (*Myiopsitta monachus*) en un área urbana de Argentina. *Ornit. Neotr.* 22: 111-119.
- Vuilleumier, F. 1993. Field study of allopatry, sympatry, parapatry, and reproductive isolation in steppe birds of Patagonia. *Ornit. Neotr.* 4: 1-41.
- Vuilleumier, F. 1994. Nesting, behavior, distribution, and speciation of patagonian and andean ground Tyrans (*Myiotheretes*, *Xolmis*, *Neoxolmis*, *Agriornis* and *Muscisaxicola*). *Ornit. Neotr.* 5: 1-55.
- W**
- Wace, R. 1921. Lista de aves de las Islas Falkland. *Hornero* 2: 194-204.
- Wallace, P. 2010. Primer registro de nidificación de Lechuza Bataraz Austral (*Strix rufipes*) en Argentina. *Nuestras Aves* 55: 3.
- Ward, T. B. S. 1941. Los Flamencos de Mar Chiquita. *Hornero* 8: 118-120.
- Weller, M. W. 1967. Notes of some marsh birds of cape San Antonio, Argentina. *Ibis* 109: 391-412.
- Weller, M. W. 1968a. Notes on some Argentine anatids. *Wilson Bull.* 80: 189-212.
- Weller, M. W. 1968b. The breeding biology of the parasitic Black-Headed Duck. *Libin Bird* 7: 169-207.
- Weller, M. W. 1972. Ecological studies of the South Georgia Pintail (*Anas g. georgica*). *Antarctic Journal* 7: 77-78.
- Weller, M. W. 1972. Ecological studies of Falkland Islands waterfowl. *Wildfowl* 23: 25-44.
- Weller, M. W. 1975. Habitat selection by waterfowl of Argentine Isla Grande. *Wilson Bull.* 87: 83-90.
- Weller, M. W. 1976. Ecology and behaviour of Steamer Ducks. *Wildfowl* 27: 45-53.
- Wessels, A. 2012. E17637, *Veniliornis mixtus* (Boddaert, 1783). www.ecoregistros.org/17637 (acceso 4/03/2015)
- Wessels, A. 2013. E19405, *Podiceps occipitalis* (Garnot, 1826). www.ecoregistros.org/19405 (acceso 19/02/2015)
- Wetmore, A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. *Bull. U.S. Nat. Mus.* 133: 1-448.
- Wetmore, A. 1926a. Report on a collection of birds made by J. R. Pemberton in Patagonia. *Univ. California Public. Zool.* 24: 395-474.
- White, C. M. y D. A. Boyce. 1987. Notes on the Mountain Caracara (*Phalcoboenus*

- megalopterus*) in the Argentine Puna. *Wilson Bull.* 99: 283-284.
- White, E. W. 1882. Notes on birds collected in the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London* 1882: 591-629.
- White, E. W. 1883. Further notes on the birds of the Argentine Republic. *Proc. Zool. Soc. London* 1883: 432-434.
- White, E. 2001. Estancia Guaycolec como área clave para la conservación de *Crax f. fasciolata* y *Penelope o. obscura* en el Chaco húmedo, Formosa, Argentina. *Bol. Grupo Especialistas Crácidos* 13: 17-18.
- Willis, E. O y A. Bosso. 1997. A nest of the Cream-bellied Grantcatcher, *Polioptila lactea*. *Ornit. Neotr.* 8: 75-76.
- Wilson, A. S. 1923a. Notas biológicas sobre algunas aves de Santa Fe. *Hornero* 3: 84-89.
- Wilson, A. S. 1923b. Huevos de pato en un nido de Chimango. *Hornero* 3: 192.
- Wilson, A. S. 1924. Datos biológicos sobre aves de Santa Fe. *Hornero* 3: 246-248.
- Wilson, A. S. 1926. Lista de aves del sur de Santa Fe. *Hornero* 3: 349-363.
- Wilson, D. B. 1973. La Monjita Blanca *Xolmis irupero*. *Hornero* 11: 222-224.
- Wilson, D. B. 1975. Un nido de *Syrigma sibilatrix*. *Hornero* 11: 219.
- Wilson, D. B. 1977. Comportamiento de algunas aves de Mercedes (Provincia de Corrientes). *Hornero* 11: 430-432.
- Wilson, D. B. 1979. Notas sobre casos de parasitismo del Renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre varios Passeriformes observados en la Provincia de Corrientes. *Hornero* 12: 69-71.
- Withington, F. 1888. On the birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine. *Ibis* 1888: 461-473.
- Woehler, E. J. 1993. The distribution and abundance of Antarctic and Subantarctic penguins. Scientific Committee on Antarctic Research, United Kingdom.
- Woods, R. W. 1975. *The birds of the Falkland Islands*. A. Nelson, Oswestry.
- Woods, R. W. 1982. *Falkland Islands Birds*. Anthony Nelson. Inglaterra.
- Woods, R. W. 1988. *Guide to birds of the Falkland Islands*. A. Nelson Ltd., Shropshire, England.
- Woods, R. W. 2006. *Checklist of Falkland Islands Birds*.
- Wright, J. E. y L. I. Ferrero. 1985. Hebras fúngicas como componente principal de nidos de boyeros en el NE argentino. *Facena* 6: 5-16.
- Y**
- Yanovsky, A. A. 1987. Acerca del nido del Jote de cabeza amarilla *Cathartes burrovianus* (Aves, Cathartidae). *Nótulas Faunísticas* 5: 1.
- Yngelmo, J. J. 2012. E16911, *Anas bahamensis* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/16911 (acceso 21/02/2015)
- Yngelmo, J. J. 2013. E20414, *Ardea cocoi* (Linnaeus, 1766). www.ecoregistros.org/20414 (acceso 21/02/2015)
- Yngelmo, J. J. 2015. E124313, *Sturnus vulgaris* (Linnaeus, 1758). www.ecoregistros.org/124313 (acceso 21/12/2015)
- Yorio, P. y P. Dee Boesma. 1994a. Causes of nest desertion during incubation in the Magellanic Penguin (*Spheniscus magellanicus*). *Condor* 96: 1076-1083.
- Yorio, P. y P. Dee Boesma. 1994b. Consequences of nest desertion and inattendance for Magellanic Penguin hatching success. *Auk* 111: 215-218.
- Yorio, P. y P. García Borboroglu. 2002. Breeding biology of Kelp Gulls (*Larus dominicanus*) at Golfo San Jorge, Patagonia, Argentina. *Emu* 102: 1-7.
- Yorio, P. y F. Quintana. 1997. Predation by Kelp Gulls *Larus dominicanus* at a mixed-species colony of Royal and Cayenne Terns *Sterna maxima* and *S. eurygnatha* in Patagonia. *Ibis* 139: 536-541.
- Yorio, P., Bertellotti, M. y F. Quintana. 1995. Preference for covered nest sites and breeding success in Kelp Gulls *Larus dominicanus*. *Marine Ornith.* 23: 121-128.
- Yorio, P., Dee Boesma, P. y S. Swann. 1996. Breeding biology of the Dolphin Gull (*Larus scoresbii*) at Punta Tombo, Argentina. *Condor* 98: 208-215.
- Yorio, P., Rábano, D. E. y P. Friedrich. 2001. Habitat and nest site characteristics of Olrog's Gull *Larus atlanticus* breeding at Bahía San Blas, Argentina. *Bird Cons. Int.* 11: 27-34.

- Yorio, P., Bertellotti, M., Gandini, P. y E. Frere. 1998d. Kelp Gulls *Larus dominicanus* breeding on the Argentine coast: population status and relationship with coastal management and conservation. *Marine Ornith.* 26: 11-18.
- Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris. 1998. *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Yorio, P., García Borboroglu, P., Potti, J. y J. Moreno. 2001. Breeding biology of Magellanic Penguin *Spheniscus magellanicus* at Golfo San Jorge, Patagonia, Argentina. *Marine Ornith.* 29: 75-79.
- Yorio, P., Quintana, F., Campagna, C. y G. Harris. 1994. Diversidad, abundancia y dinámica espacio-temporal de la colonia de aves marinas en Punta León, Patagonia. *Ornit. Neotr.* 5: 69-77.
- Yorio, P., Quintana, F., Gatto, A., Lisiñiser, N. y N. Suárez. 2004. Foraging patterns of breeding Olrog's Gull at Golfo San Jorge, Argentina. *Waterbirds* 27: 193-199.
- Yorio, P., Rábano, D., Rabuffetti, F., Friedrich, P. y G. Harris. 1998a. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de la Provincia de Buenos Aires: de Bahía Blanca a Punta Redonda. Pp. 19-28 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Yorio, P., Bertellotti, M., García Borboroglu, P., Carrilero, A., Giaccardi, M., Lizurume, M. E., Boesma y F. Quintana. 1998b. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Chubut. Parte I: de Península Valdés a Islas Blancas. Pp. 39-73 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Yorio, P., García Borboroglu, P., Bertellotti, M., Lizurume, M. E., Giaccardi, M., Punta, G., Saravia, J., Herrera, G., Sollazzo, S. y D. Boesma. 1998c. Distribución reproductiva y abundancia de las aves marinas de Chubut. Parte II: norte del Golfo San Jorge, de Cabo Dos Bahías a Comodoro Rivadavia. Pp. 76-117 en: Yorio, P., Frere, E., Gandini, P. y G. Harris (eds) *Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino*. Fundación Patagonia Natural y Wildlife Conservation Society, Buenos Aires.
- Yzurieta, D. y M. Nores. 1983. Nota sobre las características del nido del Piojito Silbador. *Hornero* 12: 129-131.
- Z**
- Zalba, S. M. y C. J. Belenguer. 1996. Nidificación del Gaviotín Sudamericano (*Sterna hirundinacea*) en Bahía San Blas, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 35: 33-34.
- Zalba, S. M., Sánchez, R. y N. C. Cozzani. 2008. Priorities for the conservation of an endangered grassland bird: clues from its nesting biology. *Ornit. Neotr.* 20: 35-46.
- Zanotti, M. 2014. E61145, *Coragyps atratus* (Bechstein, 1783). www.ecoregistros.org/61145 (acceso 19/02/2015)
- Zapata, A. R. P. 1965a. Hallazgo de un nido de *Syrigma sibilatrix*. *Hornero* 10: 279-280.
- Zapata, A. R. P. 1965b. Nuevas localidades de nidificación de *Leucophaeus scoresbii* (Traile) y *Sterna sandvicensis eurygnata* Saunders. (Aves, Laridae). *Physis* 25: 383-385.
- Zapata, A. R. P. 1967. Observaciones sobre aves de Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz. *Hornero* 10: 351-378.
- Zapata, A. R. P. 1969. Aves observadas en el Golfo San Jorge, provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina. *Zoología Platense* 1: 21-27.
- Zapata, A. R. P. 1977. Aves observadas en las proximidades de la confluencia de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos. *Hornero* 11: 387-403.
- Zapata, A. R. P. 2002. Nueva cita sobre la nidificación y crías del Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 44: 14-15.
- Zapata, A. R. P. y A. M. Cabrera. 1969. Sobre una colección de huevos de aves silvestres. *Min. Asunt. Agrar. La Plata Comun.* 1: 74-97.

- Zapata, A. R. P. y E. M. Zazarino de Bustingorry. 1990. Observaciones de campo sobre algunas aves que nidifican en el partido 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* 21: 91-94.
- Zuberbühler, E. 1953. Notas para la biología del Pijuí de Pecho Blanco. *Hornero* 10: 78-79.
- Zuberbühler, E. 1956. Dos nidos en situación anómala. *Hornero* 10: 175.
- Zuberbühler, E. 1971. Observaciones sobre las aves de la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 11: 98-112.